

**LISTADO DE SEGMENTOS DE MERCADO EN ANÁLISIS PARA FIJACIÓN DE PRECIOS TECHO**

La Resolución Nro. STFP-29-684-2018 aprobada en Sesión de Consejo Nro. 684 de fecha 24 de agosto de 2018 y publicada el 02 de octubre de 2018 manifiesta:

***“Aprobar la publicación en la página web del Consejo de los segmentos de mercado pendientes de fijación de precios techo, que no fueron incluidos en la Resolución 10-2015 y 16- 2017, y además de no contar con fijación previa, con el objeto de socializar la información con el sector farmacéutico”.***

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución que antecede, la Secretaria Técnica de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano, procede a Socializar el listado de los segmentos de mercado en análisis para la fijación de precios techo, que no fueron incluidos en la Resolución 10-2015 y 16-2017, además de contar con fijación previa; el mismo que será actualizado periódicamente.

| ítem | Principio Activo   | Primer Nivel de Desagregación | Forma Farmacéutica  | Concentración  |
|------|--|-------------------------------|---|--|
| 1    | POLICRESULENO  | SÓLIDO VAGINAL                | ÓVULO, CÁPSULA O TABLETA VAGINAL  | 90 mg/unidad   |
| 2    | CLOTRIMAZOL<br>NEOMICINA<br>BETAMETASONA                                 | SEMISÓLIDO CUTÁNEO            | POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA   | (1 g + 0.5 g + 0.04 g)/100 g                           |
| 3    | LORATADINA<br>AMBROXOL   | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS | (5 mg + 30 mg)/unidad                                  |
| 4    | PENICILINA G BENZATINICA<br>PENICILINA G PROCAÍNA<br>PENICILINA G SÓDICA | SÓLIDO PARENTERAL             | POLVO PARA INYECCIÓN, POLVO PARA PERFUSIÓN, POLVO COMPACTO LIOFILIZADO.   | (600.000UI + 300.000 UI + 300.000 UI)/unidad           |
| 5    | CETIRIZINA<br>FENILEFRINA  | LÍQUIDO ORAL                  | JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN  | (10 mg + 5 mg)/5 ml                                    |
| 6    | CETIRIZINA<br>PSEUDOEFDRIINA   | LÍQUIDO ORAL                  | JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN  | (100.00 mg + 1200.0 mg)/100 ml<br>( 60 mg + 5 mg)/ 5ml |
| 7    | FENILEFRINA<br>CETIRIZINA  | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS | (15 mg + 5 mg)/unidad                                  |
| 8    | RIFAMICINA   | LÍQUIDO CUTÁNEO               | CHAMPOO, EMULSIÓN (LINIMENTO), LOCIÓN Y SOLUCIÓN.   | 10 mg/ml   |
| 9    | SALBUTAMOL<br>BECLOMETASONA  | LÍQUIDO PARA INHALACIÓN       | SOLUCIONES, EMULSIONES O SUSPENSIONES PARA INHALACIÓN.  | (100 mcg + 50 mcg)/dosis<br>(2 mg + 1 mg)/ml           |

| ítem | Principio Activo                                      | Primer Nivel de Desagregación | Forma Farmacéutica   | Concentración   |
|------|---|-------------------------------|--|---|
| 10   | OMEPRAZOL<br>BICARBONATO DE SODIO                     | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS                            | (20 mg + 1100 mg)/unidad                              |
| 11   | METAMIZOL   | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS                            | 500 mg/unidad   |
| 12   | PSEUDOEFEDRINA<br>CETIRIZINA                          | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS                            | (120 mg + 5 mg)/unidad                                |
| 13   | TIAMINA<br>PIRIDOXINA<br>CIANOCOBALAMINA<br>LIDOCAINA | LÍQUIDO PARENTERAL            | SOLUCIÓN INYECTABLE, EMULSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INTRATRAQUEAL, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN.  | (100.00 mg + 50.00 mg + 10000.00 mcg + 30.00 mg)/2 ml |
| 14   | PARACETAMOL<br>CLORFERINAMINA                         | LÍQUIDO ORAL                  | JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.  | (80 mg + 0.5 mg)/ml                                   |
| 15   | VITAMINA D 3<br>CRISTALIZADA                          | LÍQUIDO ORAL                  | JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.  | 2000 UI/10 ml<br>(200 UI/ml)                          |
| 16   | MEZALASINA  | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA GASTRORRESISTENTE, CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA, TABLETA GASTRORRESISTENTE, TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS. | 500 mg/unidad   |
| 17   | MICONAZOL   | SÓLIDO VAGINAL                | ÓVULO, CÁPSULA O TABLETA VAGINAL   | 400 mg/unidad   |
| 18   | GLUCOSAMINA<br>CONDROITINA<br>COLÁGENO                | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA                                  | (500 mg + 400 mg + 100 mg)/unidad                     |

| ítem | Principio Activo                              | Primer Nivel de Desagregación | Forma Farmacéutica  | Concentración  |
|------|---|-------------------------------|---|--|
|      |   |                               | COMPRIMIDOS.  |  |
| 19   | BETAMETASONA                                  | LÍQUIDO PARENTERAL            | SOLUCIÓN INYECTABLE, EMULSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INTRATRAQUEAL, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN.   | 7 mg/ml  |
| 20   | LORATADINA<br>PSEUDOEFEDRINA                  | LÍQUIDO ORAL                  | JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.   | (0,100 g + 1,200 g)/ 100 ml<br>(5 mg + 60 mg)/5 ml                       |
| 21   | POLICRESULENO                                 | SEMISÓLIDO VAGINAL            | POMADA, CREMA O GEL VAGINAL.  | 1,80 %<br>(18 mg/g)  |
| 22   | DESONIDA                                      | SEMISÓLIDO CUTÁNEO            | POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA.  | 0,10 g/100 g<br>1 mg/g   |
| 23   | PREDNISOLONA<br>NEOMICINA                     | SEMISÓLIDO CUTÁNEO            | POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA.  | (0,5 g + 0,5 g)/100 g<br>(5 mg + 5 mg)/g                                 |
| 24   | NIFUROXAZIDA<br>ATAPULGITA                    | LÍQUIDO ORAL                  | JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.   | (4.000 g + 10.000 g)/100 ml<br>(200 mg + 500 mg)/ml                      |
| 25   | NIFUROXAZIDA<br>ATAPULGITA                    | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA.<br>NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS. | (200 mg + 350 mg)/unidad   |
| 26   | CETIRIZINA                                    | LÍQUIDO ORAL                  | JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.   | 5 mg/5 ml  |
| 27   | PARACETAMOL<br>PSEUDOEFEDRINA<br>CLORFENAMINA | LÍQUIDO ORAL                  | JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.   | (12,000 g + 0,750 g + 0,075 g)/100 ml<br>(120 mg + 7,5 mg + 0,75 mg)/ml  |
| 28   | POLICRESULENO<br>CINCHOCAINA                  | SÓLIDO RECTAL                 | SUPOSITORIO   | (100 mg + 2,5 mg)/unidad   |
| 29   | ISOCONAZOL                                    | SÓLIDO VAGINAL                | ÓVULO, CÁPSULA O TABLETA VAGINAL  | 600 mg/unidad  |
| 30   | AMOXICILINA<br>SULBACTAM                      | SÓLIDO ORAL                   | POLVO, POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, GRANULADO PARA RECONSTITUIR SUSPENSIÓN.  | Cada 5 ml de suspensión reconstituida contiene:<br><br>(125 mg + 125 mg) |
| 31   | BISOPROLOL<br>HIDROCLOROTIAZIDA               | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA.<br>NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS  | (5 mg + 6,25 mg)/unidad  |

| ítem | Principio Activo                           | Primer Nivel de Desagregación | Forma Farmacéutica  | Concentración  |
|------|--|-------------------------------|---|--|
|      |  |                               | DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.  |  |
| 32   | NADROPARINA                                | LÍQUIDO PARENTERAL            | SOLUCIÓN INYECTABLE, EMULSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INTRATRAQUEAL, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN.   | 9500 UI/ml   |
| 33   | TOXINA DE CLOSTRIDIUM BOTULINUM            | SÓLIDO PARENTERAL             | POLVO PARA INYECCIÓN, POLVO PARA PERFUSIÓN, POLVO COMPACTO LIOFILIZADO.   | 100 U/unidad   |
| 34   | MOMETASONA                                 | LÍQUIDOS PARA INHALACIÓN      | SOLUCIONES, EMULSIONES O SUSPENSIONES PARA INHALACIÓN.  | 0,05 g/100 ml (0,05 %)   |
| 35   | BICARBONATO DE SODIO<br>CLORURO DE SODIO   | LÍQUIDO PARENTERAL            | SOLUCIÓN INYECTABLE, EMULSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INTRATRAQUEAL, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN.   | (6.6 g + 2.36 g)/100 ml  |
| 36   | BETAMETASONA                               | LÍQUIDO PARENTERAL            | SOLUCIÓN INYECTABLE, EMULSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INTRATRAQUEAL, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN.   | 7 mg/ml  |
| 37   | ÁCIDO ASCÓRBICO                            | SÓLIDO ORAL                   | TABLETA EFERVESCENTE, TABLETA SOLUBLE, TABLETA DISPERSABLE, TABLETA SUBLINGUAL, TABLETA PARA CHUPAR, TABLETA MASTICABLE, TABLETA MUCO-ADHESIVO, GOMAS DE MASCAR. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS. | 2000 mg/unidad   |
| 38   | CLOTRIMAZOL<br>NEOMICINA<br>DEXAMETASONA   | SEMISÓLIDO CUTÁNEO            | POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA   | (1,00 g + 0,50 g + 0,04 g)/100 g                                     |
| 39   | CODEINA<br>PSEUDOFEDRINA<br>CLORFENIRAMINA | LÍQUIDO ORAL                  | JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.   | (0,20 g + 0,15 g + 0,01 mg)/100 ml<br>(10 mg + 7,5 mg + 0,5 mg)/5 ml |
| 40   | CODEINA<br>PSEUDOFEDRINA<br>CLORFENIRAMINA | LÍQUIDO ORAL                  | JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.   | (0,20 g + 0,60 g + 0,04 g)/100 ml<br>(10 mg + 30 mg + 2 mg)/5 ml     |
| 41   | GLUCOSAMINA<br>CONDROITINA                 | SÓLIDO ORAL                   | POLVO, POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, GRANULADO PARA RECONSTITUIR SUSPENSIÓN.  | (1500 mg + 1200 mg)/sobre  |

| ítem | Principio Activo                                     | Primer Nivel de Desagregación | Forma Farmacéutica  | Concentración                                      |
|------|--|-------------------------------|---|--|
| 42   | SULFATO FERROSO EQUIV.<br>HIERRO ELEMENTAL           | LÍQUIDO ORAL                  | JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN,<br>SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.  | 2,5 g/100 ml<br>25 mg/ml                           |
| 43   | MOXIFLOXACINO  | LÍQUIDO PARENTERAL            | SOLUCIÓN INYECTABLE, EMULSIÓN<br>INYECTABLE, SUSPENSIÓN<br>INYECTABLE, SUSPENSIÓN<br>INTRATRAQUEAL, SOLUCIÓN PARA<br>DIÁLISIS PERITONEAL, SOLUCIÓN<br>PARA INFUSIÓN.  | 400 mg/ 250 ml<br>(1,6 mg/ ml)                     |
| 44   | PSEUDOEFEDRINA<br>CLORFENAMINA                       | LÍQUIDO ORAL                  | JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN,<br>SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.  | (3,0 g + 0,1 g)/100 ml<br>(30 mg + 1 mg)/ml        |
| 45   | SALBUTAMOL   | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA<br>BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA,<br>TABLETA RECUBIERTA, TABLETA<br>NO RECUBIERTA, GRAGEA.<br>NOTA: TODOS LOS TIPOS DE<br>FORMAS FARMACÉUTICAS<br>DEFINIDAS SON APLICABLES PARA<br>COMPRIMIDOS. | 4 mg/unidad  |
| 46   | MOMETASONA   | SEMISÓLIDO CUTÁNEO            | POMADA, CREMA, GEL,<br>UNGÜENTO, PASTA Y JALEA  | 1 mg/g   |
| 47   | ESTRIOL  | SÓLIDO VAGINAL                | ÓVULO, CÁPSULA O TABLETA<br>VAGINAL   | 0,5 mg/unidad                                      |
| 48   | MINOCICLINA  | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA<br>BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA,<br>TABLETA RECUBIERTA, TABLETA<br>NO RECUBIERTA, GRAGEA.<br>NOTA: TODOS LOS TIPOS DE<br>FORMAS FARMACÉUTICAS<br>DEFINIDAS SON APLICABLES PARA<br>COMPRIMIDOS. | 100 mg/unidad                                      |
| 49   | LOSARTAN<br>HIDROCLOROTIAZIDA                        | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA<br>BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA,<br>TABLETA RECUBIERTA, TABLETA<br>NO RECUBIERTA, GRAGEA.<br>NOTA: TODOS LOS TIPOS DE<br>FORMAS FARMACÉUTICAS<br>DEFINIDAS SON APLICABLES PARA<br>COMPRIMIDOS. | (100 mg + 12.5 mg)/unidad                          |
| 50   | NICOTINAMIDA<br>PIRIDOXINA<br>TIAMINA<br>RIBOFLAVINA | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA<br>BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA,<br>TABLETA RECUBIERTA, TABLETA<br>NO RECUBIERTA, GRAGEA.<br>NOTA: TODOS LOS TIPOS DE<br>FORMAS FARMACÉUTICAS<br>DEFINIDAS SON APLICABLES PARA<br>COMPRIMIDOS. | (50 mg + 20 mg + 10 mg + 10<br>mg)/unidad          |
| 51   | AMOXICILINA<br>ÁCIDO CLAVULÁNICO                     | SÓLIDO ORAL                   | POLVO, POLVO PARA SOLUCIÓN<br>ORAL, POLVO PARA SUSPENSIÓN<br>ORAL, GRANULADO PARA   | Cada 5 ml de suspensión<br>reconstituida contiene: |

| ítem | Principio Activo  | Primer Nivel de Desagregación | Forma Farmacéutica   | Concentración                            |
|------|---|-------------------------------|--|--|
|      |   |                               | RECONSTITUIR SUSPENSIÓN.   | (600 mg + 42,9 mg)                       |
| 52   | LEVOCETIRIZINA  | LÍQUIDO ORAL                  | JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.  | 0.05 g/100 ml<br>(2,5 mg/5 ml)           |
| 53   | PARACETAMOL<br>PSEUDOEFEDRINA<br>CLORFENAMINA           | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS        | (500,00 mg + 60,00 mg + 4,00 mg)/unidad  |
| 54   | CICLOSPORINA-A  | LÍQUIDO OFTÁLMICO             | SOLUCIÓN OFTÁLMICA, SUSPENSIÓN OFTÁLMICA   | 1. 00 mg/ml                              |
| 55   | ACETAMINOFEN<br>CODEINA                                 | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS        | (500 mg + 30 mg)/unidad                  |
| 56   | DORZOLAMIDA<br>TIMOLOL<br>BRIMONIDINA                   | LÍQUIDO OFTÁLMICO             | SOLUCIÓN OFTÁLMICA, SUSPENSIÓN OFTÁLMICA   | (20 mg + 5 mg +2 mg)/ml                  |
| 57   | POLIETILENGLICOL  | SÓLIDO ORAL                   | POLVO, POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, GRANULADO PARA RECONSTITUIR SUSPENSIÓN.   | 100 g/sobre                              |
| 58   | HIDROXOCOBALAMINA<br>TIAMINA<br>PIRIDOXINA              | LÍQUIDO PARENTERAL            | SOLUCIÓN INYECTABLE, EMULSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INTRATRAQUEAL, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN.  | (10,000 mcg + 100 mg + 50 mg)/2 ml       |
| 59   | PIRIDOXINA<br>TIAMINA<br>CIANOCOBALAMINA<br>DICLOFENACO | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS. | (50 mg + 50 mg + 0.25 mg + 50 mg)/unidad |
| 60   | MESALAZINA  | SÓLIDO RECTAL                 | SUPOSITORIO  | 1000 mg/unidad                           |
| 61   | BRIMONIDA   | LÍQUIDO OFTÁLMICO             | SOLUCIÓN OFTÁLMICA, SUSPENSIÓN OFTÁLMICA   | 2 mg/ml<br>0,20 %                        |
| 62   | SIMETICONA<br>METOCLOPRAMIDA                            | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA.  | (200 mg + 10 mg)/unidad                  |

| ítem | Principio Activo                          | Primer Nivel de Desagregación | Forma Farmacéutica   | Concentración  |
|------|---|-------------------------------|--|--|
|      |   |                               | NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.   |  |
| 63   | PREDNISONA                                | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS. | 50 mg/unidad   |
| 64   | CLINDAMICINA<br>CLOTRIMAZOL               | SÓLIDO VAGINAL                | ÓVULO, CÁPSULA O TABLETA VAGINAL   | (100 mg + 200 mg)/unidad   |
| 65   | PREGABALINA                               | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS. | 50 mg/unidad   |
| 66   | DEXTROMETORFANO<br>GUAIFENESINA           | LÍQUIDO ORAL                  | JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN   | (300.mg + 2000.00 mg)/100 ml<br>(15 mg +100 mg)/5 ml               |
| 67   | CODEINA<br>GUAIFENESINA<br>PSEUDOEFEDRINA | LÍQUIDO ORAL                  | JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN   | (0,20 g + 2,00 g + 0,60 g)/100 ml<br>(10 mg + 100 mg + 30 mg)/5 ml |
| 68   | ESOMEPRAZOL<br>MELOXICAM                  | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS. | (20 mg + 15 mg)/unidad   |
| 69   | NOMEGESTROL<br>ESTRADIOL                  | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS. | (2,5 mg + 1,5 mg)/unidad   |
| 70   | NEOMICINA<br>BACITRACINA                  | SEMISÓLIDO CUTÁNEO            | POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA  | ( 0,5 g + 50.000 UI)/100 g<br>(5 mg + 500 UI/g                     |
| 71   | SALMETEROL<br>FLUTICASONA                 | LÍQUIDOS PARA INHALACIÓN      | SOLUCIONES, EMULSIONES O SUSPENSIONES PARA INHALACIÓN.   | (25 mcg + 125 mcg)/dosis   |

| ítem | Principio Activo                         | Primer Nivel de Desagregación | Forma Farmacéutica  | Concentración  |
|------|--|-------------------------------|---|--|
| 72   | SALMETEROL<br>FLUTICASONA                | LÍQUIDOS PARA INHALACIÓN      | SOLUCIONES, EMULSIONES O SUSPENSIONES PARA INHALACIÓN.  | (25 mcg + 50 mcg)/dosis  |
| 73   | SALMETEROL<br>FLUTICASONA                | LÍQUIDOS PARA INHALACIÓN      | SOLUCIONES, EMULSIONES O SUSPENSIONES PARA INHALACIÓN.  | (25 mcg + 250 mcg)/dosis   |
| 74   | POLIETILENGLICOL                         | SÓLIDO ORAL                   | POLVO, POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, GRANULADO PARA RECONSTITUIR SUSPENSIÓN.  | 105 g/sobre  |
| 75   | DEXAMETASONA SODICA                      | LÍQUIDO PARENTERAL            | SOLUCIÓN INYECTABLE, EMULSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INTRATRAQUEAL, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN.   | (8 mg + 2 mg)/ml   |
| 76   | BETAMETASONA<br>ÁCIDO SALICÍLICO         | SEMISÓLIDO CUTÁNEO            | POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA   | (0,5 mg +30 mg)/g  |
| 77   | ISOTRETINOINA                            | SEMISÓLIDO CUTÁNEO            | POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA   | 0.05 g/100 g<br>0,5 mg/g   |
| 78   | UNDECANOATO DE<br>TESTOSTERONA           | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA.<br>NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS. | 40 mg/unidad   |
| 79   | CIPROFLOXACINA<br>FENAZOPIRIDINA         | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA.<br>NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS. | (500 mg + 100 mg)/unidad   |
| 80   | MONTELUKAST                              | SÓLIDO ORAL                   | POLVO, POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, GRANULADO PARA RECONSTITUIR SUSPENSIÓN.  | 4 mg/sobre   |
| 81   | CETIRIZINA<br>PARACETAMOL<br>FENILEFRINA | LÍQUIDO ORAL                  | JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.   | (0,05 g + 6,50 g + 0,10 g)/100 ml<br>(2,5 mg + 325 mg + 5 mg)/5 ml |
| 82   | TROMANTADINA                             | SEMISÓLIDO CUTÁNEO            | POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA   | 1 g/100 g<br>(10 mg/g)   |
| 83   | TRETINOINA<br>FLUOCINOLONA               | SEMISÓLIDO CUTÁNEO            | POMADA, CREMA, GEL,   | (0,05 g + 0,01 g + 4 g)/100 g                                      |



| ítem | Principio Activo                   | Primer Nivel de Desagregación | Forma Farmacéutica  | Concentración                                  |
|------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
|      | HIDROXIQUINONA                     |                               | UNGÜENTO, PASTA Y JALEA   | (0,5 mg + 0,1 mg + 40 mg)/g                    |
| 84   | MEZALASINA                         | SÓLIDOS RECTALES              | SUPOSITORIO   | 500 mg/unidad                                  |
| 85   | CICLOSPORINA                       | LÍQUIDO OFTÁLMICO             | SOLUCIÓN OFTÁLMICA,<br>SUSPENSIÓN OFTÁLMICA   | 0,05%  |
| 86   | PREDNISOLONA<br>NEOMICINA          | LÍQUIDO ÓTICO                 | GOTAS   | (0,500 g + 0,500 g)/100 ml<br>(5 mg + 5 mg)/ml |
| 87   | ESTREPTOQUINASA<br>ESTREPTODORNASA | SEMISÓLIDO CUTÁNEO            | POMADA, CREMA, GEL,<br>UNGÜENTO, PASTA Y JALEA  | (10,0000 U + 2,500 U)/g                        |
| 88   | ATORVASTATINA<br>AMLODIPINO        | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA<br>BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA,<br>TABLETA RECUBIERTA, TABLETA<br>NO RECUBIERTA, GRAGEA.<br>NOTA: TODOS LOS TIPOS DE<br>FORMAS FARMACÉUTICAS<br>DEFINIDAS SON APLICABLES PARA<br>COMPRIMIDOS. | (10 mg + 5 mg)/unidad                          |
| 89   | ATORVASTATINA<br>AMLODIPINO        | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA<br>BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA,<br>TABLETA RECUBIERTA, TABLETA<br>NO RECUBIERTA, GRAGEA.<br>NOTA: TODOS LOS TIPOS DE<br>FORMAS FARMACÉUTICAS<br>DEFINIDAS SON APLICABLES PARA<br>COMPRIMIDOS. | (20 mg + 5 mg)/unidad                          |
| 90   | ATORVASTATINA<br>AMLODIPINO        | SÓLIDO ORAL                   | CÁPSULA DURA, CÁPSULA<br>BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA,<br>TABLETA RECUBIERTA, TABLETA<br>NO RECUBIERTA, GRAGEA.<br>NOTA: TODOS LOS TIPOS DE<br>FORMAS FARMACÉUTICAS<br>DEFINIDAS SON APLICABLES PARA<br>COMPRIMIDOS. | (40 mg + 5 mg)/unidad                          |

Fecha de actualización: 2018-10-12