

**SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 11, 2017.**

DEFINICIONES OPERACIONALES

Base de datos extraída: 21/03/17. 15:00 pm

Desnutrición aguda:

Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.


Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito. Siendo la edad crítica, para manejo de la desnutrición, para evitar que se cronifique los menores de 2 años, se realizará la vigilancia y análisis más profundos en este grupo de riesgo.

Cuadro N.1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 11.


	Desnutrición aguda severa		Desnutrición aguda moderada		Total general
	SE 1 - 10	SE 11	SE 1 - 10	SE 11	
GUAYAS	17	3	132	9	161
PICHINCHA	23		110	5	138
MANABI	21	3	65	4	93
EL ORO	6		79	2	87
ESMERALDAS	14	5	35	1	55
LOJA	14	1	17	5	37
COTOPAXI	10		20	2	32
TUNGURAHUA	10		21	1	32
CHIMBORAZO	1		22	8	31
MORONA SANTIAGO	8		20		28
SANTO DOMINGO D..	8	2	14	2	26
SUCUMBIOS	8		16		24
LOS RIOS	1	1	17	2	21
ORELLANA	13	1	6	1	21
CAÑAR	1		18	1	20
AZUAY	5	2	8	2	17
IMBABURA	5	1	11		17
PASTAZA	5		12		17
SANTA ELENA	3		10	3	16
CARCHI	3	1	10		14
BOLIVAR			12		12
ZAMORA CHINCHIPE	1		7		8
NAPO			7		7
Total general	177	20	669	48	914

MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 11.



Hasta la SE 11 del 2017, se han notificado **914** casos de **desnutrición aguda**, de los cuales, el 78,45 % (717) casos corresponden a **desnutrición aguda moderada** y el 21,55% (197) casos corresponden a **desnutrición aguda severa**, como se aprecia en el cuadro N.1 y Mapa N.1, donde se grafica la distribución de casos a nivel nacional.

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 11.



Sexo
■ Masculino ■ Femenino

Número de casos

En relación a los grupos etáreos:

1. Para **desnutrición aguda moderada** el grupo más afectado es el de 1 a 2 años con el 52,86 % (379 casos) notificados; siendo en este grupo el sexo masculino el que presenta el 53,03% (201 casos) hasta la SE 11.


2. Para **desnutrición aguda severa** se repite el mismo comportamiento que en desnutrición aguda moderada, siendo el grupo más afectado 0 a 11 meses con el 52,28% (103 casos), siendo el sexo femenino el que se presentan el 52,43% (54 casos) de este grupo etáreo hasta la SE 11.

**SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 11, 2017.**

Desnutrición Aguda Moderada

Base de datos extraída: 21/03/17. 15:00 pm

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 11.




CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 11.

Provincia1	SE 1 - 10	SE 11	Total g..
GUAYAS	132	9	141
PICHINCHA	110	5	115
EL ORO	79	2	81
MANABI	65	4	69
ESMERALDAS	35	1	36
CHIMBORAZO	22	8	30
COTOPAXI	20	2	22
LOJA	17	5	22
TUNGURAHUA	21	1	22
MORONA SANTIAGO	20		20
CAÑAR	18	1	19
LOS RIOS	17	2	19
SANTO DOMINGO DE L..	14	2	16
SUCUMBIOS	16		16
SANTA ELENA	10	3	13
BOLIVAR	12		12
PASTAZA	12		12
IMBABURA	11		11
AZUAY	8	2	10
CARCHI	10		10
NAPO	7		7
ORELLANA	6	1	7
ZAMORA CHINCHIPE	7		7
Total general	669	48	717

Se observa que la mayor cantidad de los casos reportados de Desnutrición Aguda Moderada, por provincias son: Guayas con 141 casos (19,67%), Pichincha con 115 casos (16,04%), El Oro con 81 casos (11,30%) y Manabi con 69 casos (9,62%) de los casos notificados hasta la SE 11.

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 11.



CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, semana epidemiológica 11.

Provincia1	SE 1 - 10	SE 11	Total general
MANABI	21	3	24
PICHINCHA	23		23
GUAYAS	17	3	20
ESMERALDAS	14	5	19
LOJA	14	1	15
ORELLANA	13	1	14
COTOPAXI	10		10
SANTO DOMINGO DE L..	8	2	10
TUNGURAHUA	10		10
MORONA SANTIAGO	8		8
SUCUMBIOS	8		8
AZUAY	5	2	7
EL ORO	6		6
IMBABURA	5	1	6
PASTAZA	5		5
CARCHI	3	1	4
SANTA ELENA	3		3
LOS RIOS	1	1	2
CAÑAR	1		1
CHIMBORAZO	1		1
ZAMORA CHINCHIPE	1		1
Total general	177	20	197

Al analizar la Desnutrición Aguda Severa, se observa un mayor número de casos reportados, en las provincias de: Manabi con 24 casos (12,18%), Pichincha con 23 casos (11,68%), Guayas con 20 casos (10,15%) y Esmeraldas con 19 casos (9,64%) respectivamente de los 197 casos notificados hasta la SE 11.


**SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 11, 2017**

Mujer embarazada con bajo peso

Base de datos extraída: 21/03/17. 15:00 pm

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 DE, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 11.




CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, semana epidemiológica 11.

Provincia1	Mujer embarazada con bajo peso
GUAYAS	296
PICHINCHA	131
MANABI	90
ESMERALDAS	78
CAÑAR	73
LOS RIOS	61
EL ORO	58
SANTA ELENA	45
CHIMBORAZO	35
AZUAY	32
TUNGURAHUA	26
IMBABURA	25
BOLIVAR	18
SANTO DOMINGO DE LOS TS..	17
LOJA	13
MORONA SANTIAGO	13
SUCUMBIOS	11
NAPO	10
ZAMORA CHINCHIPE	10
ORELLANA	9
COTOPAXI	7
CARCHI	4
Total general	1,062

Hasta la SE 11 se han reportado 1062 casos, siendo las provincias donde se registran el mayor número de casos Guayas con 296 casos (27,87%), Pichincha con 131 casos (12,34%), Manabí con 90 casos (8,47%), y Esmeraldas con 78 casos (7,34%).

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. Semana epidemiológica 10.



Al analizar los grupos de edad reportados, se evidencia que, el mayor número de casos se acumulan en el grupo de adolescentes tardías (15-19 años) con 518 casos (48,78%) seguidas por el grupo de 20 - 49 años de edad con 508 casos (47,83%) de los casos notificados hasta la SE 11.

Elaborada por: María Gabriela Yépez Granizo.
Revisada y aprobada por: Mayling Encalada.
21 de Marzo del 2017. 23:25

NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.