

**SUBSECRETARIA NACIONAL DE GOBERNANZA DE LA SALUD PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS**  
**MEDICAMENTOS QUE NO CONSTAN EN EL CNMB VIGENTE AUTORIZADOS PARA ADQUISICIÓN**  
**PERIODO 2013 -2018**

ÍTEM	CUM	NOMBRE GENÉRICO	FORMA FARMACÉUTICA Y CONCENTRACIÓN	REG. SAN. ECUADOR	INSTITUCIÓN AUTORIZADA	CIUDAD	INDICACIÓN PARA LA QUE SE AUTORIZA	APORTE TERAPÉUTICO	VIGENTE HASTA	OBSERVACIÓN
1	H02AB09TAB194X0	<b>HIDROCORTISONA</b>	Tableta 20 mg	NO	MSP-Proyecto Nacional de Tamizaje Neonatal (Todas las Unidades de Salud)	Nivel Nacional	Hiperplasia suprarrenal congénita	4	-	
2	A16AB02POF302X0	<b>IMIGLUCERASA</b>	Polvo para infusión 400 U	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Gaucher tipo I	2	-	Ficha para la evaluación de la efectividad Reporte Anual
3	A16AB02POF302X0	<b>IMIGLUCERASA</b>	Polvo para infusión 400 U	SI	MSP-Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante	Guayaquil	Gaucher tipo I	2	-	Ficha para la evaluación de la efectividad Reporte Anual
4	L01XE08CAP205X0	<b>NILOTINIB</b>	Cápsula 200 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Leucemia Mieloide Crónica con resistencia a Imatinib	2	12/04/2018	Ficha para la evaluación de efectividad Reporte Trimestral
5	L01XE08CAP205X0	<b>NILOTINIB</b>	Cápsula 200 mg	SI	SOLCA-Hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer-Núcleo Quito	Quito	Leucemia Mieloide Crónica con cromosoma Philadelphia positivo con resistencia a Imatinib	2	23/04/2018	Ficha para la evaluación de efectividad Reporte Trimestral
6	L01XE08CAP158X0	<b>NILOTINIB</b>	Cápsula 150mg	SI	SOLCA-Hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer-Núcleo Quito	Quito	Leucemia Mieloide Crónica con cromosoma Philadelphia positivo con resistencia a Imatinib	2	23/04/2018	Ficha para la evaluación de efectividad Reporte Trimestral
7	A16AB02POF302X0	<b>IMIGLUCERASA</b>	Polvo para infusión 400 U	SI	MSP-Hospital Provincial Francisco de Orellana	Francisco de Orellana	Gaucher tipo I	2	-	Ficha para la evaluación de efectividad Reporte Anual
8	L04AD02CAP048X0	<b>TACROLIMO (TACROLIMUS)</b>	Cápsula 0,5 mg	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Enfermedad renal crónica terminal sometidos a trasplante renal con terapia de inducción de novo y terapias de conversión temprana y rescate	2	-	Remitir lista de pacientes
9	L04AD02CAP073X0	<b>TACROLIMO (TACROLIMUS)</b>	Cápsula 1 mg	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Enfermedad renal crónica terminal sometidos a trasplante renal con terapia de inducción de novo y terapias de conversión temprana y rescate	2	-	Remitir lista de pacientes
10	L04AD02CAP314X0	<b>TACROLIMO (TACROLIMUS)</b>	Cápsula 5 mg	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Enfermedad renal crónica terminal sometidos a trasplante renal con terapia de inducción de novo y terapias de conversión temprana y rescate	2	-	Remitir lista de pacientes
11	L04AD02SU5081X0	<b>TACROLIMO (TACROLIMUS)</b>	Polvo para suspensión oral 1 mg/mL	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Enfermedad renal crónica terminal sometidos a trasplante renal con terapia de inducción de novo y terapias de conversión temprana y rescate	2	-	Remitir lista de pacientes
12	L04AD02CAP048X0	<b>TACROLIMO (TACROLIMUS)</b>	Cápsula 0,5 mg	SI	INDOT-Hospitales Acreditados por el INDOT	Quito	Mantenimiento contra rechazo del trasplante de riñón e hígado	2	-	Remitir lista de pacientes
13	L04AD02CAP073X0	<b>TACROLIMO (TACROLIMUS)</b>	Cápsula 1 mg	SI	INDOT-Hospitales Acreditados por el INDOT	Quito	Mantenimiento contra rechazo del trasplante de riñón e hígado	2	-	Remitir lista de pacientes
14	L04AD02CAP314X0	<b>TACROLIMO (TACROLIMUS)</b>	Cápsula 5 mg	SI	INDOT-Hospitales Acreditados por el INDOT	Quito	Mantenimiento contra rechazo del trasplante de riñón e hígado	2	-	Remitir lista de pacientes
15	L04AD02POS081X0	<b>TACROLIMO (TACROLIMUS)</b>	Polvo para suspensión oral 1 mg/mL	SI	INDOT-Hospitales Acreditados por el INDOT	Quito	Mantenimiento contra rechazo del trasplante de riñón e hígado	2	-	Remitir lista de pacientes
16	L04AD02SOY225X0	<b>TACROLIMO (TACROLIMUS)</b>	Solución inyectable 5 mg/mL	NO	INDOT-Hospitales Acreditados por el INDOT	Quito	Mantenimiento contra rechazo del trasplante de riñón e hígado	2	-	Remitir lista de pacientes
17	A16AX06CAP105X0	<b>MIGLUSTAT</b>	Cápsula 100 mg	NO	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Enfermedad de Niemann Pick C	2	26/06/2018	Ficha para la evaluación de la efectividad. Uso exclusivo para paciente autorizado Reporte Trimestral
18	L01XX32POI250X0	<b>BORTEZOMIB</b>	Polvo para inyección 3,5 mg	SI	FFAA-Hospital Especialidades Fuerzas Armadas (HE-1)	Quito	Mieloma Múltiple	2	-	Para uso exclusivo de paciente autorizado. Así como también, se autoriza para tratamiento de segunda línea en pacientes que se haya demostrado falla terapéutica a los medicamentos de primera línea o cuando el paciente no sea apto para trasplante de médula ósea, y con un estado clínico funcional Karnofsky de 80 o más. Ficha para la evaluación de la efectividad.
19	L01CA04SOY097X0	<b>VINORELBINA</b>	Solución inyectable 10 mg/mL	SI	SOLCA-Hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer-Núcleo Quito	Quito	Ca de Mama EC II A + Progresión en Tratamiento de Cuarta Línea De QT Con Ifosfamida + Vinorelbina.	2	-	Para uso exclusivo de paciente autorizado.
20	V06DX00POL000L4	<b>FÓRMULA EXENTA DE LISINA Y BAJA CONCENTRACIÓN DE TRIPTOFANO</b>	Polvo, Tarro 500 g.	NO	MSP-Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante	Guayaquil	Aciduria glutárica tipo 1	2	-	Para uso exclusivo de paciente autorizado.
21	V06DF00POL000L5	<b>FÓRMULA HIDROLIZADA LIBRE DE AMINOACIDOS Y PROTEÍNAS</b>	Polvo, Tarro 454 g	NO	MSP-Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante	Guayaquil	Aciduria glutárica tipo 1	2	-	Para uso exclusivo de paciente autorizado.
22	D07AB09SUY097X0	<b>TRIAMCINOLONA</b>	Suspensión inyectable 10 mg/mL	NO	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Cicatrices Queloides y Cicatrices Hipertroficas	4	-	Ficha para la evaluación de la efectividad Reporte Semestral
23	L04AC07SCI200X0	<b>TOCILIZUMAB</b>	Concentrado para solución para infusión 20 mg/mL	SI	IEES-Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo	Loja	Artritis Reumatoidea	-	-	Para uso exclusivo de paciente autorizado.
24	L04AC07SCI200X0	<b>TOCILIZUMAB</b>	Concentrado para solución para infusión 20 mg/mL	SI	MSP-Hospital Luis Gabriel Dávila	Tulcán	Artritis Reumatoidea	-	-	Para uso exclusivo de paciente autorizado.
25	L04AC07SCI200X0	<b>TOCILIZUMAB</b>	Concentrado para solución para infusión 20 mg/mL	SI	IESS-Hospital Ambato	Ambato	Artritis Reumatoidea	-	-	Para uso exclusivo de paciente autorizado.
26	J06BA01SOY112X0	<b>INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL PARA ADMINISTRACIÓN EXTRA VASCULAR</b>	Solución inyectable para administración subcutánea	NO	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Agammaglobulinemia ligada al cromosoma X	-	-	Para uso exclusivo del paciente autorizado Ficha para la evaluación de la efectividad Reporte Cuatrimestral
27	L04AC07SCI200X0	<b>TOCILIZUMAB</b>	Concentrado para solución para infusión 20 mg/mL	SI	IESS-Hospital Teodoro Maldonado Carbo	Guayaquil	Artritis Reumatoidea	-	-	Para uso exclusivo de paciente autorizado.
28	L04AC07SCI200X0	<b>TOCILIZUMAB</b>	Concentrado para solución para infusión 20 mg/mL	SI	HOSNAG-Armada del Ecuador - Estación Aeronaval	Guayaquil	Artritis Reumatoidea	-	-	Para uso exclusivo de paciente autorizado.

29	H01AC01POI000X0	<b>SOMATOTROPINA</b>	Polvo para inyección	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Uso exclusivo de déficit de Homona de crecimiento confirmado	2	26/04/2018	Ficha para la evaluación de la efectividad Reporte Semestral
30	L04AC07SCI200X0	<b>TOCILIZUMAB</b>	Concentrado para solución para infusión 20 mg/mL	SI	IESS-Centro Ambulatorio Norte	Guayaquil	Artritis Reumatoidea	-	-	Para uso exclusivo de los cuatro pacientes autorizados.
31	B03AD04TAB361X0	<b>HIERRO (óxido de hierro polimaltosado) + ACIDO FOLICO</b>	Tableta 60 mg + 400 mcg	SI	MSP-Subsecretaría Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad	Quito	Anemia en el embarazo	3	-	Ingresó al CNMB 9 rev.
32	A06AB06TAB624X0	<b>GLICÓSIDOS DEL SENNA</b>	Tabletas 8,6 mg	SI	MSP-Dirección Nacional de Discapacidades, Rehabilitación y Cuidado Especial en Salud	Quito	Para el estreñimiento y prevención del estreñimiento en pacientes de cuidados paliativos	4	-	
33	A06AB06TAR624X0	<b>GLICÓSIDOS DEL SENNA</b>	Tableta recubierta 8,6 mg	SI	MSP-Dirección Nacional de Discapacidades, Rehabilitación y Cuidado Especial en Salud	Quito	Para el estreñimiento y prevención del estreñimiento en pacientes de cuidados paliativos	4	-	
34	A16AB02POF302X0	<b>IMIGLUCERASA</b>	Polvo para infusión 400 U	SI	MSP-Hospital Pablo Arturo Suárez	Quito	Gaucher tipo I	2	-	Ficha para la evaluación de efectividad Reporte Anual
35	J01CR04TAR282X0	<b>AMPICILINA + SULBACTAM (SULTAMICILINA)</b>	Tableta recubierta 375 mg	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Nivel Nacional	Uso exclusivo en patologías infecciosas en mujeres embarazadas	2	-	Se autoriza, califica con 2: Aporte en situaciones concretas, dado que es útil en mujeres embarazadas que lo requieran.
36	J01CR04TAR381X0	<b>AMPICILINA + SULBACTAM (SULTAMICILINA)</b>	Tableta recubierta 750 mg	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Nivel Nacional	Uso exclusivo en patologías infecciosas en mujeres embarazadas	2	-	Se autoriza, califica con 2: Aporte en situaciones concretas, dado que es útil en mujeres embarazadas que lo requieran.
37	V08AB05SOY000X0	<b>IOPROMIDA (SALES YODADAS NO IÓNICAS)</b>	Solución Inyectable	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Estudios contrastados de diagnóstico en tomografía, radiografía convencional (estudios especiales), en población pediátrica	4	-	Exclusivo para uso pediátrico
38	L01XC06SOS225X0	<b>CETUXIMAB</b>	Solución para perfusión 5 mg/mL	SI	FF.AA.-Hospital Especialidades Fuerzas Armadas (HE-1)	Quito	Cáncer de laringe EC IVA, cáncer de lengua EC IVA	-	-	
39	N03AX14TAB339X0	<b>LEVETIRACETAM</b>	Tableta 500 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Epilepsia refractaria	2	26/04/2018	No se autoriza como primera línea, solo para epilepsia refractaria. Ficha para la evaluación de efectividad Reporte Trimestral
40	N03AX14TAB067X0	<b>LEVETIRACETAM</b>	Tabletas 1 g	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Epilepsia refractaria	2	26/04/2018	No se autoriza como primera línea, solo para epilepsia refractaria. Ficha para la evaluación de efectividad Reporte Trimestral
41	N03AX14SOL112X0	<b>LEVETIRACETAM</b>	Solución oral 100 mg/mL	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Epilepsia refractaria	2	26/04/2018	No se autoriza como primera línea, solo para epilepsia refractaria. Ficha para la evaluación de efectividad Reporte Trimestral
42	L01XX14CAP091X0	<b>ÁCIDO - TRANS - RETINOICO (ATRA)</b>	Cápsula 10 mg	NO	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Nivel Nacional	Leucemia Promielocítica Aguda	4	-	Considera de primera línea en el manejo dela Leucemia Promielocítica Aguda
43	L01XX27SCI081X0	<b>TRÍOXIDO DE ARSÉNICO</b>	Solución concentrada para perfusión 1mg/mL	NO	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Nivel Nacional	Leucemia Promielocítica Aguda	4	-	Considera de primera línea en el manejo dela Leucemia Promielocítica Aguda
44	J01AA12POI329X0	<b>TIGECICLINA</b>	Polvo para inyección 50 mg	SI	MSP-Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	Quito	Control de brote de Klebsiella productora de carbapenemasa (KPC+)	2	-	Restringida a la aplicación de un protocolo integral validado
45	R06AA02JBE132G1	<b>DIFENHIDRAMINA</b>	Jarabe 12,5 mg/5 mL	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Nivel Nacional	Antihistaminico para uso sistémico	4	-	Concentración incluida a fin de facilitar los procesos de adquisición de medicamentos y favorecer el acceso al mismo.
46	J05AB06POI339X0	<b>GANCICLOVIR</b>	Sólido parenteral de 500 mg	SI	INDOT-Hospitales Acreditados por el INDOT	Quito	Pacientes trasplantados con infección por Citomegalovirus en quienes no es posible la administración de valganciclovir por tener impedimento de administración por vía oral.	2	-	Ficha para la evaluación de efectividad
47	L04AA04POI222X0	<b>INMUNOGLOBULINA ANTITIMOCÍTICA (CONEJO)</b>	Polvo para inyección 25 mg	NO	INDOT-Hospitales Acreditados por el INDOT	Quito	Agente inmunosupresor	4	-	Forma farmacéutica y concnetración incluida a fin de facilitar los procesos de adquisición de medicamentos y favorecer el acceso al mismo.
48	R03BA05SUH032X0	<b>FLUTICASONA</b>	Suspensión para inhalación 125 mcg	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Nivel Nacional	Padecimientos obstructivos de las vías áreas respiratorias	3	-	Se autoriza solo las concentraciones de 125 mcg y 250 mcg suspensión para inhalación.
49	R03BA05SUH230X0	<b>FLUTICASONA</b>	Suspensión para inhalación 250 mcg	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Nivel Nacional	Padecimientos obstructivos de las vías áreas respiratorias	3	-	Se autoriza solo las concentraciones de 125 mcg y 250 mcg suspensión para inhalación.
50	N03AX14TAB067X0	<b>LEVETIRACETAM</b>	Tabletas 1 g	SI	MSP-Hospital Pablo Arturo Suárez	Quito	Epilepsia focal sintomática post meningitis que cursa con crisis parciales simples y complejas.	-	-	Para uso exclusivo de paciente autorizado.
51	B03AB05SOL334X0	<b>HIERRO POLIMALTOSADO</b>	Solución oral 50 mg/mL (Gotas)	SI	MSP-Subsecretaría Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad	Quito	Manejo de la anemia ferropénica en pacientes pediátricos	-	-	
52	B03AB05JBE333X0	<b>HIERRO POLIMALTOSADO</b>	Jarabe 50 mg/5 mL	SI	MSP-Subsecretaría Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad	Quito	Manejo de la anemia ferropénica en pacientes pediátricos	-	-	
53	A16AB02POF302X0	<b>IMIGLUCERASA</b>	Polvo para infusión 400 U	SI	MSP-Hospital Abel Gilbert Pontón	Guayaquil	Enfermedad de Gaucher tipo I	2	-	Uso exclusivo de pacientes con enfermedad de Gaucher tipo I
54	A16AB02POF302X0	<b>IMIGLUCERASA</b>	Polvo para infusión 400 U	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Enfermedad de Gaucher tipo I	2	-	Ficha para la evaluación de efectividad
55	L01XE08CAP205X0	<b>NILOTINIB</b>	Cápsula 200 mg	SI	FF.AA.-Hospital Especialidades Fuerzas Armadas (HE-1)	Quito	Leucemia Mieloides Crónica Philadelphia (Phy) con cromosoma Philadelphia positivo con resistencia a Imatinib	-	24/05/2018	Ficha para la evaluación de efectividad
56	J05AF06SOL200X0	<b>ABACAIVIR</b>	Líquido oral 20 mg/ml	SI	MSP-Estrategia Nacional de VIH/SIDA-ETS	Quito	Infección por VIH, en combinación con otros antirretrovirales	2	-	
57	A16AB02POF302X0	<b>IMIGLUCERASA</b>	Polvo para infusión 400 U	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Enfermedad de Gaucher tipo I	-	-	Uso exclusivo de paciente autorizado con Enfermedad de Gaucher tipo I
58	V03AB35SOY112X0	<b>SUGAMMADEX</b>	Solución inyectable 100 mg/ml	SI	MSP-Hospital Pablo Arturo Suárez	Quito	Tratamiento del bloqueo neuromuscular persistente después del intento de reversión neuromuscular con altas dosis de neostigmina y atropina.	Emergencia	-	Para uso exclusivo de un paciente por emergencia
59	A16AB02POF302X0	<b>IMIGLUCERASA</b>	Polvo para infusión 400 U	SI	MSP-Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	Quito	Enfermedad de Gaucher tipo I	2	-	Uso exclusivo de paciente autorizado, con enfermedad de Gaucher tipo I
60	L04AD02CAP048X0	<b>TACROLIMO (TACROLIMUS)</b>	Cápsula 0,5 mg	SI	PN-Hospital Policía Nacional Quito No. 1	Quito	Mantenimiento contra rechazo del trasplante de riñón	2	-	Remitir lista de pacientes
61	L04AD02CAP073X0	<b>TACROLIMO (TACROLIMUS)</b>	Cápsula 1 mg	SI	PN-Hospital Policía Nacional Quito No. 1	Quito	Mantenimiento contra rechazo del trasplante de riñón	2	-	Remitir lista de pacientes
62	L04AD02CAP314X0	<b>TACROLIMO (TACROLIMUS)</b>	Cápsula 5 mg	SI	PN-Hospital Policía Nacional Quito No. 1	Quito	Mantenimiento contra rechazo del trasplante de riñón	2	-	Remitir lista de pacientes

63	L04AD02POS081F5	<b>TACROLIMO (TACROLIMUS)</b>	Polvo para suspensión oral 1 mg/mL	SI	PN-Hospital Policía Nacional Quito No. 1	Quito	Mantenimiento contra rechazo del trasplante de riñón	2	-	Remitir lista de pacientes
64	L04AD02SOY225A0	<b>TACROLIMO (TACROLIMUS)</b>	Solución inyectable 5 mg/mL	NO	PN-Hospital Policía Nacional Quito No. 1	Quito	Mantenimiento contra rechazo del trasplante de riñón	2	-	Remitir lista de pacientes
65	B01AD02POI329X0	<b>ALTEPLASA</b>	Polvo para inyección 50 mg	SI	MSP-Hospital Pablo Arturo Suárez	Quito	Tratamiento trombolítico del infarto agudo del miocardio con elevación del ST	Emergencia	-	Para uso exclusivo de un paciente por emergencia Ficha para la evaluación de efectividad
66	B01AD02POI329X0	<b>ALTEPLASA</b>	Polvo para inyección 50 mg	SI	IESS-Hospital Teodoro Maldonado Carbo	Quito	Tratamiento trombolítico del accidente cerebro vascular isquémico agudo	2	31/12/2017	Ficha para la evaluación de efectividad
67	C01EA01SOY204X0	<b>ALPROSTADIL</b>	Solución inyectable de 20 mcg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Vasculitis con úlceras isquémicas en miembros inferiores, no candidata a revascularización.	Emergencia	-	Para uso exclusivo de un paciente por emergencia
68	J01GB04SOY708A4	<b>KANAMICINA</b>	Solución inyectable de 1 g/4 ml	SI	MSP-Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control	Quito	Para el tratamiento de pacientes con Tuberculosis multi drogo resistente.	2	7/01/2018	Se autoriza para el tratamiento de pacientes con Tuberculosis multi drogo resistente.
69	J01MA14TAB296X0	<b>MOXIFLOXACINO</b>	Sólido oral 400 mg	SI	MSP-Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control	Quito	Para el tratamiento de pacientes con Tuberculosis multi drogo resistente.	2	7/01/2018	Se autoriza para el tratamiento de pacientes con Tuberculosis multi drogo resistente.
70	L01XE08CAP205X0	<b>NILOTINIB</b>	Cápsula 200 mg	SI	FF.AA.-Hospital Especialidades Fuerzas Armadas (HE-1)	Quito	Leucemia Mieloide Crónica con cromosoma Philadelphia positivo con resistencia a Imatinib y no presente la mutación T315I de BCR-ABL	2	29/01/2018	Ficha para la evaluación de utilización del medicamento, para uso exclusivo de una (1) paciente
71	C01EA01SOY593X0	<b>ALPROSTADIL</b>	Solución inyectable de 500 mcg	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Manejo de recién nacidos con cardiopatías ductus dependiente.	2	29/01/2018	Se autoriza para el mantenimiento de la apertura del conducto arterioso, hasta que sea realizada la cirugía paliativa o correctiva, en niños nacidos con defectos cardíacos congénitos que dependen de la permeabilidad de esta estructura para sobrevivir.
72	L01XC06SOS225X0	<b>CETUXIMAB</b>	Solución para perfusión 5 mg/mL	SI	SOLCA-Hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer-Núcleo Manabí	Manabí	Cáncer de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado	2	5/02/2018	Para uso exclusivo en pacientes con un estado clínico funcional Karnofsky igual o mayor a 90 y cuando la terapia en base a platinos esté contraindicada. Ficha de evaluación de efectividad
73	L04AB04SOY290X0	<b>ADALIMUMAB</b>	Solución inyectable de 40 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Enfermedad de Crohn, que no ha respondido a la terapia con Infiximab.	2	11/02/2018	Se autoriza para tratamiento de un (1) paciente con diagnóstico de Enfermedad de Crohn que no ha respondido a terapia con Infiximab.
74	C02KX01TAR141X0	<b>BOSENTANO</b>	Tableta recubierta 125 mg	SI	IESS-Hospital Manta	Manta	Hipertensión arterial pulmonar clase funcional III y IV	2	11/02/2018	Se autoriza para uso exclusivo de los pacientes de los cuales la unidad de salud remitió las fichas de evaluación de efectividad del medicamento
75	C01EA01SOY204X0	<b>ALPROSTADIL</b>	Solución inyectable de 20 mcg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Manejo de recién nacidos con cardiopatías ductus dependiente.	2	15/02/2018	Se autoriza para el mantenimiento de la apertura del conducto arterioso, hasta que sea realizada la cirugía paliativa o correctiva, en niños nacidos con defectos cardíacos congénitos que dependen de la permeabilidad de esta estructura para sobrevivir.
76	L01XE08CAP205X0	<b>NILOTINIB</b>	Cápsula 200 mg	SI	MSP-Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	Quito	Leucemia Mieloide Crónica con cromosoma Philadelphia positivo con resistencia a Imatinib y no presente la mutación T315I de BCR-ABL	2	18/02/2018	Ficha para la evaluación de utilización del medicamento, para uso exclusivo de pacientes con Leucemia Mieloide Crónica con cromosoma Philadelphia positivo con resistencia a Imatinib y no presente la mutación T315I de BCR-ABL
77	L01XE08CAP205X0	<b>NILOTINIB</b>	Cápsula 200 mg	SI	SOLCA-Hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer-Núcleo Loja	Loja	Leucemia Mieloide Crónica con cromosoma Philadelphia positivo con resistencia a Imatinib y no presente la mutación T315I de BCR-ABL	2	18/02/2018	Ficha para la evaluación de utilización del medicamento, para uso exclusivo de pacientes con Leucemia Mieloide Crónica con cromosoma Philadelphia positivo con resistencia a Imatinib y no presente la mutación T315I de BCR-ABL
78	C01EA01SOY204X0	<b>ALPROSTADIL</b>	Solución inyectable de 20 mcg	SI	IESS-Hospital Babahoyo	Babahoyo	Vasculitis con úlceras isquémicas en miembros inferiores, no candidata a revascularización.	2	18/02/2018	Se autoriza para el tratamiento de 5 (cinco) pacientes con diagnóstico de enfermedad vascular oclusiva periférica con isquemia crítica de miembros inferiores y presencia de lesiones isquémicas que evidencian complicaciones circulatorias severas
79	L03AB10SOY029X0	<b>PEGINTERFERÓN</b>	Solución inyectable de 100 mcg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Para el tratamiento de 11 pacientes con diagnóstico de Hepatitis crónica por virus C - HCC	2	10/03/2018	Se autoriza para el tratamiento de 11 pacientes con diagnóstico de Hepatitis crónica por virus C - HCC
80	J05AB04TAB205X0	<b>RIBAVIRINA</b>	Sólido oral 200 mcg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Para el tratamiento de 11 pacientes con diagnóstico de Hepatitis crónica por virus C - HCC	2	11/03/2018	Se autoriza para el tratamiento de 11 pacientes con diagnóstico de Hepatitis crónica por virus C - HCC
81	L01XE08CAP205X0	<b>NILOTINIB</b>	Cápsula 200 mg	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Leucemia Mieloide Crónica con cromosoma Philadelphia positivo con resistencia a Imatinib y no presente la mutación T315I de BCR-ABL	2	18/03/2018	Ficha para la evaluación de utilización del medicamento, para uso exclusivo de pacientes con Leucemia Mieloide Crónica con cromosoma Philadelphia positivo con resistencia a Imatinib y no presente la mutación T315I de BCR-ABL
82	L01XE08CAP205X0	<b>NILOTINIB</b>	Cápsula 200 mg	SI	PN-Hospital Policía Nacional Quito No. 1	Quito	Leucemia Mieloide Crónica con cromosoma Philadelphia positivo con resistencia a Imatinib y no presente la mutación T315I de BCR-ABL	2	18/03/2018	Ficha para la evaluación de utilización del medicamento, para uso exclusivo de pacientes con Leucemia Mieloide Crónica con cromosoma Philadelphia positivo con resistencia a Imatinib y no presente la mutación T315I de BCR-ABL
83	P01CC01TAB134X0	<b>NIFURTIMOX</b>	Tabletas 120 mg	SI	MSP-Estrategia de Prevención y Control	Quito	Enfermedad de Chagas	2	-	Se autoriza para el tratamiento de 68 pacientes con diagnóstico de Enfermedad de Chagas. Ficha de Reporte de los pacientes beneficiados, que incluya los resultados del avance terapéutico.
84	G03AC03SIL428X0	<b>LEVONORGESTREL</b>	Sistema Intrauterino de liberación 52 mg	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Sangrado menstrual abundante (menorragia)	2	-	Lista de las pacientes beneficiarias del medicamento, las condiciones que motivaron su uso y los resultados terapéuticos.
85	V03AB35SOY112X0	<b>SUGAMMADEX</b>	Solución inyectable 100 mg/ml	SI	MSP-Coordinaciones Zonales	Quito	Solo en caso de emergencia, para pacientes obesos, pacientes con problemas cardiorespiratorios/cardiacos, siempre y cuando estos pacientes desarrollen un bloqueo neuromuscular persistente después del intento de reversión neuromuscular con neostigmina en post-operatorio inmediato	2	15/04/2018	Para uso exclusivo en pacientes paciente por emergencia, remitir listas de pacientes a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos
86	B01AD02POI329X0	<b>ALTEPLASA</b>	Polvo para inyección 50 mg	SI	MSP-Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	Quito	Tratamiento trombolítico del accidente cerebro vascular isquémico agudo	2	21/04/2018	Ficha para la evaluación de efectividad, semestralmente
87	V08AB00SOY000X0	<b>SALES YODADAS NO IÓNICAS</b>	Solución Inyectable	SI	MSP-Hospital Provincial General Docente Riobamba	Riobamba	Estudios contrastados de diagnóstico en tomografía, radiografía convencional (estudios especiales)	4	-	

88	C08CA06TAB360X0	<b>NIMODIPINA</b>	Tableta 60 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Vasoespasma en pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática	2	23/04/2018	Ficha de reporte de pacientes
89	C08CA06TAB255X0	<b>NIMODIPINA</b>	Tableta 30 mg	SI	IESS-Hospital Teodoro Maldonado Carbo	Guayaquil	Hemorragia subaracnoidea aneurismática Enfermedad vascular isquémica	2	23/04/2018	Ficha de reporte de pacientes
90	C08CA06SOY096X0	<b>NIMODIPINA</b>	Solución inyectable 10 mg	SI	IESS-Hospital Teodoro Maldonado Carbo	Guayaquil	Hemorragia subaracnoidea aneurismática Enfermedad vascular isquémica	2	23/04/2018	Ficha de reporte de pacientes
91	B01AD02POI329X0	<b>ALTEPLASA</b>	Polvo para inyección 50 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Tratamiento trombolítico del accidente cerebro vascular isquémico agudo	2	26/04/2018	Ficha para la evaluación de efectividad, semestralmente
92	L01XX32POI250X0	<b>BORTEZOMIB</b>	Polvo para inyección 3,5 mg	SI	MSP-Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	Quito	Mieloma Múltiple	2	26/04/2018	Se autoriza para tratamiento de segunda línea en pacientes que se haya demostrado falla terapéutica a los medicamentos de primera línea o cuando el paciente no sea apto para trasplante de médula ósea, y con un estado clínico funcional Karnofsky de 80 o más.
93	L04AA27CAP048X0	<b>FINGOLIMOD</b>	Cápsula 0,5 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Esclerosis múltiple recurrente remitente	2	07/06/2018	Se autoriza la adquisición para tratamiento de un (1) paciente, remitir Ficha para la evaluación de efectividad Reporte Semestral
94	G04BE03SOR329X0	<b>SILDENAFILO</b>	Sólido oral 50 mg	SI	IESS-Subdirección Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud Pichincha	Quito	Hipertensión arterial pulmonar secundaria a secuelas post tuberculosis	2	09/06/2018	Se autoriza para el uso exclusivo de un (1) paciente remitir Ficha para la evaluación de efectividad Reporte Semestral
95	L01XC06SOS225X0	<b>CETUXIMAB</b>	Solución para perfusión 5 mg/mL	SI	MSP-Hospital Abel Gilbert Pontón	Guayaquil	Cáncer de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado	2	10/06/2018	Para uso exclusivo en pacientes con un estado clínico funcional Karnofsky igual o mayor a 90 y cuando la terapia en base a platinos esté contraindicada. Ficha de evaluación de efectividad, remitir semestralmente
96	N01BB52SOY711C1	<b>LIDOCAÍNA CON PINEFRINA</b>	Líquido parenteral 2 % + 1:80000 (cartucho dental)	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Nivel Nacional	Anestesia local o regional de uso odontológico	3	-	
97	A12CB01SOL097X0	<b>SULFATO DE ZINC</b>	Líquido oral 10 mg/ml	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Nivel Nacional	Diarrea Aguda	3	-	
98	N03AX14TAB339X0	<b>LEVETIRACETAM</b>	Sólido oral 500 mg	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Epilepsia refractaria	2	22/06/2018	No se autoriza como primera línea, solo para epilepsia refractaria Remitir semestralmente lista de pacientes
99	N03AX14TAB067X0	<b>LEVETIRACETAM</b>	Sólido oral 1 000 mg	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Epilepsia refractaria	2	22/06/2018	No se autoriza como primera línea, solo para epilepsia refractaria Remitir semestralmente lista de pacientes
100	N03AX14SOL112X0	<b>LEVETIRACETAM</b>	Líquido oral 100 mg/mL	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Epilepsia refractaria	2	22/06/2018	No se autoriza como primera línea, solo para epilepsia refractaria Remitir semestralmente lista de pacientes
101	J01AA12POI329X0	<b>TIGECICLINA</b>	Polvo para inyección 50 mg	SI	MSP-Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	Quito	Control de brote de Klebsiella productora de carbapenemasa (KPC +), cuando se considere que otros medicamentos no están indicados o no son adecuados.	2	-	Remitir a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, los criterios de elegibilidad de los pacientes, mecanismos de control y monitoreo del buen uso del medicamento.
102	C02KX01TAR449X0	<b>BOSENTANO</b>	Tableta recubierta 62,5 mg	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Hipertensión Arterial Pulmonar Primaria refractario a Sildenafil	2	17/09/2018	Uso exclusivo para paciente autorizado; remitir, Ficha para la evaluación de la efectividad de manera semestral.
103	C02KX01TAR141X0	<b>BOSENTANO</b>	Tableta recubierta 125 mg	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Hipertensión Arterial Pulmonar Primaria refractario a Sildenafil	2	17/09/2018	Uso exclusivo para paciente autorizado; remitir, Ficha para la evaluación de la efectividad de manera semestral.
104	L01XC06SOS225X0	<b>CETUXIMAB</b>	Solución para perfusión 5 mg/mL	SI	MSP-Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	Quito	Cáncer de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado	2	17/09/2018	Para pacientes con un estado clínico funcional Karnofsky igual o mayor a 90 y cuando la terapia en base a platinos esté contraindicada. Remitir semestralmente la ficha de evaluación de efectividad
105	H01AC01POI000X0	<b>SOMATOTROPINA</b>	Polvo para inyección	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Déficit de Homona de crecimiento	2	17/09/2018	Ficha para la evaluación de la efectividad Reporte Semestral
106	L04AA27CAP048X0	<b>FINGOLIMOD</b>	Cápsulas 0,5 mg	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Esclerosis Multiple	2	16/09/2018	Se autoriza para tratamiento de once (11) pacientes con diagnóstico de Esclerosis Múltiple de difícil manejo, recidivante y refractaria a tratamiento con interferones. Reporte semestral de la Ficha para la evaluación de la efectividad
107	A11CA01SOL336X0	<b>RETINOL (VITAMINA A)</b>	Solución oral de 50000 UI	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Nivel Nacional	Administración de suplementos de vitamina A a lactantes y niños de 6 a 59 meses de edad	4	-	
108	G03CA03PAT713X0	<b>ESTRADIOL</b>	Parche transdérmico	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Nivel Nacional	Tratamiento de pacientes con hipogonadismo femenino.	3	20/09/2018	Hasta que exista comercialización de Estradiol sólido oral de 1 mg
109	N06BC01SOY200X0	<b>CAFEÍNA</b>	Solución inyectable de 20 mg/mL	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Nivel Nacional	Apnea de la prematuridad	3	-	
110	C02KX01TAR449X0	<b>BOSENTANO</b>	Sólido oral 62,5 mg	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Hipertensión pulmonar primaria o secundaria de clase funcional III y IV	2	26/09/2018	Uso exclusivo para 4 pacientes autorizados, remitir semestralmente ficha de seguimiento
111	C02KX01TAR141X0	<b>BOSENTANO</b>	Sólido oral 125 mg	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Hipertensión pulmonar primaria o secundaria de clase funcional III y IV	2	26/09/2018	Uso exclusivo para 4 pacientes autorizados, remitir semestralmente ficha de seguimiento
112	V08AB00SOY000X0	<b>SALES YODADAS NO IÓNICAS</b>	Solución Inyectable	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Quito	Estudios contrastados de diagnóstico en tomografía, radiografía convencional (estudios especiales)	4	-	
113	J01AA12POI32900	<b>TIGECICLINA</b>	Polvo para inyección 50 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Control de brote de Klebsiella productora de carbapenemasa (KPC +), cuando se considere que otros medicamentos no están indicados o no son adecuados.	2	-	Remitir a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, los criterios de elegibilidad de los pacientes, mecanismos de control y monitoreo del buen uso del medicamento.
114	H01AC01POI000X0	<b>SOMATOTROPINA</b>	Polvo para inyección	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Déficit de Homona de crecimiento	2	5/10/2018	Ficha para la evaluación de la efectividad Reporte Semestral
115	L01XX32POI250X0	<b>BORTEZOMIB</b>	Polvo para inyección 3,5 mg	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Mieloma Múltiple	2	12/10/2018	Se autoriza para tratamiento de segunda línea en pacientes con mieloma múltiple en los casos en que se haya demostrado falla terapéutica a los medicamentos de primera línea o cuando el paciente no sea apto para trasplante de médula ósea, y con un estado clínico funcional Karnofsky de 80 o más. Remitir ficha para la evaluación de la efectividad, reporte semestral
116	N03AG01SOY112X0	<b>ÁCIDO VALPROICO</b>	Solución inyectable 100mg/mL	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Quito	Epilepsia con crisis tónico clónica generalizadas y mioclonias de difícil control	4	-	Se autoriza como alternativa intravenosa cuando no es factible temporalmente utilizar la vía de administración oral como monoterapia o tratamiento adjunto en pacientes con Epilepsia con crisis tónico clónica generalizadas y mioclonias de difícil control

117	B02BX04SOY230X0	<b>ROMIPLOSTIM</b>	Solución Inyectable 250 mcg	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Pacientes con diagnóstico de Púrpura Trombocitopénica Inmune refractarios a otros tratamientos	2	15/10/2018	Se autoriza para uso exclusivo en pacientes con Púrpura Trombocitopénica Idiopática, refractarios a Corticosteroides e Inmunoglobulina, Inmunosupresores como Azatioprina, Micofenolato y/o Ciclosporina, Esplenectomía, Rituximab y Eltrombopag, como última línea de tratamiento. Remitir ficha para la evaluación de la efectividad, reporte semestral.
118	B01AC24SOR400X0	<b>TICAGRELOR</b>	Sólido oral 90 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Pacientes con Síndrome Coronario Agudo - SCA de alto riesgo y para la prevención de trombosis aguda de stent que no responden a Clopidogrel.	2	-	Se autoriza para el tratamiento de pacientes con Síndrome Coronario Agudo - SCA de alto riesgo y para la prevención de trombosis aguda de stent que no responden a Clopidogrel. Remitir semestralmente lista de pacientes beneficiarios.
119	B01AC24SOR400X0	<b>TICAGRELOR</b>	Sólido oral 90 mg	SI	MSP-Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	Quito	Pacientes con Síndrome Coronario Agudo - SCA de alto riesgo y para la prevención de trombosis aguda de stent que no responden a Clopidogrel.	2	-	Se autoriza para el tratamiento de pacientes con Síndrome Coronario Agudo - SCA de alto riesgo y para la prevención de trombosis aguda de stent que no responden a Clopidogrel. Remitir semestralmente lista de pacientes beneficiarios.
120	V03AB35SOY112X0	<b>SUGAMMADEX</b>	Solución inyectable 100 mg/ml	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Quito	En caso de emergencia en pacientes con obesidad mórbida, pacientes con bloqueo neuromuscular profundo demostrado a través de monitorización de la función neuromuscular por la estimulación con Tren de cuatro estímulos - TOF, Pacientes con bloqueo neuromuscular persistente después del intento de reversión neuromuscular con Neostigmina, como terapia de rescate cuando "no se puede intubar, no se puede ventilar" situación potencialmente mortal cuando se usa Rocuronio.	2	-	Para uso exclusivo en situaciones catalogadas como emergencia. Remitir trimestralmente lista de pacientes beneficiarios a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos.
121	B02BX04SOY230X0	<b>ROMIPLOSTIM</b>	Solución Inyectable 250 mcg	SI	FF.AA.-Hospital Especialidades Fuerzas Armadas (HE-1)	Quito	Pacientes con diagnóstico de Púrpura Trombocitopénica Inmune refractarios a otros tratamientos	2	10/11/2018	Se autoriza para uso exclusivo en pacientes con Púrpura Trombocitopénica Idiopática, refractarios a Corticosteroides e Inmunoglobulina, Inmunosupresores como Azatioprina, Micofenolato y/o Ciclosporina, Esplenectomía, Rituximab y Eltrombopag, como última línea de tratamiento. Remitir ficha para la evaluación de la efectividad, reporte semestral.
122	H01AC01POI000X0	<b>SOMATOTROPINA</b>	Polvo para inyección	SI	MSP-Hospital General Docente Calderón	Quito	Déficit de Homona de crecimiento	2	-	Se autoriza para uso de los 3 pacientes con diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento; así como, para aquellos pacientes que cumplan con los criterios de inclusión, por el período de dos años, condicionado a la remisión semestral a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos de esta Cartera de Estado, de la ficha de seguimiento del uso del medicamento Somatotropina, con los resultados del avance terapéutico de los pacientes beneficiarios
123	B02BX04SOY230X0	<b>ROMIPLOSTIM</b>	Solución Inyectable 250 mcg	SI	MSP-Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	Quito	Pacientes con diagnóstico de Púrpura Trombocitopénica Inmune refractarios a otros tratamientos	2	21/11/2018	Se autoriza para uso exclusivo en pacientes con Púrpura Trombocitopénica Idiopática, refractarios a Corticosteroides e Inmunoglobulina, Inmunosupresores como Azatioprina, Micofenolato y/o Ciclosporina, Esplenectomía, Rituximab y Eltrombopag, como última línea de tratamiento. Remitir ficha para la evaluación de la efectividad, reporte semestral.
124	J01AA12POI329X0	<b>TIGECICLINA</b>	Polvo para inyección 50 mg	SI	PN-Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil No. 2	Guayaquil	Sepsis de Klebsiella productora de carbapenemasa (KPC +)	Emergencia	-	Se autoriza por emergencia para uso exclusivo de (1) paciente por peligro inminente para su vida.
125	J01AA12POI329X0	<b>TIGECICLINA</b>	Polvo para inyección 50 mg	SI	MSP-Hospital General Enríque Garcés	Quito	Control de brote de Klebsiella productora de carbapenemasa (KPC +), cuando se considere que otros medicamentos no están indicados o no son adecuados.	2	-	Remitir a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, los criterios de elegibilidad de los pacientes, mecanismos de control y monitoreo del buen uso del medicamento.
126	J01EE01SOY298X0	<b>COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA)</b>	Solución inyectable (400 mg + 80 mg)/5mL	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Condición clínica definida por el especialista	4	-	Se autoriza para solventar las necesidades de tratamiento de pacientes que son atendidos en las diferentes especialidades de la pediatría y para los cuales es necesario el uso de formas farmacéuticas adecuadas a cada grupo etario y condición clínica
127	G03AC03SIL428X0	<b>LEVONORGESTREL</b>	Sistema Intrauterino de Liberación 52 mg	SI	MSP-Gerencia Institucional de Implementación de Disminución de Mortalidad Materna.	Quito	Manejo de metrorragias, menorragias e hipermenorreas	-	-	Se autoriza para pacientes que presenten sangrado menstrual abundante (menorragia) de difícil control, remisión semestral de la lista de las pacientes beneficiarias del medicamento.
128	C02KX01TAR449X0	<b>BOSENTANO</b>	Sólido oral 62,5 mg	SI	MSP-Hospital Abel Gilbert Pontón	Guayaquil	Hipertensión pulmonar primaria o secundaria de clase funcional III y IV	2	25/11/2018	Se autoriza para uso exclusivo (1) paciente, con diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar severa, secundaria a cardiopatía congénita
129	C02KX01TAR141X0	<b>BOSENTANO</b>	Sólido oral 125 mg	SI	MSP-Hospital Abel Gilbert Pontón	Guayaquil	Hipertensión pulmonar primaria o secundaria de clase funcional III y IV	2	25/11/2018	Se autoriza para uso exclusivo un (1) paciente, con diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar severa, secundaria a cardiopatía congénita
130	G04CA52SOR714X0	<b>DUTASTERIDA + TAMSULOSINA</b>	Sólido oral 0,5 mg + 0,4 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Hiperplasia prostática benigna	2	11/12/2018	Se autoriza para uso exclusivo en pacientes con Hiperplasia prostática Benigna con sintomatología moderada o severa y en aquellos pacientes con un alto riesgo quirúrgico que no pueden ser intervenidos quirúrgicamente. Lista de los pacientes beneficiarios semestralmente.
131	C02KX01TAR449X0	<b>BOSENTANO</b>	Sólido oral 62,5 mg	SI	MSP-Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	Quito	Hipertensión pulmonar primaria o secundaria de clase funcional III y IV	2	11/12/2018	Se autoriza para uso exclusivo de dos (2) pacientes autorizados, con diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar severa, secundaria a cardiopatía congénita.
132	C02KX01TAR141X0	<b>BOSENTANO</b>	Sólido oral 125 mg	SI	MSP-Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	Quito	Hipertensión pulmonar primaria o secundaria de clase funcional III y IV	2	11/12/2018	Se autoriza para uso exclusivo de dos (2) pacientes autorizados, con diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar severa, secundaria a cardiopatía congénita. Remitir ficha de evaluación de la efectividad
133	C01EA01SOY204X0	<b>ALPROSTADIL</b>	Solución inyectable de 20 mcg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Enfermedad arterial oclusiva periférica, estadio III y IV, donde no fue posible un procedimiento de revascularización.	Emergencia	-	Se autoriza por emergencia, para un (1) paciente, con enfermedad arterial oclusiva periférica estadio III y IV, donde no fue posible un procedimiento de revascularización, con inminente peligro para la conservación de su integridad física por el posible riesgo de amputación. No implica la adquisición regular del medicamento por parte del Hospital.

134	B02BD05POI178X0	<b>FACTOR VII DE LA COAGULACIÓN (EPTACOG ALFA RECOMBINANTE)</b>	Polvo para inyección 2 mg	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Insuficiencia Hepática, ascitis, trastorno de la coagulación severa por déficit de Factor VII y Síndrome de Down.	Emergencia	-	Se autoriza por emergencia para uso exclusivo de un (1) paciente autorizado
135	H01AC01POI000X0	<b>SOMATOTROPINA</b>	Polvo para inyección	SI	IESS-Hospital San Francisco	Quito	Déficit de Homona de crecimiento	2	9/12/2018	Se autoriza para siete (7) pacientes. Ficha para la evaluación de la efectividad Reporte Semestral
136	B02BD05POI178X0	<b>FACTOR VII DE LA COAGULACIÓN</b>	Polvo para inyección 2 mg	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Hemofilia A severa e inhibidoresde alta respuesta al Factor VII	Emergencia	-	Se autoriza por emergencia para un (1) paciente la adquisición del medicamento Factor rFVIIa sólido parenteral 2 mg.
137	V08BA01POS000X0	<b>SULFATO DE BARIO CON AGENTES EN SUSPENSIÓN</b>	Polvo para suspensión (Oral)	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Quito	Estudios contrastados de diagnóstico en exploraciones de rayos x.	4	-	-
138	V08BA02POS000X0	<b>SULFATO DE BARIO SIN AGENTES EN SUSPENSIÓN</b>	Polvo para suspensión (Rectal)	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Quito	Estudios contrastados de diagnóstico en exploraciones de rayos x.	4	-	-
139	V08BA01SUS000X0	<b>SULFATO DE BARIO CON AGENTES EN SUSPENSIÓN</b>	Suspensión (Oral)	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Quito	Estudios contrastados de diagnóstico en exploraciones de rayos x.	4	-	-
140	B05XA02POL000X0	<b>BICARBONATO DE SÓDIO</b>	Sólido oral (Polvo)	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Acidosis metabólica crónica, tales como acidosis tubbular y enfermedad renal crónica, no diálisis	4	-	Se autoriza para tratamiento de acidosis metabólica crónica, tales como acidosis tubular y enfermedad renal crónica, no diálisis, en población pediátrica
141	A11DB00JBE000X0	<b>COMPLEJO B</b>	Jarabe	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Condición clínica definida por el especialista	4	-	Se autoriza para solventar las necesidades de tratamiento de pacientes que son atendidos en las diferentes especialidades de la pediatría y para los cuales es necesario el uso de formas farmacéuticas adecuadas a cada grupo etario y condición clínica
142	C10AA05SOR386X0	<b>ATORVASTATINA</b>	Sólido oral 80 mg	SI	MSP-Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	Quito	1. Síndrome Coronario Agudo de alto riesgo que requieren dosis altas de estatinas (80 mg) para manejo intensivo. 2. Síndrome Coronario Agudo de alto riesgo que requieren dosis altas de estatinas (80 mg) y serán sometidos a intervención coronaria percutánea.	2	13/01/2019	Se autoriza para tratamiento de: 1. Síndrome Coronario Agudo de alto riesgo que requieren dosis altas de estatinas (80 mg) para manejo intensivo. 2. Síndrome Coronario Agudo de alto riesgo que requieren dosis altas de estatinas (80 mg) y serán sometidos a intervención coronaria percutánea. Remisión semestral de Ficha de reporte de pacientes.
143	C10AA05SOR386X0	<b>ATORVASTATINA</b>	Sólido oral 80 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	1. Síndrome Coronario Agudo de alto riesgo que requieren dosis altas de estatinas (80 mg) para manejo intensivo. 2. Síndrome Coronario Agudo de alto riesgo que requieren dosis altas de estatinas (80 mg) y serán sometidos a intervención coronaria percutánea.	2	10/01/2019	Se autoriza para tratamiento de: 1. Síndrome Coronario Agudo de alto riesgo que requieren dosis altas de estatinas (80 mg) para manejo intensivo. 2. Síndrome Coronario Agudo de alto riesgo que requieren dosis altas de estatinas (80 mg) y serán sometidos a intervención coronaria percutánea. Remisión semestral de Ficha de reporte de pacientes.
144	L01XX32POI250X0	<b>BORTEZOMIB</b>	Polvo para inyección 3,5 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Mieloma Múltiple	2	30/01/2019	Se amplía la autorización de adquisición para uso de aquellos pacientes que cumplan el criterio de autorización emitido por este Portafolio con Oficio Nro. MSP-SNGSP-2014-0271 <b>"tratamiento de segunda línea en pacientes con mieloma múltiple en los casos en que se haya demostrado falla terapéutica a los medicamentos de primera línea o cuando el paciente no sea apto para trasplante de médula ósea, y con un estado clínico funcional Karnofsky de 80 o más"</b> . Remitir ficha para la evaluación de la efectividad, reporte semestral
145	L01XX32POI250X0	<b>BORTEZOMIB</b>	Polvo para inyección 3,5 mg	SI	SOLCA-Hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer- Núcleo de Portoviejo	Portoviejo	Mieloma Múltiple	2	30/01/2019	Se autoriza para tratamiento de segunda línea en pacientes con mieloma múltiple en los casos en que se haya demostrado falla terapéutica a los medicamentos de primera línea o cuando el paciente no sea apto para trasplante de médula ósea, y con un estado clínico funcional Karnofsky de 80 o más. Remitir ficha para la evaluación de la efectividad, reporte semestral
146	L01BB04SOY183X0	<b>CLADRIBINA</b>	Solución inyectable 2 mg/mL	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Leucemia de Células Pilosas	2	-	Se autoriza para uso exclusivo en pacientes con Leucemia de Células Pilosas. Remitir ficha de evaluación de efectividad del medicamento.
147	H01AC01POI000X0	<b>SOMATOTROPINA</b>	Polvo para inyección	SI	MSP-Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	Quito	Déficit de Homona de crecimiento	2	-	Se autoriza para uso exclusivo de 6 pacientes con diagnostico de deficit de hormona de crecimiento. Remitir ficha para la evaluación de la efectividad, reporte semestral
148	N05AH02SOR105X0	<b>CLOZAPINA</b>	Sólido oral, 100 mg	SI	MSP-Centro de Atención Ambulatoria Especializado "San Lazaro"	Quito	Esquizofrenia resistente a tratamiento convencional, y con recuento normal de leucocitos, en los cuales se deberá realizar de manera obligatoria un conteo de leucocitos semanalmente los 6 primeros meses y posteriormente cada 15 días.	2	31/01/2019	Se autoriza para tratamiento exclusivo de pacientes con esquizofrenia resistente a tratamiento convencional, y con recuento normal de leucocitos, en los cuales se deberá realizar de manera obligatoria un conteo de leucocitos semanalmente los 6 primeros meses y posteriormente cada 15 días. Remitir ficha para la evaluación de la efectividad, reporte semestral.
149	L04AA03SOY334X0	<b>INMUNOGLOBULINA ANTTIMOCÍTICA (EQUINA)</b>	Solución inyectable, 50 mg/mL	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Anemia aplásica severa	2	03/02/2019	Se autoriza para tratamiento de pacientes con diagnóstico de Anemia aplásica severa. Remitir ficha para la evaluación de la efectividad, reporte semestral.
150	N05CD08SOB000X0	<b>MIDAZOLAM</b>	Solución bucal	No	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Nivel Nacional	Crisis convulsivas en niños y adultos	4	-	Se autoriza para el tratamiento de crisis convulsivas aguas en niños y adultos cuando la vía intravenosa se dificulta
151	L01XC03SOY718X0	<b>TRASTUZUMAB</b>	Solución inyectable, 600 mg/5mL	SI	FFAA.-Hospital Especialidades Fuerzas Armadas (HE-1)	Quito	Cáncer de mama que presenta el receptor HER 2 positivo,	3	-	Remisión semestral a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos de la Ficha de Reporte de Pacientes
152	L01XC03SOY718X0	<b>TRASTUZUMAB</b>	Solución inyectable, 600 mg/5mL	SI	MSP-Hospital Abel Gilbert Pontón	Guayaquil	Cáncer de mama que presenta el receptor HER 2 positivo,	3	-	Remisión semestral a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos de la Ficha de Reporte de Pacientes
153	L01XC03SOY718X0	<b>TRASTUZUMAB</b>	Solución inyectable, 600 mg/5mL	SI	SOLCA-Hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer- Núcleo Ambato	Ambato	Cáncer de mama que presenta el receptor HER 2 positivo,	3	-	Remisión semestral a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos de la Ficha de Reporte de Pacientes
154	L01XC03SOY718X0	<b>TRASTUZUMAB</b>	Solución inyectable, 600 mg/5mL	SI	IESS-Hospital Teodoro Maldonado Carbo	Guayaquil	Cáncer de mama que presenta el receptor HER 2 positivo,	3	-	Remisión semestral a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos de la Ficha de Reporte de Pacientes
155	L01XC03SOY718X0	<b>TRASTUZUMAB</b>	Solución inyectable, 600 mg/5mL	SI	SOLCA-Hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer- Núcleo Quito	Quito	Cáncer de mama que presenta el receptor HER 2 positivo,	3	-	Remisión semestral a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos de la Ficha de Reporte de Pacientes

156	L01XC03SOY718X0	<b>TRASTUZUMAB</b>	Solución inyectable, 600 mg/5mL	SI	SOLCA-Hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer- Núcleo Loja	Loja	Cáncer de mama que presenta el receptor HER 2 positivo,	3	-	Remisión semestral a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos de la Ficha de Reporte de Pacientes
157	H01BA04POI073X0	<b>TERLIPRESINA</b>	Polvo para inyección, 1 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Sangramiento digestivo masivo	Emergencia	-	Se autoriza por emergencia para uso exclusivo de dos (2) pacientes, por peligro inminente de muerte, secundario al sangramiento digestivo masivo presentado por vórices esofágicas, secundarias a hipertensión portal.
158	B02BX05SOR222X0	<b>ELTROMBOPAG</b>	Sólido oral, 25 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Púrpura Trombocitopénica Idiopática refractaria a otros tratamientos	2	-	Se autoriza para uso exclusivo en pacientes adultos con Púrpura Trombocitopénica Idiopática, refractarios a Corticosteroides e Inmunoglobulina, Inmunosupresores como Azatioprina, Micofenolato y/o Ciclosporina, Rituximab y Esplenectomía, antes del uso de Romiplostim. Remisión semestral a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos de la Ficha de Evaluación
159	B02BX05SOR329X0	<b>ELTROMBOPAG</b>	Sólido oral, 50 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Púrpura Trombocitopénica Idiopática refractaria a otros tratamientos	2	-	Se autoriza para uso exclusivo en pacientes adultos con Púrpura Trombocitopénica Idiopática, refractarios a Corticosteroides e Inmunoglobulina, Inmunosupresores como Azatioprina, Micofenolato y/o Ciclosporina, Rituximab y Esplenectomía, antes del uso de Romiplostim. Remisión semestral a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos de la Ficha de Evaluación
160	B02BX04SOY230X0	<b>ROMIPLOSTIM</b>	Solución Inyectable, 250 mcg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Pacientes con diagnóstico de Púrpura Trombocitopénica Inmune refractarios a otros tratamientos	2	-	Se autoriza para uso exclusivo en pacientes con Púrpura Trombocitopénica Idiopática, refractarios a Corticosteroides e Inmunoglobulina, Inmunosupresores como Azatioprina, Micofenolato y/o Ciclosporina, Esplenectomía, Rituximab y Eltrombopag, como última línea de tratamiento. Remitir ficha para la evaluación de la efectividad, reporte semestral.
161	H01BA04POI073X0	<b>TERLIPRESINA</b>	Polvo para inyección, 1 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Sangramiento digestivo masivo	Emergencia	-	Se autoriza por emergencia para uso exclusivo de un (1) paciente, por peligro inminente de muerte, secundario al sangramiento digestivo masivo presentado por vórices esofágicas, secundarias a Cirrosis Hepática.
162	C01EA01SOY204X0	<b>ALPROSTADIL</b>	Solución inyectable de 20 mcg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Enfermedad arterial oclusiva periférica en estadio III - IV, con isquemia crítica del miembro inferior derecho, donde no fue posible un procedimiento de revascularización abierta, ni endovascular	Emergencia	-	Se autoriza por emergencia para uso exclusivo de un (1) paciente con enfermedad arterial oclusiva periférica en estadio III - IV, con isquemia crítica del miembro inferior derecho, donde no fue posible un procedimiento de revascularización abierta, ni endovascular, con inminente peligro para la conservación de su integridad física por el posible riesgo de amputación de la extremidad inferior derecha
163	B02BX05SOR329X0	<b>ELTROMBOPAG</b>	Sólido oral, 50 mg	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Púrpura Trombocitopénica Idiopática refractaria a otros tratamientos	2	-	1.- Se autoriza para pacientes adultos con Púrpura Trombocitopénica crónica inmune (idiopática) que han tenido una esplenectomía y cuya condición es refractaria a Corticosteroides e Inmunoglobulina. Inmunosupresores como Azatioprina, Micofenolato y/o Ciclosporina, Rituximab, antes del uso de Romiplostim; 2.- Tratamiento de segunda línea en pacientes adultos que no han tenido una esplenectomía porque la cirugía está contraindicada; sólo si, su condición es refractaria a los tratamientos activos estándar y terapias de rescate, o tienen enfermedad severa y un alto riesgo de sangrado que necesita cursos frecuentes de terapias de rescate. Remisión semestral a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos de la Ficha de Evaluación
164	L04AC07SCI200X0	<b>TOCILIZUMAB</b>	Concentrado para solución para infusión 20 mg/mL	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Artritis Reumatoidea	2	30/03/2019	Se autoriza para pacientes con diagnóstico artritis reumatoidea que han presentado refractariedad a los fármacos modificadores de la enfermedad-DMARD, bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa-TNFa (infliximab, etanercept) y Rituximab. Remitir semestralmente de la ficha de evaluación con los resultados del avance terapéutico.
165	B05AA01SOS202X0	<b>ALBÚMINA HUMANA</b>	Solución inyectable para infusión 20%	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Ascitis refractaria secundaria a falla hepática	2	30/03/2019	Se amplía la autorización para la adquisición para el tratamiento de pacientes con Ascitis refractaria secundaria a falla hepática. Remitir semestralmente la lista de pacientes beneficiarios.
166	J01AA12POI329X0	<b>TIGECICLINA</b>	Polvo para inyección 50 mg	SI	IESS-Hospital Teodoro Maldonado Carbo	Guayaquil	Control de brote de Klebsiella productora de carbapenemasa (KPC +), cuando se considere que otros medicamentos no están indicados o no son adecuados.	2	-	Remitir a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, los criterios de elegibilidad de los pacientes, mecanismos de control y monitoreo del buen uso del medicamento.
167	V08CA09SOY719X0	<b>GADOBUTROL</b>	Solución inyectable, 1mmol/mL	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Resonancia magnética de contraste mejorado	4	-	Elemento imprescindible en la realización de los estudios complementarios que apoyan el diagnóstico de ciertas patologías en los pacientes que lo requiera
168	L01XX32POI250X0	<b>BORTEZOMIB</b>	Polvo para inyección 3,5 mg	SI	FF.AA.-Hospital Especialidades Fuerzas Armadas (HE-1)	Quito	Mieloma Múltiple	2	12/04/2019	Se autoriza para un (1) paciente con diagnóstico de mieloma múltiple, con insuficiencia renal, candidato a trasplante autólogo, en el que se considera inadecuado el uso de Talidomida y no se recomienda el uso de Melfalán por el riesgo de deprimir la médula ósea, así como para aquellos pacientes que cumplan con estos criterios de inclusión, con el siguiente esquema de tratamiento: Bortezomib + Ciclofosfamida + Dexametasona. Remitir semestralmente la ficha de seguimiento de uso del medicamento.
169	L02BB04SOR290X0	<b>ENZALUTAMIDA</b>	Sólido oral, 40 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, asintomáticos o moderadamente sintomáticos, luego de la falla de terapia de privación de andrógenos en quienes la quimioterapia no ha sido clínicamente indicada.	2	17/04/2019	Se autoriza para aquellos pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, asintomáticos o moderadamente sintomáticos, luego de la falla de terapia de privación de andrógenos en quienes la quimioterapia no ha sido clínicamente indicada. Remitir semestralmente la Ficha de Seguimiento de uso del medicamento; así como el Informe Médico, en el que conste el avance terapéutico de los pacientes que cumplan criterios de inclusión.
170	H01AC01POI000X0	<b>SOMATOTROPINA</b>	Polvo para inyección	SI	FF.AA.-Hospital Especialidades Fuerzas Armadas (HE-1)	Quito	Déficit de Hormona de crecimiento	2	17/05/2019	Se autoriza para aquellos pacientes con diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento. Ficha de seguimiento de uso Reporte Semestral

171	L04AA27CAP048X0	<b>FINGOLIMOD</b>	Cápsulas 0,5 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Esclerosis Múltiple	2	-	Se autoriza para dos (2) pacientes con diagnóstico de "Esclerosis múltiple remitente recurrente", refractario a tratamiento previo con interferones; así como para aquellos pacientes que cumplan con criterios de inclusión. Remisión semestral de la ficha de seguimiento de uso del medicamento.
172	D08AC02SOT000X0	<b>CLORHEXIDINA</b>	Solución tópica	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Quito	Lavado pre-quirúrgico y post-quirúrgico de la piel	4	-	
173	D08AX01SOT000X0	<b>PERÓXIDO DE HIDROGENO</b>	Solución tópica	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Quito	Desinfectante y antiséptico de heridas	4	-	
174	B02BX05SOR329X0	<b>ELTROMBOPAG</b>	Sólido oral, 50 mg	SI	MSP-Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	Quito	Púrpura Trombocitopénica Idiopática refractaria a otros tratamientos	2	-	Sse autoriza para uso exclusivo en pacientes adultos con Púrpura Trombocitopénica Idiopática, refractarios a Corticosteroides e Inmunoglobulina, Inmunosupresores como Azatioprina, Micofenolato y/o Ciclosporina, Rituximab y Esplenectomía, antes del uso de Romiplostim. Remisión semestral a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos de la Ficha de Evaluación
175	L04AC075CI200X0	<b>TOCILIZUMAB</b>	Concentrado para solución para infusión 20 mg/mL	SI	IESS-Hospital General Machala	Machala	Artritis Reumatoidea	2	01/06/2019	Se autoriza para aquellos pacientes con diagnóstico de artritis reumatoidea como última línea de tratamiento cuando hayan presentadorefractariedad o tolerancia inadecuada a los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad-DMARD, bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa-TNFα (Infliximab, Etanercept) y Rituximab Remitir semestralmente de la ficha de seguimiento de uso del medicamento con los resultados del avance terapéutico.
176	B02BX04SOY230X0	<b>ROMIPILOSTIM</b>	Solución Inyectable, 250 mcg	SI	IESS-Hospital General Manuel Ygnacio Monteros	Loja	Pacientes con diagnóstico de Púrpura Trombocitopénica Inmune refractarios a otros tratamientos	2	-	Se autoriza para uso exclusivo en pacientes con Púrpura Trombocitopénica Idiopática, refractarios a Corticosteroides e Inmunoglobulina, Inmunosupresores como Azatioprina, Micofenolato y/o Ciclosporina, Esplenectomía, Rituximab y Eltrombopag, como última línea de tratamiento. Remitir semestralmente la ficha de seguimiento de uso
177	L01XE08CAP205X0	<b>NILOTINIB</b>	Cápsula 200 mg	SI	PN-Hospital Policía Nacional Quito No. 1	Quito	Leucemia Mieloide Crónica con cromosoma (PHI+), que no responden a Imatinib y no presentan la mutaciónT315I de BCR-ABL	2	7/06/2019	Se autoriza para el tratamiento de un (1) paciente, así como para aquellos con diagnóstico de Leucemia Mieloide Crónica (PHI+) que no responden a Imatinib y que no presenten la mutación T315I de BCR-ABL, debiendo el prescriptor evaluar el riesgo - beneficio del uso del medicamento, considerando los eventos adversos serios que pueden presentarse con su uso. Remitir ficha de seguimiento de uso del medicamento.
178	L01XE08CAP158X0	<b>NILOTINIB</b>	Cápsula 150 mg	SI	PN-Hospital Policía Nacional Quito No. 1	Quito	Leucemia Mieloide Crónica con cromosoma (PHI+), que no responden a Imatinib y no presentan la mutaciónT315I de BCR-ABL	2	7/06/2019	Se autoriza para el tratamiento de un (1) paciente, así como para aquellos con diagnóstico de Leucemia Mieloide Crónica (PHI+) que no responden a Imatinib y que no presenten la mutación T315I de BCR-ABL, debiendo el prescriptor evaluar el riesgo - beneficio del uso del medicamento, considerando los eventos adversos serios que pueden presentarse con su uso. Remitir ficha de seguimiento de uso del medicamento.
179	N03AX14TAB067X0	<b>LEVETIRACETAM</b>	Sólido oral 1000 mg	SI	PN-Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil No. 2	Guayaquil	Epilepsia refractaria	2	-	Se autoriza para el manejo de aquellos pacientes con epilepsia refractaria a medicamentos antiepilépticos que constan en el CNMB vigente.
180	B05ZASCH072X0	<b>BICARBONATO DE SÓDIO</b>	Solución concentrada para hemodiálisis, 8.4%	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Quito	Parte de la solución dializante (buffer) en los procesos de hemodiálisis.	4	-	
181	B05AA01SOS202X0	<b>ALBÚMINA HUMANA</b>	Solución inyectable para infusión 20%	SI	MSP-Hospital General Enrique Garcés	Quito	Hepatopatía crónica descompensada con complicaciones	2	-	Remitir lista de pacientes
182	L01XX32POI250X0	<b>BORTEZOMIB</b>	Polvo para inyección 3,5 mg	SI	SOLCA-Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador	Guayaquil	Mieloma Múltiple	2	23/06/2019	Se autoriza para tratamiento de segunda línea en pacientes con mieloma múltiple en los casos en que se haya demostrado falla terapéutica a los medicamentos de primera línea o cuando el paciente no sea apto para trasplante de médula ósea, y con un estado clínico funcional Karnofsky de 80 o más. Remitir ficha para la evaluación de la efectividad, reporte semestral
183	L01XC06SOS225X0	<b>CETUXIMAB</b>	Solución para perfusión 5 mg/mL	SI	SOLCA-Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador	Guayaquil	Cáncer de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado	2	23/06/2019	Se autoriza para tratamiento de cáncer de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, con un estado clínico funcional Karnofsky igual o mayor a 90 y cuando la terapia en base a platino esté contraindicada. Remitir semestralmente la ficha de seguimiento de uso
184	L01BB04SOY183X0	<b>CLADRIBINA</b>	Solución inyectable 2 mg/mL	SI	SOLCA-Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador	Guayaquil	Leucemia de Células Pilosas	2	23/06/2019	Se autoriza para uso exclusivo en pacientes con Leucemia de Células Pilosas. Remitir ficha de seguimiento de uso del medicamento.
185	L02BB04SOR290X0	<b>ENZALUTAMIDA</b>	Sólido oral, 40 mg	SI	SOLCA-Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador	Guayaquil	Cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, asintomáticos o moderadamente sintomáticos, luego de la falla de terapia de privación de andrógenos quienes la quimioterapia no ha sido clínicamente indicada.	2	23/06/2019	Se autoriza para aquellos pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, asintomáticos o moderadamente sintomáticos, luego de la falla de terapia de privación de andrógenos quienes la quimioterapia no ha sido clínicamente indicada. Remitir semestralmente la Ficha de Seguimiento de uso del medicamento; así como el Informe Médico, en el que conste el avance terapéutico de los pacientes que cumplan criterios de inclusión.
186	L04AA03SOY334X0	<b>INMUNOGLOBULINA ANTITIMOCÍTICA (EQUINA)</b>	Solución inyectable, 50 mg/mL	SI	SOLCA-Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador	Guayaquil	Anemia aplásica severa	2	23/06/2019	Se autoriza para tratamiento de pacientes con diagnóstico de Anemia aplásica severa. Remitir ficha de seguimiento de uso, reporte semestral.
187	L01XE08CAP205X0	<b>NILOTINIB</b>	Cápsula 200 mg	SI	SOLCA-Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador	Guayaquil	Leucemia Mieloide Crónica con cromosoma (PHI+), que no responden a Imatinib y no presentan la mutaciónT315I de BCR-ABL	2	23/06/2019	Se autoriza para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de Leucemia Mieloide Crónica (PHI+) que no responden a Imatinib y que no presenten la mutación T315I de BCR-ABL, debiendo el prescriptor evaluar el riesgo - beneficio del uso del medicamento, considerando los eventos adversos serios que pueden presentarse con su uso. Remitir ficha de seguimiento de uso del medicamento.

188	L01XE08CAP158X0	<b>NILOTINIB</b>	Cápsula 150 mg	SI	SOLCA-Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador	Guayaquil	Leucemia Mieloide Crónica con cromosoma (PHI+), que no responden a Imatinib y no presentan la mutaciónT315I de BCR-ABL	2	23/06/2019	Se autoriza para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de Leucemia Mieloide Crónica (PHI +) que no responden a Imatinib y que no presentan la mutación T315I de BCR-ABL, debiendo el prescriptor evaluar el riesgo - beneficio del uso del medicamento, considerando los eventos adversos serios que pueden presentarse con su uso. Remitir ficha de seguimiento de uso del medicamento.
189	L01XC03SOY718X0	<b>TRASTUZUMAB</b>	Solución inyectable, 600 mg/5mL	SI	SOLCA-Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador	Guayaquil	Cáncer de mama que presenta el receptor HER 2 positivo,	3	-	Remisión semestral a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos de la Ficha de Reporte de Pacientes
190	L04AA04POI222X0	<b>INMUNOGLOBULINA ANTITIMOCÍTICA (CONEJO)</b>	Polvo para inyección 25 mg	SI	SOLCA-Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador	Guayaquil	Agente inmunosupresor	4	-	Forma farmacéutica y concentración incluida a fin de facilitar los procesos de adquisición de medicamentos y favorecer el acceso al mismo.
191	C02KX01TAR449X0	<b>BOSENTANO</b>	Sólido oral 62,5 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Hipertensión pulmonar primaria o secundaria de clase funcional III y IV	2	26/06/2019	Se autoriza para tratamiento de (5) pacientes; así como para aquellos que se ajusten a los criterios de inclusión. Remisión semestral de la ficha de seguimiento de uso del medicamento.
192	C02KX01TAR141X0	<b>BOSENTANO</b>	Sólido oral 125 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Hipertensión pulmonar primaria o secundaria de clase funcional III y IV	2	26/06/2019	Se autoriza para tratamiento de (5) pacientes; así como para aquellos que se ajusten a los criterios de inclusión. Remisión semestral de la ficha de seguimiento de uso del medicamento.
193	N05CM18SOY720X0	<b>DEXMEDETOMIDINA</b>	Solución inyectable, 200 mcg/2mL	SI	MSP-Hospital General Enrique Garcés	Quito	Sedación en pacientes adultos de UCI	3	-	Se autoriza para sedación en pacientes adultos de UCI, que requieren un nivel de sedación no más profundo que la excitación en respuesta a la estimulación verbal (correspondiente a la escala de sedación aguda de Richmond [RASS] (0 a -3)
194	N05CM18SOY720X0	<b>DEXMEDETOMIDINA</b>	Solución inyectable, 200 mcg/2mL	SI	PN-Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil No. 2	Guayaquil	Sedación en pacientes adultos de UCI	3	-	Se autoriza para sedación en pacientes adultos de UCI, que requieren un nivel de sedación no más profundo que la excitación en respuesta a la estimulación verbal (correspondiente a la escala de sedación aguda de Richmond [RASS] (0 a -3)
195	L01XE08CAP205X0	<b>NILOTINIB</b>	Cápsula 200 mg	SI	MSP-Hospital Abel Gilbert Pontón	Guayaquil	Leucemia Mieloide Crónica con cromosoma (PHI+), que no responden a Imatinib y no presentan la mutaciónT315I de BCR-ABL	2	26/06/2019	Se autoriza para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de Leucemia Mieloide Crónica (PHI +) que no responden a Imatinib y que no presentan la mutación T315I de BCR-ABL, debiendo el prescriptor evaluar el riesgo - beneficio del uso del medicamento, considerando los eventos adversos serios que pueden presentarse con su uso. Remitir ficha de seguimiento de uso del medicamento.
196	L01XE08CAP158X0	<b>NILOTINIB</b>	Cápsula 150 mg	SI	MSP-Hospital Abel Gilbert Pontón	Guayaquil	Leucemia Mieloide Crónica con cromosoma (PHI+), que no responden a Imatinib y no presentan la mutaciónT315I de BCR-ABL	2	26/06/2019	Se autoriza para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de Leucemia Mieloide Crónica (PHI +) que no responden a Imatinib y que no presentan la mutación T315I de BCR-ABL, debiendo el prescriptor evaluar el riesgo - beneficio del uso del medicamento, considerando los eventos adversos serios que pueden presentarse con su uso. Remitir ficha de seguimiento de uso del medicamento.
197	L01XC06SOS225X0	<b>CETUXIMAB</b>	Solución para perfusión 5 mg/mL	SI	SOLCA-Hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer- Núcleo de Portoviejo	Portoviejo	Cáncer de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado	2	5/02/2018	Para uso exclusivo en pacientes con un estado clínico funcional Karnofsky igual o mayor a 90 y cuando la terapia en base a platinos esté contraindicada. Ficha de evaluación de efectividad
198	B02BX05SOR222X0	<b>ELTROMBOPAG</b>	Sólido oral, 25 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Trombocitopenia severa secundaria a Púrpura Trombocitopénica Inmune	Emergencia	-	Se autoriza exclusivamente para un (1) paciente con diagnóstico de Trombocitopenia severa secundaria a Púrpura Trombocitopénica Inmune, donde los expertos no han considerado pertinente realizar esplenectomía por tratarse de un paciente en edad pediátrica, sin respuesta a corticoterapia, ni a Ciclosporina como segunda línea de tratamiento, al momento Ciclosporinemia en rango terapéutico, con persistencia de la "trombocitopenia menor a 10 000plaquetas/ul", lo que ha provocado en varias ocasiones epistaxis de difícil control, además de alto riesgo de sangrado del Sistema Nervioso Central, con inminente peligro para la conservación de su integridad física por el posible riesgo de hemorragia y muerte
199	B02BX05SOR329X0	<b>ELTROMBOPAG</b>	Sólido oral, 50 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Trombocitopenia severa secundaria a Púrpura Trombocitopénica Inmune	Emergencia	-	Se autoriza exclusivamente para un (1) paciente con diagnóstico de Trombocitopenia severa secundaria a Púrpura Trombocitopénica Inmune, donde los expertos no han considerado pertinente realizar esplenectomía por tratarse de un paciente en edad pediátrica, sin respuesta a corticoterapia, ni a Ciclosporina como segunda línea de tratamiento, al momento Ciclosporinemia en rango terapéutico, con persistencia de la "trombocitopenia menor a 10 000plaquetas/ul", lo que ha provocado en varias ocasiones epistaxis de difícil control, además de alto riesgo de sangrado del Sistema Nervioso Central, con inminente peligro para la conservación de su integridad física por el posible riesgo de hemorragia y muerte
200	L04AC07SCI200X0	<b>TOCILIZUMAB</b>	Concentrado para solución para infusión 20 mg/mL	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Artritis Reumatoidea	2	20/06/2019	Se autoriza para aquellos pacientes con diagnóstico de artritis reumatoidea, como última línea de tratamiento cuando han presentado refractariedad o tolerancia inadecuada a los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad-DMARD, bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa-TNFα (Infliximab, Etanercept) y Rituximab. Remitir semestralmente la ficha de seguimiento de uso del medicamento.
201	L04AC07SCI200X0	<b>TOCILIZUMAB</b>	Concentrado para solución para infusión 20 mg/mL	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Artritis Idiopática juvenil	2	07/07/2019	Se autoriza para dos (2) pacientes con artritis idiopática juvenil y para aquellos pacientes que cumplan los criterios de inclusión, como última línea de tratamiento por presentar refractariedad a los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad-DMARD, y bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa-TNFα (Etanercept); previa evaluación riesgo-beneficio por parte del prescriptor. Remisión semestral de ficha de seguimiento de uso del medicamento

202	B01AC24SOR400X0	<b>TICAGRELOR</b>	Sólido oral 90 mg	SI	MSP-Hospital Abel Gilbert Pontón	Guayaquil	Pacientes con Síndrome Coronario Agudo - SCA de alto riesgo y para la prevención de trombosis aguda de stent que no responden a Clopidogrel.	2	-	Se autoriza para el tratamiento de pacientes con Síndrome Coronario Agudo - SCA de alto riesgo y para la prevención de trombosis aguda de stent que no responden a Clopidogrel. Remitir semestralmente lista de pacientes beneficiarios.
203	G04BE03SOR329X0	<b>SILDENAFILO</b>	Sólido oral 50 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Hipertensión arterial pulmonar en clase funcional II - IV NYHA	2	17/07/2019	Se autoriza para tres (3) pacientes, así como para aquellos pacientes que cumplan con el criterio de inclusión. Remisión semestral de ficha de seguimiento de uso
204	C01EA01SOY204X0	<b>ALPROSTADIL</b>	Solución inyectable de 20 mcg	SI	MSP-Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante	Guayaquil	Cardiopatías simples o complejas (Cardiopatías Ductus Dependientes) con estenosis severa o atresia pulmonar cuya circulación pulmonar depende exclusivamente del ductus	2	18/01/2019	Se autoriza para uso exclusivo en el mantenimiento de la apertura del conducto arterioso, hasta que sea realizada la cirugía paliativa o correctiva, en niños nacidos con defectos cardíacos congénitos que dependen de la permeabilidad de esta estructura para sobrevivir.
205	H01AC01POI000X0	<b>SOMATOTROPINA</b>	Polvo para inyección	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Déficit de Homona de crecimiento	2	-	Se autoriza para uso exclusivo de pacientes con diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento. Remitir ficha de seguimiento de uso, reporte semestral
206	L04AA03SOY334X0	<b>INMUNOGLOBULINA ANTITUMÓCICA (EQUINA)</b>	Solución inyectable, 50 mg/mL	SI	MSP-Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	Quito	Pacientes trasplantados	2	-	Se autoriza la adquisición del medicamento Inmunoglobulina antitumocítica equina, en tanto el medicamento Inmunoglobulina antitumocítica de conejo se comercializa de manera regular en el país.
207	B05AA01SOS202X0	<b>ALBÚMINA HUMANA</b>	Solución inyectable para infusión 20%	SI	PN-Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil No. 2	Guayaquil	Cirrosis hepática + sangrado digestivo alto porrotura de vórices esofágicas secundarias a hipertensión portal + hipoproteinemia	-	25/07/2019	Se autoriza para uso exclusivo de un (1) paciente, con diagnóstico de cirrosis hepática + sangrado digestivo alto porrotura de vórices esofágicas secundarias a hipertensión portal + hipoproteinemia, con peligro inminente de muerte; así como, para aquellos pacientes que cumplan con el siguiente criterio de inclusión: "Ascitis refractaria secundaria a falla hepática y asociado a hipoproteinemia que no responde a terapia conduréticos, que son sometidos a paracentesis evacuadoras masivas, a fin de evitar la disfunción circulatoria pos-paracentesis"
208	L04AB04SOY290X0	<b>ADALIMUMAB</b>	Solución inyectable de 40 mg	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Enfermedad de Crohn, que no ha respondido a la terapia con Infliximab.	2	31/07/2019	Se autoriza para tratamiento de aquellos paciente con diagnóstico de Enfermedad de Crohn que no ha respondido a terapia con Infliximab.
209	H01BA04POI073X0	<b>TERLIPRESINA</b>	Polvo para inyección, 1 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Várices esofágicas sangrantes	Emergencia	-	Se autoriza por emergencia para uso exclusivo de un (1) paciente, por presentar sangramiento digestivo masivo presentado por vórices esofágicas sangrantes, secundarias a hipertensión portal, con peligro inminente de muerte.
210	L04AA27CAP048X0	<b>FINGOLIMOD</b>	Cápsula 0,5 mg	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Esclerosis múltiple	2	01/08/2019	Se autoriza para un (1) paciente con diagnóstico de esclerosis múltiple refractario a tratamiento previo con interferones; así como, para aquellos pacientes que cumplan con el criterio de inclusión. Remisión semestral de la ficha de seguimiento de uso del medicamento.
211	L01XC06SOS225X0	<b>SETUXIMAB</b>	Solución para perfusión 5 mg/mL	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Cáncer de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado	2	3/08/2019	Se autoriza para el tratamiento de los pacientes con cáncer de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, con un estado clínico funcional Karnofsky igual o mayor a 90 y cuando la terapia en base a platinos esté contraindicada Remitir semestralmente la ficha de seguimiento de uso
212	C01EA01SOY204X0	<b>ALPROSTADIL</b>	Polvo para inyección, 1 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Isquemia crítica de ambas extremidades inferiores, Fontaine IV, RUTHERFORD G3 C5, que ha sido sometido a tres cirugías de revascularización de miembros inferiores	Emergencia	-	Se autoriza para uso exclusivo de un (1) paciente, por el peligro inminente para la conservación de su integridad física por el posible riesgo de amputación.
213	H01AC01POI000X0	<b>SOMATOTROPINA</b>	Polvo para inyección	SI	HOSNAG-Armada del Ecuador - Estación Aeronaval	Guayaquil	Déficit de Homona de crecimiento	2	25/08/2019	Se autoriza para uso de (3) tres pacientes con diagnóstico confirmado de déficit de hormona de crecimiento; así como, para aquellos pacientes que cumplan con los criterios de inclusión. Remisión semestral de ficha de seguimiento de uso.
214	N03AX14TAB339X0	<b>LEVETIRACETAM</b>	Tableta 500 mg	SI	MSP-Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante	Guayaquil	Epilepsia refractaria	2	25/08/2019	Se autoriza para el manejo de pacientes con epilepsia focal refractaria o asociada a intolerancia a medicamentos antiepilépticos que constan en el CNMB vigente. Remitir semestralmente de la ficha de seguimiento de uso del medicamento
215	N03AX14TAB067X0	<b>LEVETIRACETAM</b>	Tabletas 1 g	SI	MSP-Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante	Guayaquil	Epilepsia refractaria	2	25/08/2019	Se autoriza para el manejo de pacientes con epilepsia focal refractaria o asociada a intolerancia a medicamentos antiepilépticos que constan en el CNMB vigente. Remitir semestralmente de la ficha de seguimiento de uso del medicamento
216	N03AX14SOL112X0	<b>LEVETIRACETAM</b>	Solución oral 100 mg/mL	SI	MSP-Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante	Guayaquil	Epilepsia refractaria	2	25/08/2019	Se autoriza para el manejo de pacientes con epilepsia focal refractaria o asociada a intolerancia a medicamentos antiepilépticos que constan en el CNMB vigente. Remitir semestralmente de la ficha de seguimiento de uso del medicamento
217	L04AC07SCI200X0	<b>TOCILIZUMAB</b>	Concentrado para solución para infusión 20 mg/mL	SI	MSP-Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante	Guayaquil	Artritis Idiopática Juvenil	2	25/08/2019	Se autoriza para aquellos pacientes con diagnóstico de artritis idiopática juvenil, como última línea de tratamiento cuando presenten refractariedad a los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad no biológicos - DMARDs, y bloqueador del factor de necrosis tumoral alfa anti-TNFα (Etanercept) Remitir semestralmente de la ficha de seguimiento de uso del medicamento.
218	B05AA01SOS202X0	<b>ALBÚMINA HUMANA</b>	Solución inyectable para infusión 20%	SI	MSP-Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante	Quito	Hepatopatía crónica descompensada con complicaciones	2	25/08/2019	Se autoriza para pacientes con hepatopatía crónica descompensada con complicaciones. Remitir lista de pacientes
219	B01AD02POI329X0	<b>ALTEPLASA</b>	Polvo para inyección 50 mg	SI	MSP-Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante	Quito	Ictus isquémico agudo entre las 3 a 4 horas y media del inicio de los síntomas de ictus	2	25/08/2019	Se autoriza para el tratamiento fibrinolítico del ictus isquémico agudo entre las 3 a 4,5 horas del inicio de los síntomas. Remisión semestral de la ficha de seguimiento de uso del medicamento.
220	G04BE03SOR329X0	<b>SILDENAFILO</b>	Sólido oral 50 mg	SI	MSP-Hospital Abel Gilbert Pontón	Guayaquil	Hipertensión arterial pulmonar en clase funcional II - IV NYHA	2	25/08/2019	Se autoriza para uso en pacientes con hipertensión arterial pulmonar en clase funcional II - IV NYHA.

221	C02DB02SOR091X0	<b>HIDRALAZINA</b>	Sólido oral 10 mg	NO	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Hipertención moderada a severa, emergencias hipertensivas, e insuficiencia cardíaca	-	-	Se autoriza a fin de favorecer el <b>acceso del medicamento</b> Hidralazina sólido oral 10 mg a las pacientes que lo requieren, para el tratamiento de pacientes con hipertensión moderada a severa, emergencias hipertensivas, e insuficiencia cardíaca.
222	R07AX01GPI000X0	<b>ÓXIDO NÍTRICO</b>	Gas inhalado	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Trasplante Pulmonar	2	6/09/2019	Se autoriza pacientes con Hipertensión de la Arteria Pulmonar, tanto durante el quirúrgico, como en el área de cuidados intensivos, además como medida para mejorar la oxigenación en el caso de que exista Disfunción Primaria del Injerto y la presencia de Síndrome de Distress Respiratorio Agudo primario o secundario. Reporte trimestral de ficha de seguimiento de uso del medicamento Nota: De no recibirse la información de los pacientes y el seguimiento de los mismos, la presente autorización será revocada.
223	L04AB04SOY290X0	<b>ADALIMUMAB</b>	Solución inyectable de 40 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Enfermedad de Crohn, que no ha respondido a la terapia con Infliximab.	2	29/08/2019	Se autoriza para tratamiento de aquellos paciente con diagnóstico de Enfermedad de Crohn que no ha respondido a terapia con Infliximab. Remisión semestral de la ficha de seguimiento de uso del medicamento
224	H01BA04POI073X0	<b>TERLIPRESINA</b>	Polvo para inyección, 1 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Várices esofágicas sangrantes	Emergencia	-	Se autoriza la adquisición del medicamento Terlipresina, para uso exclusivo de uno (1) paciente por presentar sangramiento digestivo masivo presentado por várices esofágicas sangrantes, secundarias a hipertensión portal, con peligro inminente de muerte.
225	J01XX01POI067X0	<b>FOSFOMICINA</b>	Polvo para inyección, 1 g	SI	MSP-Hospital Pediátrico Baca Ortiz	Quito	Infecciones graves producidas por microorganismos resistentes a otros antibióticos presentes en el CNMB vigente (enterobacterias productoras de KPC, multiresistentes).	2	15/08/2019	Se autoriza para Infecciones graves producidas por microorganismos resistentes a otros antibióticos presentes en el CNMB vigente (enterobacterias productoras de KPC, multiresistentes), condicionada a la aplicación de un Protocolo integral validado, para lo cual el hospital deberá remitir los criterios de elegibilidad de los pacientes, mecanismo de control y monitoreo del uso del medicamento, mediante un informe trimestral del Comité de Infecciones donde se reporte el consumo de Fosfomicina, tasa de mortalidad de los pacientes y perfiles de resistencia de las enterobacteria
226	C01EA01SOY593X0	<b>ALPROSTADIL</b>	Solución inyectable de 500 mcg	SI	MSP-Hospital Gineco-obstétrico Luz Elena Arismendi	Quito	Cardiopatía compleja ductus dependiente	Emergencia	-	Se autoriza para uso en un (1) paciente recién nacido, con diagnóstico de Cardiopatía compleja ductus dependiente (Atresia Tricuspídea IB, Comunicación Interauricular Ostium Secundum), previo a la corrección quirúrgica, por peligro inminente de muerte; así como, para aquellos pacientes que requieran mantenimiento de la apertura del conducto arterioso, hasta que sea realizada la cirugía paliativa o correctiva, en niños nacidos con defectos cardíacos congénitos que dependen de la permeabilidad de esta estructura para sobrevivir.
227	L02BB04SOR290X0	<b>ENZALUTAMIDA</b>	Sólido oral, 40 mg	SI	FF.AA.-Hospital Especialidades Fuerzas Armadas (HE-1)	Quito	Cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, asintomáticos o moderadamente sintomáticos, luego de la falla de terapia de privación de andrógenos en quienes la quimioterapia no ha sido clínicamente indicada.	2	25/08/2019	Se autoriza para aquellos pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, asintomáticos o moderadamente sintomáticos, luego de la falla de terapia de privación de andrógenos en quienes la quimioterapia no ha sido clínicamente indicada. Remitir semestralmente la Ficha de Seguimiento de uso del medicamento; así como el Informe Médico, en el que conste el avance terapéutico de los pacientes que cumplan criterios de inclusión.
228	L02BB04SOR290X1	<b>ENZALUTAMIDA</b>	Sólido oral, 40 mg	SI	PN-Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil No. 2	Guayaquil	Cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, asintomáticos o moderadamente sintomáticos, luego de la falla de terapia de privación de andrógenos en quienes la quimioterapia no ha sido clínicamente indicada.	2	25/08/2019	Se autoriza para aquellos pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, asintomáticos o moderadamente sintomáticos, luego de la falla de terapia de privación de andrógenos en quienes la quimioterapia no ha sido clínicamente indicada. Remitir semestralmente la Ficha de Seguimiento de uso del medicamento; así como el Informe Médico, en el que conste el avance terapéutico de los pacientes que cumplan criterios de inclusión.
229	L01XC03SOY718X0	<b>TRASTUZUMAB</b>	Solución inyectable, 600 mg/5mL	SI	SOLCA-Hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer- Núcleo Machala	Machala	Cáncer de mama que presenta el receptor HER 2 positivo,	3	-	Remisión semestral a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos de la Ficha de Reporte de Pacientes
230	L02BB04SOR290X0	<b>ENZALUTAMIDA</b>	Sólido oral, 40 mg	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, asintomáticos o moderadamente sintomáticos, luego de la falla de terapia de privación de andrógenos en quienes la quimioterapia no ha sido clínicamente indicada.	2	15/09/2019	Se autoriza para aquellos pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, asintomáticos o moderadamente sintomáticos, luego de la falla de terapia de privación de andrógenos en quienes la quimioterapia no ha sido clínicamente indicada. Remitir semestralmente la Ficha de Seguimiento de uso del medicamento; así como el Informe Médico, en el que conste el avance terapéutico de los pacientes que cumplan criterios de inclusión.
231	L01XC06SOS225X0	<b>CETUXIMAB</b>	Solución para perfusión 5 mg/mL	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Cáncer de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado	2	15/09/2019	Se autoriza para tratamiento de cáncer de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado en pacientes con un estado clínico funcional Karnofsky igual o mayor a 90 y cuando la terapia en base a platino esté contraindicada. Remitir semestralmente la ficha de seguimiento de uso del medicamento
232	B02BX05SOR222X0	<b>ELTROMBOPAG</b>	Sólido oral, 25 mg	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Púrpura Trombocitopénica Idiopática refractaria a otros tratamientos	2	15/09/2019	Se autoriza para uso exclusivo en pacientes adultos con Púrpura Trombocitopénica Idiopática, refractarios a Corticosteroides e Inmunoglobulina, Inmunosupresores como Azatioprina, Micofenolato y/o Ciclosporina, Rituximab y Esplenectomía, antes del uso de Romiplostim. Remisión semestral la ficha de seguimiento de uso del medicamento

233	B02BX05SOR329X0	<b>ELTROMBOPAG</b>	Sólido oral, 50 mg	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Púrpura Trombocitopénica Idiopática refractaria a otros tratamientos	2	15/09/2019	Se autoriza para uso exclusivo en pacientes adultos con Púrpura Trombocitopénica Idiopática, refractarios a Corticosteroides e Inmunoglobulina, Inmunosupresores como Azatioprina, Micofenolato y/o Ciclosporina, Rituximab y Esplenectomía, antes del uso de Romiplostim. Remisión semestral de la ficha de seguimiento de uso del medicamento
234	L04AB04SOY290X0	<b>ADALIMUMAB</b>	Líquido parenteral 40 mg	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Enfermedad de Crohn, que no ha respondido a la terapia con Infliximab.	2	15/09/2019	Se autoriza para tratamiento de aquellos paciente con diagnóstico de Enfermedad de Crohn que no ha respondido a terapia con Infliximab. Remisión semestral de la ficha de seguimiento de uso del medicamento
235	N03AX14TAB339X0	<b>LEVETIRACETAM</b>	Tableta 500 mg	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Epilepsia refractaria	2	15/09/2019	Se autoriza para pacientes con epilepsia focal refractaria o asociada a intolerancia a medicamentos antiepilépticos que constan en el CNMB vigente. No se autoriza como primera línea. Remitir semestralmente la lista de pacientes beneficiarios
236	N03AX14TAB067X0	<b>LEVETIRACETAM</b>	Tabletas 1 g	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Epilepsia refractaria	2	15/09/2019	Se autoriza para pacientes con epilepsia focal refractaria o asociada a intolerancia a medicamentos antiepilépticos que constan en el CNMB vigente. No se autoriza como primera línea. Remitir semestralmente la lista de pacientes beneficiarios
237	N03AX14SOL112X0	<b>LEVETIRACETAM</b>	Solución oral 100 mg/mL	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Epilepsia refractaria	2	15/09/2019	Se autoriza para pacientes con epilepsia focal refractaria o asociada a intolerancia a medicamentos antiepilépticos que constan en el CNMB vigente. No se autoriza como primera línea. Remitir semestralmente la lista de pacientes beneficiarios
238	G03AC03SIL428X0	<b>LEVONORGESTREL</b>	Sistema Intrauterino de Liberación 52 mg	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Manejo de metrorragias, menorragias e hipermenorreas	2	15/09/2019	Se autoriza para pacientes que presenten sangrado menstrual abundante (menorragia) de difícil control, remisión semestral de la lista de las pacientes beneficiarias del medicamento.
239	C01EA01SOY593X0	<b>ALPROSTADIL</b>	Solución inyectable de 500 mcg	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Manejo de recién nacidos con cardiopatías ductus dependiente.	2	15/09/2019	Se autoriza para el mantenimiento de la apertura del conducto arterioso, hasta que sea realizada la cirugía paliativa o correctiva, en niños nacidos con defectos cardíacos congénitos que dependen de la permeabilidad de esta estructura para sobrevivir. Remitir semestralmente la lista de pacientes beneficiarios.
240	B01AC24SOR400X0	<b>TICAGRELOR</b>	Sólido oral ,90 mg	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Pacientes con Síndrome Coronario Agudo - SCA de alto riesgo y para la prevención de trombosis aguda de stent que no responden a Clopidogrel.	2	15/09/2019	Se autoriza para el tratamiento de pacientes con Síndrome Coronario Agudo - SCA de alto riesgo y para la prevención de trombosis aguda de stent que no responden a Clopidogrel. Remitir semestralmente lista de pacientes beneficiarios.
241	B02BD03POI348X0	<b>COMPLEJO PROTROMBÍNICO ACTIVADO (aPCC o FEIBA)</b>	Polvo para inyección 500 UI	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Hemofilia A y hemofilia B que desarrollen anticuerpos contra los factores de la coagulación VIII o IX deficitario	2	15/09/2019	Remitir lista de pacientes
242	L03AB10SOY029X0	<b>PEGINTERFERÓN</b>	Solución inyectable de 100 mcg	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Hepatitis crónica por virus C-HCC	2	15/09/2019	Se autoriza para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de Hepatitis crónica por virus C - HCC. Remitir semestralmente ficha de seguimiento de uso del medicamento
243	J05AB04TAB205X0	<b>RIBAVIRINA</b>	Sólido oral 200 mcg	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Hepatitis crónica por virus C-HCC	2	15/09/2019	Se autoriza para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de Hepatitis crónica por virus C - HCC. Remitir semestralmente ficha de seguimiento de uso del medicamento
244	J01AA12POI329X0	<b>TIGECICLINA</b>	Polvo para inyección 50 mg	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Control de brote de Klebsiella productora de carbapenemasa (KPC +), cuando se considere que otros medicamentos no están indicados o no son adecuados.	2	15/09/2019	Restringida a la aplicación de un protocolo integral validado, para lo cual la Institución deberá remitir los criterios de elegibilidad de los pacientes, mecanismos de control y monitoreo del buen uso del medicamento. Remitir semestralmente la lista de pacientes beneficiarios
245	B05AA01SOS202X0	<b>ALBÚMINA HUMANA</b>	Solución inyectable para infusión 20%	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Ascitis refractaria secundaria a falla hepática	2	28/09/2019	Remitir lista de pacientes beneficiarios
246	L01XX14CAP091X0	<b>ÁCIDO - TRANS - RETINOICO (ATRA)</b>	Cápsula 10 mg	NO	SOLCA-Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador	Guayaquil	Leucemia Promielocítica Aguda	4	23/06/2019	Se autoriza como primera línea de tratamiento en el manejo de la Leucemia Promielocítica Aguda
247	L01XX27SCI081X0	<b>TRIOXIDO DE ARSÉNICO</b>	Solución concentrada para perfusión 1mg/mL	NO	SOLCA-Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador	Guayaquil	Leucemia Promielocítica Aguda	4	23/06/2019	Se autoriza como primera línea de tratamiento en el manejo de la Leucemia Promielocítica Aguda
248	B01AD02POI329X0	<b>ALTEPLASA</b>	Polvo para inyección 50 mg	SI	SOLCA-Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador	Guayaquil	Ictus isquémico agudo entre las 3 a 4 horas y media del inicio de los síntomas de ictus	2	20/09/2019	Se autoriza para el tratamiento fibrinolítico del ictus isquémico agudo entre las 3 a 4,5 horas del inicio de los síntomas. Remisión semestral de la ficha de seguimiento de uso del medicamento.
249	B02BD03POI348X0	<b>COMPLEJO PROTROMBÍNICO ACTIVADO (aPCC o FEIBA)</b>	Polvo para inyección 500 UI	SI	SOLCA-Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador	Guayaquil	Hemofilia A y hemofilia B que desarrollen anticuerpos contra los factores de la coagulación VIII o IX deficitario	2	20/09/2019	Remitir lista de pacientes
250	V03AB35SOY112X0	<b>SUGAMMADEX</b>	Solución inyectable 100 mg/ml	SI	SOLCA-Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador	Guayaquil	Solo en caso de emergencia para pacientes con obesidad mórbida, pacientes con bloqueo neuromuscular profundo demostrado a través de monitorización de la función neuromuscular por la estimulación con Tren de cuatro estímulos - TOF, Pacientes con bloqueo neuromuscular persistente después del intento de reversión neuromuscular con Neostigmina, como terapia de rescate cuando "no se puede intubar, no se puede ventilar" situación potencialmente mortal cuando se usa Rocuronio.	2	20/09/2019	Para uso exclusivo en situaciones catalogadas como emergencia. Remitir trimestralmente lista de pacientes beneficiarios a la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos.
251	J01AA12POI329X0	<b>TIGECICLINA</b>	Polvo para inyección 50 mg	SI	SOLCA-Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador	Guayaquil	Control de brote de Klebsiella productora de carbapenemasa (KPC +), cuando se considere que otros medicamentos no están indicados o no son adecuados.	2	20/09/2019	Restringida a la aplicación de un protocolo integral validado, para lo cual la Institución deberá remitir los criterios de elegibilidad de los pacientes, mecanismos de control y monitoreo del buen uso del medicamento. Remitir semestralmente la lista de pacientes beneficiarios

252	B01AD02POI329X0	<b>ALTEPLASA</b>	Polvo para inyección 50 mg	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Ictus isquémico agudo entre las 3 a 4 horas y media del inicio de los síntomas de ictus	2	27/09/2019	Se autoriza para el tratamiento fibrinolítico del ictus isquémico agudo entre las 3 a 4,5 horas del inicio de los síntomas. Remisión semestral de la ficha de seguimiento de uso del medicamento
253	C02KX01TAR449X0	<b>BOSENTANO</b>	Sólido oral 62,5 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Pacientes candidatos a trasplante pulmonar con hipertensión pulmonar grado III - IV de la OMS, que no responden a Sildenafil	2	05/10/2019	Se autoriza para tratamiento de pacientes candidatos a trasplante pulmonar con hipertensión pulmonar grado III - IV de la OMS, que no responden a Sildenafil. Remitir trimestralmente la Ficha de seguimiento de uso del medicamento.
254	C02KX01TAR141X0	<b>BOSENTANO</b>	Sólido oral 125 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Pacientes candidatos a trasplante pulmonar con hipertensión pulmonar grado III - IV de la OMS, que no responden a Sildenafil	2	05/10/2019	Se autoriza para tratamiento de pacientes candidatos a trasplante pulmonar con hipertensión pulmonar grado III - IV de la OMS, que no responden a Sildenafil. Remitir trimestralmente la Ficha de seguimiento de uso del medicamento.
255	B01AD02POI329X0	<b>ALTEPLASA</b>	Polvo para inyección 50 mg	SI	IESS-Hospital General Ambato	Ambato	Ictus isquémico agudo entre las 3 a 4 horas y media del inicio de los síntomas de ictus	2	05/10/2019	Se autoriza para el tratamiento fibrinolítico del ictus isquémico agudo entre las 3 a 4,5 horas del inicio de los síntomas. Remisión semestral de la ficha de seguimiento de uso del medicamento.
256	G04BE03SOR329X0	<b>SILDENAFILO</b>	Sólido oral 50 mg	SI	MSP-Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante	Guayaquil	Hipertensión arterial pulmonar en clase funcional II - IV NYHA	2	06/10/2019	Se autoriza para uso en pacientes de 0 a 15 años de edad con hipertensión arterial pulmonar en clase funcional II - IV NYHA
257	B05CX03SPI001X0	<b>GLICINA</b>	Solución para irrigación, 1.5%	SI	IESS - Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Irrigación de pacientes sometidos a diferentes procedimientos urológicos	-	-	Se autoriza a fin de favorecer el acceso del medicamento; y, considerando que Glicina cuenta con registro sanitario como medicamento, debiendo el médico prescriptor evaluar el riesgo-beneficio de su uso.
258	B01AC09POI048X0	<b>EPOPROSTENOL</b>	Polvo para solución para perfusión 0,5 mg	NO	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Pacientes candidatos a trasplante pulmonar con hipertensión pulmonar del grupo 1 en clase funcional III - IV de la OMS, que no responden a terapia que incluye Sildenafil oral, Bosentano, ni Iloprost inhalado	2	06/10/2019	Se autoriza para pacientes candidatos a trasplante pulmonar con hipertensión pulmonar del grupo 1 en clase funcional III - IV de la OMS, que no responden a terapia que incluye Sildenafil oral, Bosentano, ni Iloprost inhalado. Nota: De no recibirse la información de los pacientes y el seguimiento de los mismos, la presente autorización será revocada.
259	B01AC09POI048X0	<b>EPOPROSTENOL</b>	Polvo para solución para perfusión 1,5 mg	NO	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Pacientes candidatos a trasplante pulmonar con hipertensión pulmonar del grupo 1 en clase funcional III - IV de la OMS, que no responden a terapia que incluye Sildenafil oral, Bosentano, ni Iloprost inhalado	2	06/10/2019	Se autoriza para pacientes candidatos a trasplante pulmonar con hipertensión pulmonar del grupo 1 en clase funcional III - IV de la OMS, que no responden a terapia que incluye Sildenafil oral, Bosentano, ni Iloprost inhalado. Nota: De no recibirse la información de los pacientes y el seguimiento de los mismos, la presente autorización será revocada.
260	L04AC07SCI200X0	<b>TOCILIZUMAB</b>	Concentrado para solución para infusión 20 mg/mL	SI	IESS-Hospital General Manuel Ygnacio Montero	Loja	Artritis Reumatoidea	2	16/10/2019	Se autoriza para aquellos pacientes con diagnóstico de artritis reumatoidea, como última línea de tratamiento cuando han presentado refractariedad o tolerancia inadecuada a los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad-DMARD, bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa-TNFα (Infliximab, Etanercept) y Rituximab. Remitir semestralmente la ficha de seguimiento de uso del medicamento.
261	G04BE03SOR329X0	<b>SILDENAFILO</b>	Sólido oral 50 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Hipertensión arterial pulmonar en clase funcional II - IV NYHA	2	16/10/2019	Se autoriza para uso en pacientes con hipertensión arterial pulmonar en clase funcional II - IV NYHA. Remisión semestral de la ficha de seguimiento de uso del medicamento
262	L01XX32POI250X0	<b>BORTEZOMIB</b>	Polvo para inyección 3,5 mg	SI	MSP-Hospital Abel Gilbert Pontón	Guayaquil	Mieloma Múltiple	2	20/10/2019	Se autoriza para tratamiento de segunda línea en pacientes con mieloma múltiple en los casos en que se haya demostrado falla terapéutica a los medicamentos de primera línea o cuando el paciente no sea apto para trasplante de médula ósea, y con un estado clínico funcional Karnofsky de 80 o más. Remisión semestral de la ficha de seguimiento de uso del medicamento
263	L04AA29SOR314X0	<b>TOFACITINIB</b>	Sólido oral, 5 mg	SI	MSP-Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	Quito	Artritis reumatoide refractaria	2	15/05/2019	Se autoriza para uso exclusivo de una (1) paciente autorizada conforme epicrisis remitida por el establecimiento de salud. Siendo responsabilidad del hospital y del médico prescriptor evaluar el riesgo-beneficio de su uso. Remisión semestral de la ficha de seguimiento de uso del medicamento.
264	L04AA29SOR314X0	<b>TOFACITINIB</b>	Sólido oral, 5 mg	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Artritis reumatoide refractaria	2	31/07/2019	Se autoriza para uso exclusivo de dos (2) pacientes autorizados conforme epicrisis remitida por el establecimiento de salud. Siendo responsabilidad del hospital y del médico prescriptor evaluar el riesgo-beneficio de su uso. Remisión semestral de la ficha de seguimiento de uso del medicamento.
265	L04AC07SCI200X0	<b>TOCILIZUMAB</b>	Concentrado para solución para infusión 20 mg/mL	SI	MSP-Hospital Pablo Arturo Suárez	Quito	Artritis Reumatoidea	2	19/10/2019	Se autoriza para aquellos pacientes con diagnóstico de artritis reumatoidea, como última línea de tratamiento cuando han presentado refractariedad o tolerancia inadecuada a los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad-DMARD, bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa-TNFα (Infliximab, Etanercept) y Rituximab. Remitir semestralmente la ficha de seguimiento de uso del medicamento.
266	L04AC07SCI200X0	<b>TOCILIZUMAB</b>	Concentrado para solución para infusión 20 mg/mL	SI	MSP-Hospital Pablo Arturo Suárez	Quito	Artritis Idiopática Juvenil	2	19/10/2019	Se autoriza como última línea de tratamiento cuando el paciente han presentado refractariedad o tolerancia inadecuada a los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad-DMARD, y a los bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa-TNFα (Etanercept). Remitir semestralmente la ficha de seguimiento de uso del medicamento.
267	L04AA27CAP048X0	<b>FINGOLIMOD</b>	Cápsulas 0,5 mg	SI	MSP-Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	Quito	Esclerosis Múltiple	2	30/10/2019	Se autoriza para aquellos pacientes con diagnóstico de "Esclerosis múltiple remitente recurrente", refractario a tratamiento previo con interferones. Remisión semestral de la ficha de seguimiento de uso del medicamento.

268	B01AC11SOI608X0	<b>ILOPROST</b>	Solución para inhalación 0.010mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Trasplante Pulmonar	2	30/10/2019	Se autoriza para el tratamiento de pacientes candidatos a trasplante pulmonar con hipertensión arterial pulmonar clase funcional III-IV de la OMS, que no respondan a terapia con Sildenafil oral y Bosentano. Remisión trimestral de la ficha de seguimiento de uso. Nota: De no recibirse la información de los pacientes y el seguimiento de los mismos, la presente autorización será revocada.
269	R03AK06SUH573X0	<b>SALMETEROL + FLUTICASONA</b>	Suspensión para inhalación 25 mcg + 125 mcg	SI	IESS - Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Enfermedad Pulmonar Oclusiva Crónica - EPOC en pacientes candidatos a Trasplante de pulmón	2	6/11/2019	Se autoriza para los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica candidatos a Trasplante Pulmonar. Remisión trimestral de ficha de seguimiento de uso del medicamento Nota: De no recibirse la información de los pacientes y el seguimiento de los mismos, la presente autorización será revocada.
270	R03AK06SUH715X0	<b>SALMETEROL + FLUTICASONA</b>	Suspensión para inhalación 25 mcg + 250 mcg	SI	IESS - Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Enfermedad Pulmonar Oclusiva Crónica - EPOC en pacientes candidatos a Trasplante de pulmón	2	6/11/2019	Se autoriza para los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica candidatos a Trasplante Pulmonar. Remisión trimestral de ficha de seguimiento de uso del medicamento Nota: De no recibirse la información de los pacientes y el seguimiento de los mismos, la presente autorización será revocada.
271	M01AB15SOY564X0	<b>KETOROLACO</b>	Líquido parenteral, 30 mg/2mL	SI	MSP-Hospital General Docente Calderón	Quito	No consta en catalogo electrónico del SERCOP	-	-	Se autoriza la adquisición del medicamento Ketorolaco 30 mg/2 mL, en tanto el Ketorolaco 30 mg/mL consta nuevamente en el catálogo electrónico.
272	D08AG02SOT722X0	<b>YODO POVIDONA</b>	7.5 %	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Registro sanitario como medicamento	-	-	Se autoriza considerando que dicho producto cuenta con registro sanitario como medicamento y con la finalidad de favorecer su acceso a la población que lo requiere.
273	D08AG02SOT088X0	<b>YODO POVIDONA</b>	10 %	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Registro sanitario como medicamento	-	-	Se autoriza considerando que dicho producto cuenta con registro sanitario como medicamento y con la finalidad de favorecer su acceso a la población que lo requiere.
274	D08AC52SOT000X0	<b>GLUCONATO DE CLORHEXIDINA + ALCOHOL ISOPROPILICO</b>	Líquido cutáneo, 2% + 70%	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Registro sanitario como medicamento	-	-	Se autoriza considerando que dicho producto cuenta con registro sanitario como medicamento y con la finalidad de favorecer su acceso a la población que lo requiere.
275	A01AB03SOB031X0	<b>CLORHEXIDINA</b>	Líquido bucal, 0.12%	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Registro sanitario como medicamento	-	-	Se autoriza considerando que dicho producto cuenta con registro sanitario como medicamento y con la finalidad de favorecer su acceso a la población que lo requiere.
276	V07ACSO000X0	<b>SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN (CUSTODIOL)</b>	-	SI	IESS-Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	Quito	Registro sanitario como medicamento	-	-	Se autoriza considerando que dicho producto cuenta con registro sanitario como medicamento y con la finalidad de favorecer su acceso a la población que lo requiere.
277	H01AC01POI000X0	<b>SOMATOTROPINA</b>	Polvo para inyección	SI	IESS-Hospital José Carrasco Arteaga	Cuenca	Déficit de Homona de crecimiento	2	19/07/2019	Se autoriza para uso de (11) once pacientes con diagnóstico confirmado de déficit de hormona de crecimiento; así como, para aquellos pacientes que cumplan con los criterios de inclusión. Remisión semestral de ficha de seguimiento de uso.
278	L04AB04SOY290X0	<b>ADALIMUMAB</b>	Líquido parenteral, 40 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Colitis ulcerativa refractaria a tratamiento convencional y con pérdida de respuesta a un primer anti-TNF (Infliximab)	2	29/11/2019	Se autoriza para uso de un (1) paciente con diagnóstico de colitis ulcerativa refractaria a tratamiento convencional y con pérdida de respuesta a un primer anti-TNF (Infliximab). Remisión semestral de ficha de seguimiento de uso.
279	L04AA31SOR723X0	<b>TERIFLUNOMIDA</b>	Sólido oral, 14 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Esclerosis Múltiple Remitente - Recurrente que no ha respondido a Interferones y que ha presentado reacciones adversas o no han tolerado Fingolimod.	2	22/12/2019	Se autoriza manera exclusiva para el tratamiento de las pacientes CANL y SPMF con diagnóstico de Esclerosis Múltiple Remitente - Recurrente que no han respondido a Interferones y que han presentado reacciones adversas o no han tolerado Fingolimod, siempre que no presenten enfermedad altamente activa o de evolución rápida. Remisión semestral de ficha de seguimiento de uso.
280	R07AA02SUT691X0	<b>FOSFOLÍPIDOS NATURALES (SURFACTANTE PULMONAR)</b>	Líquido para instilación endotraqueopulmonar, 27 mg/mL	SI	RPIS-Todos los establecimientos de Salud de la RPIS	Nivel Nacional	Síndrome de Dificultad Respiratoria - SDR, en neonatos prematuros de alto riesgo y enfermedad de membrana hialina,	-	-	Se extiende la autorización para la adquisición del medicamento Surfactante Pulmonar 27 mg/mL a los establecimientos de salud de la RPIS que requieran dicho medicamento conforme a su cartera de servicios.
281	L04AB04SOY290X0	<b>ADALIMUMAB</b>	Líquido parenteral, 40 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Colitis ulcerativa refractaria a tratamiento convencional y con pérdida de respuesta a un primer anti-TNF (Infliximab)	2	10/01/2020	Se autoriza para uso de un (1) paciente con diagnóstico de colitis ulcerativa refractaria a tratamiento convencional y con pérdida de respuesta a un primer anti-TNF (Infliximab). Remisión semestral de ficha de seguimiento de uso.
282	L04AB04SOY290X0	<b>ADALIMUMAB</b>	Líquido parenteral, 40 mg	SI	IESS-Hospital Carlos Andrade Marín	Quito	Colitis ulcerativa refractaria a tratamiento convencional y con pérdida de respuesta a un primer anti-TNF (Infliximab)	2	10/01/2020	Se autoriza para uso de una (1) paciente con diagnóstico de colitis ulcerativa refractaria a tratamiento convencional y con pérdida de respuesta a un primer anti-TNF (Infliximab). Remisión semestral de ficha de seguimiento de uso.

<b>Elaborado por:</b>	Analistas de la Gestión Interna de Políticas de la DNMDM	<b>Fecha de actualización</b>
		21/02/2018