



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 / 2019.

Base de datos extraída: 08/01/2019. 15:00 pm

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:


Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.

Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ..

Cuadro N. 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 01 /2019 MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 01 /2019


	E44 Desnutrición aguda moderada	E44 Desnutrición aguda severa	Total
	SE 01	SE 01	
PICHINCHA	3	1	4
COTOPAXI	2	1	3
EL ORO	3		3
LOJA		2	2
SUCUMBIOS	2		2
CAÑAR	1		1
CHIMBORAZO		1	1
ESMERALDAS	1		1
GUAYAS	1		1
IMBABURA	1		1
MANABI	1		1
MORONA SANTIAGO	1		1
Total	16	5	21



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 01 /2019




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Sexo ■ Masculino ■ Femenino

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01, 2019.

Desnutrición Aguda Moderada

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 01 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 01 /2019

Provincia1	SE 01		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos
EL ORO	18,75%	3	18,75%	3
PICHINCHA	18,75%	3	18,75%	3
COTOPAXI	12,50%	2	12,50%	2
SUCUMBIOS	12,50%	2	12,50%	2
CAÑAR	6,25%	1	6,25%	1
ESMERALDAS	6,25%	1	6,25%	1
GUAYAS	6,25%	1	6,25%	1
IMBABURA	6,25%	1	6,25%	1
MANABI	6,25%	1	6,25%	1
MORONA SANTIAGO	6,25%	1	6,25%	1
Total	100,00%	16	100,00%	16

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, SE 01 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, SE 01 /2019

Provincia1	SE 01		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos
LOJA	40,00%	2	40,00%	2
CHIMBORAZO	20,00%	1	20,00%	1
COTOPAXI	20,00%	1	20,00%	1
PICHINCHA	20,00%	1	20,00%	1
Total	100,00%	5	100,00%	5

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01, 2019

Base de datos extraída: 03/ 01 /2019. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, SE 01 /2019




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, SE 01 /2019

PROVINCIA	% de total	Número de casos	% de total	Número de casos
	SE 01	SE 01	Total	Total
GUAYAS	20,51%	8	20,51%	8
PICHINCHA	20,51%	8	20,51%	8
LOS RIOS	10,26%	4	10,26%	4
ESMERALDAS	2,56%	1	2,56%	1
MANABI	5,13%	2	5,13%	2
SANTA ELENA	7,69%	3	7,69%	3
CAÑAR	2,56%	1	2,56%	1
TUNGURAHUA	5,13%	2	5,13%	2
BOLIVAR	2,56%	1	2,56%	1
LOJA	5,13%	2	5,13%	2
SUCUMBIO	2,56%	1	2,56%	1
IMBABURA	5,13%	2	5,13%	2
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	5,13%	2	5,13%	2
CARCHI	5,13%	2	5,13%	2
Total	100,00%	39	100,00%	39

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. SE 01 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.