



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 02 / 2019.

Base de datos extraída: 15/ 01 / 2019. 15:00 pm

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:

Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.


Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N.1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 02 /2019

	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01	SE 02	SE 01	SE 02	
GUAYAS	5	8		1	14
MANABI	1	10		2	13
ORELLANA	3	5			8
PICHINCHA	4	2	1		7
COTOPAXI	2	1	1		4
LOJA		1	2	1	4
EL ORO	3				3
CHIMBORAZO			1	1	2
IMBABURA	1	1			2
SANTA ELENA		1		1	2
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS				2	2
SUCUMBIOS	2				2
ZAMORA CHINCHIPE	1			1	2
AZUAY				1	1
CAÑAR	1				1
CARCHI		1			1
ESMERALDAS	1				1
MORONA SANTIAGO	1				1
TUNGURAHUA		1			1
Total	25	31	5	10	71


MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 02 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 02 /2019




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Sexo ■ Masculino ■ Femenino

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 02, 2019.

Desnutrición Aguda Moderada

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 02 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 02 /2019

Provincia1	SE 01		SE 02		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	8,93%	5	14,29%	8	23,21%	13
MANABI	1,79%	1	17,86%	10	19,64%	11
ORELLANA	5,36%	3	8,93%	5	14,29%	8
PICHINCHA	7,14%	4	3,57%	2	10,71%	6
COTOPAXI	3,57%	2	1,79%	1	5,36%	3
EL ORO	5,36%	3			5,36%	3
IMBABURA	1,79%	1	1,79%	1	3,57%	2
SUCUMBIOS	3,57%	2			3,57%	2
CAÑAR	1,79%	1			1,79%	1
CARCHI			1,79%	1	1,79%	1
ESMERALDAS	1,79%	1			1,79%	1
LOJA			1,79%	1	1,79%	1
MORONA SANTIAGO	1,79%	1			1,79%	1
SANTA ELENA			1,79%	1	1,79%	1
TUNGURAHUA			1,79%	1	1,79%	1
ZAMORA CHINCHIPE	1,79%	1			1,79%	1
Total	44,64%	25	55,36%	31	100,00%	56

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, SE 02 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, SE 02 /2019

Provincia1	SE 01		SE 02		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
LOJA	40,00%	2	10,00%	1	20,00%	3
CHIMBORAZO	20,00%	1	10,00%	1	13,33%	2
MANABI			20,00%	2	13,33%	2
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS			20,00%	2	13,33%	2
AZUAY			10,00%	1	6,67%	1
COTOPAXI	20,00%	1			6,67%	1
GUAYAS			10,00%	1	6,67%	1
PICHINCHA	20,00%	1			6,67%	1
SANTA ELENA			10,00%	1	6,67%	1
ZAMORA CHINCHIPE			10,00%	1	6,67%	1
Total	100,00%	5	100,00%	10	100,00%	15

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
 DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 02, 2019

Base de datos extraída: 15/ 01 /2019. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, SE 02 /2019




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, SE 02 /2019

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total		Número de casos	
	SE 01	SE 02	SE 01	SE 02	Total	Total	Total	Total
GUAYAS	24,44%	21,25%	11	17	22,40%	28		
PICHINCHA	17,78%	12,50%	8	10	14,40%	18		
MANABI	4,44%	11,25%	2	9	8,80%	11		
SANTA ELENA	6,67%	8,75%	3	7	8,00%	10		
LOS RIOS	8,89%	5,00%	4	4	6,40%	8		
ESMERALDAS	2,22%		1		0,80%	1		
CAÑAR	2,22%	5,00%	1	4	4,00%	5		
EL ORO		5,00%		4	3,20%	4		
AZUAY		7,50%		6	4,80%	6		
TUNGURAHUA	4,44%	3,75%	2	3	4,00%	5		
ZAMORA CHIN..		3,75%		3	2,40%	3		
BOLIVAR	4,44%	2,50%	2	2	3,20%	4		
CHIMBORAZO		2,50%		2	1,60%	2		
LOJA	4,44%	2,50%	2	2	3,20%	4		
SUCUMBIOS	2,22%	1,25%	1	1	1,60%	2		
COTOPAXI		3,75%		3	2,40%	3		
IMBABURA	4,44%		2		1,60%	2		
ORELLANA	2,22%		1		0,80%	1		
SANTO DOMIN..	4,44%		2		1,60%	2		
MORONA SAN..	2,22%		1		0,80%	1		
CARCHI	4,44%	3,75%	2	3	4,00%	5		
Total	100,00%	100,00%	45	80	100,00%	125		

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. SE 02 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.