



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 03 / 2019.

Base de datos extraída: 23/ 01 / 2019. 15:00 pm

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:

Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.


Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ..

Cuadro N.1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 03 /2019

	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-02	SE 03	SE 01-02	SE 03	
GUAYAS	15	10	1		26
MANABI	11	6	2	2	21
PICHINCHA	7	3	2	3	15
COTOPAXI	3	8	1	1	13
ORELLANA	8	1		1	10
SANTO DOMINGO DE LOS T..		2	2	3	7
CHIMBORAZO		4	2		6
ESMERALDAS	1	4			5
LOJA	1		4		5
MORONA SANTIAGO	2	2			4
TUNGURAHUA	1	2		1	4
CARCHI	1	1		1	3
EL ORO	3				3
IMBABURA	2	1			3
SUCUMBIOS	2			1	3
ZAMORA CHINCHIPE	1	1	1		3
LOS RIOS		1	1		2
SANTA ELENA	1		1		2
AZUAY			1		1
BOLIVAR		1			1
CAÑAR	1				1
Total	60	47	18	13	138


MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 03 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 03 /2019




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Sexo ■ Masculino ■ Femenino

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 03, 2019.

Desnutrición Aguda Moderada

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 03 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 03 /2019

Provincia1	SE 01-02		SE 03		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	14,02%	15	9,35%	10	23,36%	25
MANABI	10,28%	11	5,61%	6	15,89%	17
COTOPAXI	2,80%	3	7,48%	8	10,28%	11
PICHINCHA	6,54%	7	2,80%	3	9,35%	10
ORELLANA	7,48%	8	0,93%	1	8,41%	9
ESMERALDAS	0,93%	1	3,74%	4	4,67%	5
CHIMBORAZO			3,74%	4	3,74%	4
MORONA SANTIAGO	1,87%	2	1,87%	2	3,74%	4
EL ORO	2,80%	3			2,80%	3
IMBABURA	1,87%	2	0,93%	1	2,80%	3
TUNGURAHUA	0,93%	1	1,87%	2	2,80%	3
CARCHI	0,93%	1	0,93%	1	1,87%	2
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS			1,87%	2	1,87%	2
SUCUMBIOS	1,87%	2			1,87%	2
ZAMORA CHINCHIPE	0,93%	1	0,93%	1	1,87%	2
BOLIVAR			0,93%	1	0,93%	1
CAÑAR	0,93%	1			0,93%	1
LOJA	0,93%	1			0,93%	1
LOS RIOS			0,93%	1	0,93%	1
SANTA ELENA	0,93%	1			0,93%	1
Total	56,07%	60	43,93%	47	100,00%	107

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, SE 03 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, SE 03 /2019

Provincia1	SE 01-02		SE 03		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
PICHINCHA	11,11%	2	23,08%	3	16,13%	5
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	11,11%	2	23,08%	3	16,13%	5
LOJA	22,22%	4			12,90%	4
MANABI	11,11%	2	15,38%	2	12,90%	4
CHIMBORAZO	11,11%	2			6,45%	2
COTOPAXI	5,56%	1	7,69%	1	6,45%	2
AZUAY	5,56%	1			3,23%	1
CARCHI			7,69%	1	3,23%	1
GUAYAS	5,56%	1			3,23%	1
LOS RIOS	5,56%	1			3,23%	1
ORELLANA			7,69%	1	3,23%	1
SANTA ELENA	5,56%	1			3,23%	1
SUCUMBIOS			7,69%	1	3,23%	1
TUNGURAHUA			7,69%	1	3,23%	1
ZAMORA CHINCHIPE	5,56%	1			3,23%	1
Total	100,00%	18	100,00%	13	100,00%	31

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
 DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 03, 2019

Base de datos extraída: 23/ 01 /2019. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, SE 03 /2019




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, SE 03 /2019

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total		Número de casos	
	SE 01-02	SE 03	SE 01-02	SE 03	Total	Total	Total	Total
GUAYAS	22,22%	13,33%	30	10	19,05%	40		
PICHINCHA	14,81%	14,67%	20	11	14,76%	31		
MANABI	8,15%	12,00%	11	9	9,52%	20		
SANTA ELENA	7,41%	9,33%	10	7	8,10%	17		
LOS RIOS	6,67%	6,67%	9	5	6,67%	14		
ESMERALDAS	1,48%	6,67%	2	5	3,33%	7		
CAÑAR	4,44%	4,00%	6	3	4,29%	9		
EL ORO	2,96%	1,33%	4	1	2,38%	5		
AZUAY	5,93%	1,33%	8	1	4,29%	9		
TUNGURAHUA	3,70%	5,33%	5	4	4,29%	9		
ZAMORA CHIN..	2,96%	1,33%	4	1	2,38%	5		
BOLIVAR	2,96%	1,33%	4	1	2,38%	5		
CHIMBORAZO	1,48%	5,33%	2	4	2,86%	6		
LOJA	2,96%	1,33%	4	1	2,38%	5		
SUCUMBIO	1,48%	1,33%	2	1	1,43%	3		
COTOPAXI	2,22%	8,00%	3	6	4,29%	9		
IMBABURA	1,48%	1,33%	2	1	1,43%	3		
ORELLANA	0,74%		1		0,48%	1		
SANTO DOMIN..	1,48%	1,33%	2	1	1,43%	3		
MORONA SAN..	0,74%	1,33%	1	1	0,95%	2		
CARCHI	3,70%	2,67%	5	2	3,33%	7		
Total	100,00%	100,00%	135	75	100,00%	210		

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. SE 03 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.