



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 04 / 2019.

Base de datos extraída: 29/ 01 / 2019. 15:00 pm

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:

Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.


Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N.1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 04 /2019

	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-03	SE 04	SE 01-03	SE 04	
MANABI	17	10	5	1	33
GUAYAS	25	6	1		32
PICHINCHA	11	5	5	1	22
ESMERALDAS	6	6	3	4	19
COTOPAXI	11	4	2		17
CHIMBORAZO	4	8	2	1	15
TUNGURAHUA	3	7	1	1	12
EL ORO	8	1		1	10
ORELLANA	9		1		10
SANTO DOMINGO DE LOS T..	2	2	5		9
MORONA SANTIAGO	5	1			6
CARCHI	2	1	1	1	5
LOJA	1		4		5
SUCUMBIOS	2		3		5
SANTA ELENA	1	1	1	1	4
IMBABURA	3				3
LOS RIOS	1	1	1		3
ZAMORA CHINCHIPE	2		1		3
AZUAY			1		1
BOLIVAR	1				1
CAÑAR	1				1
NAPO	1				1
Total	116	53	37	11	217


MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 04 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 04 /2019




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Sexo ■ Masculino ■ Femenino

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 04, 2019.

Desnutrición Aguda Moderada

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 04 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 04 /2019

Provincia1	SE 01-03		SE 04		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	14,79%	25	3,55%	6	18,34%	31
MANABI	10,06%	17	5,92%	10	15,98%	27
PICHINCHA	6,51%	11	2,96%	5	9,47%	16
COTOPAXI	6,51%	11	2,37%	4	8,88%	15
CHIMBORAZO	2,37%	4	4,73%	8	7,10%	12
ESMERALDAS	3,55%	6	3,55%	6	7,10%	12
TUNGURAHUA	1,78%	3	4,14%	7	5,92%	10
EL ORO	4,73%	8	0,59%	1	5,33%	9
ORELLANA	5,33%	9			5,33%	9
MORONA SANTIAGO	2,96%	5	0,59%	1	3,55%	6
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1,18%	2	1,18%	2	2,37%	4
CARCHI	1,18%	2	0,59%	1	1,78%	3
IMBABURA	1,78%	3			1,78%	3
LOS RIOS	0,59%	1	0,59%	1	1,18%	2
SANTA ELENA	0,59%	1	0,59%	1	1,18%	2
SUCUMBIO	1,18%	2			1,18%	2
ZAMORA CHINCHIPE	1,18%	2			1,18%	2
BOLIVAR	0,59%	1			0,59%	1
CAÑAR	0,59%	1			0,59%	1
LOJA	0,59%	1			0,59%	1
NAPO	0,59%	1			0,59%	1
Total	68,64%	116	31,36%	53	100,00%	169

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, SE 04 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, SE 04 /2019

Provincia1	SE 01-03		SE 04		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
ESMERALDAS	8,11%	3	36,36%	4	14,58%	7
MANABI	13,51%	5	9,09%	1	12,50%	6
PICHINCHA	13,51%	5	9,09%	1	12,50%	6
SANTO DOMINGO DE ..	13,51%	5			10,42%	5
LOJA	10,81%	4			8,33%	4
CHIMBORAZO	5,41%	2	9,09%	1	6,25%	3
SUCUMBIO	8,11%	3			6,25%	3
CARCHI	2,70%	1	9,09%	1	4,17%	2
COTOPAXI	5,41%	2			4,17%	2
SANTA ELENA	2,70%	1	9,09%	1	4,17%	2
TUNGURAHUA	2,70%	1	9,09%	1	4,17%	2
AZUAY	2,70%	1			2,08%	1
EL ORO			9,09%	1	2,08%	1
GUAYAS	2,70%	1			2,08%	1
LOS RIOS	2,70%	1			2,08%	1
ORELLANA	2,70%	1			2,08%	1
ZAMORA CHINCHIPE	2,70%	1			2,08%	1
Total	100,00%	37	100,00%	11	100,00%	48

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 04, 2019

Base de datos extraída: 29/ 01 /2019. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, SE 04 /2019




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, SE 04 /2019

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total		Número de casos	
	SE 01-03	SE 04	SE 01-03	SE 04	Total	Total	Total	Total
GUAYAS	18,47%	30,00%	41	24	21,52%	65		
PICHINCHA	14,41%	16,25%	32	13	14,90%	45		
MANABI	9,01%	7,50%	20	6	8,61%	26		
SANTA ELENA	7,66%	1,25%	17	1	5,96%	18		
LOS RIOS	6,76%	6,25%	15	5	6,62%	20		
ESMERALDAS	5,86%	6,25%	13	5	5,96%	18		
CAÑAR	4,05%	5,00%	9	4	4,30%	13		
EL ORO	3,15%	1,25%	7	1	2,65%	8		
AZUAY	4,05%	1,25%	9	1	3,31%	10		
TUNGURAHUA	4,05%	2,50%	9	2	3,64%	11		
ZAMORA CHIN..	2,25%		5		1,66%	5		
BOLIVAR	2,25%		5		1,66%	5		
CHIMBORAZO	3,15%	2,50%	7	2	2,98%	9		
LOJA	2,25%		5		1,66%	5		
SUCUMBIOS	1,35%	1,25%	3	1	1,32%	4		
COOTOPAXI	4,05%	3,75%	9	3	3,97%	12		
IMBABURA	1,35%	6,25%	3	5	2,65%	8		
ORELLANA	0,45%	2,50%	1	2	0,99%	3		
SANTO DOMIN..	1,35%		3		0,99%	3		
MORONA SAN..	0,90%	2,50%	2	2	1,32%	4		
CARCHI	3,15%	1,25%	7	1	2,65%	8		
NAPO		1,25%		1	0,33%	1		
PASTAZA		1,25%		1	0,33%	1		
Total	100,00%	100,00%	222	80	100,00%	302		

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. SE 04 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.