




MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEDADES ZONÓTICAS A230-A239 Brucelosis Ecuador, SE 01-21, 2019




Tendencia de A230-A239 Brucelosis, por semanas epidemiológicas de los años 2017 - 2019



Fuente: SIVE-ALERTA

Semanas Epidemiológicas

Caso de A230-A239 Brucelosis, por grupos de edad, sexo, año 2019 (hasta SE 21)




Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de A230-A239 Brucelosis, por provincia de atención, semanas epidemiológicas 01 a 21, año 2019

Provincia de Domicilio	SE 01-21	Total
PICHINCHA	11	11
MANABI	2	2
NAPO	2	2
AZUAY	1	1
CHIMBORAZO	1	1
Total	17	17

Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de A230-A239 Brucelosis, por provincia de atención, año 2019 (hasta SE 21)



Fuente: SIVE-ALERTA

Es una de las zoonosis de mayor difusión en el mundo en seres humanos y animales domésticos. La enfermedad se adquiere por el contacto directo por vía cutánea o por aerosoles procedente de sangre, placenta, fetos o secreciones uterinas o por el consumo de productos de origen animal infectados, crudos o mal cocidos (leche, productos lácteos y cárnicos). Se considera una enfermedad profesional en ganaderos, veterinarios y otras profesiones expuestas.




MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



ENFERMEDADES ZOOINÓTICAS LEPTOSPIROSIS A 27.0 - A 27.9 Ecuador, SE 1-21, 2019

Tendencia de A 27.0 - A 27.9 LEPTOSPIROSIS, por semanas epidemiológicas de los años 2017 - 2019



Fuente: SIVE-ALERTA

Caso de A 27.0 - A 27.9 LEPTOSPIROSIS, por grupos de edad, sexo, año 2019 (hasta SE 21)




Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de A 27.0 - A 27.9 LEPTOSPIROSIS, por provincia de atención, semanas epidemiológicas 01 a 21, año 2019

Provincia de Domicilio	SE 01-21	Total
MANABI	25	25
ZAMORA CHINCHIPE	15	15
SANTO DOMINGO DE L...	9	9
ESMERALDAS	7	7
SUCUMBIOS	5	5
ORELLANA	4	4
GUAYAS	3	3
LOJA	2	2
AZUAY	1	1
COTOPAXI	1	1
EL ORO	1	1
MORONA SANTIAGO	1	1
NAPO	1	1
PICHINCHA	1	1
SANTA ELENA	1	1
Total	77	77

Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de A 27.0 - A 27.9 LEPTOSPIROSIS, por provincia de atención, año 2019 (hasta SE 21)



Fuente: SIVE-ALERTA

La leptospirosis es una zoonosis ampliamente difundida por el mundo, que afecta a los animales tanto de sangre fría como caliente. Los mamíferos cumplen un rol importante dentro de la epidemiología en la transmisión al humano.

La enfermedad puede producir brotes con alta tasa de mortalidad y se están reconociendo nuevas formas clínicas de elevada letalidad.

En Ecuador la leptospirosis, se ha estimado que la incidencia media anual de esta enfermedad es de 1 caso por 100000 habitantes, en los años 2016 al 2018 se confirman 335 casos, en tres provincias de la Región de la Costa (Manabí, Esmeraldas y Los Ríos) se concentra la mayor cantidad de casos confirmados de leptospirosis (144) con un porcentaje (43%).

El grupo etario más afectado es de 20 a 49 años con un porcentaje de (50,1%). Sexo masculino es afectados mayormente con (66,56%).

En el año 2019 hasta la semana epidemiológica 21 se confirman 77 casos.