

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

SUBSISTEMA DE VIGILANCIA SIVE- ALERTA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORFS
ECUADOR, SE 1-33/2019



Actualizado: 20/08/2019

INTRODUCCIÓN

La situación epidemiológica del Ecuador, en cuanto a las enfermedades vectoriales, está influenciada por la distribución y densidad de las diferentes especies de vectores, sobre todo de las arbovirosis transmitidas por los mosquitos *Aedes aegypti* y *Ae. albopictus* (DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA, MAYARO), y de parasitosis transmitidas por mosquitos *Anopheles* spp. (MALARIA), flebótomos (LEISHMANIASIS) y chinches triatominos (ENFERMEDAD DE CHAGAS). Las condiciones poblacionales de los vectores al estar vinculadas a variables de orden socio-económico, ambiental y ecológico, así como a la provisión de servicios básicos y el acceso a la atención oportuna en salud, condicionan la aparición de repuntes epidémicos y al mantenimiento de la transmisión endémica de las enfermedades vectoriales, por lo que se necesita mantener una vigilancia constante tanto de las enfermedades como de los vectores para que puedan ser controladas.

Dengue: Para el año 2018, en la Región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud reporta 561.354 casos de dengue, 340 fallecimientos y una tasa de incidencia de 55,04 (100.000 hab.) y en lo que va del 2019 (hasta el 25 julio) se observa un incremento del dengue en la región: 1'570.031 casos, una tasa de incidencia de 156,08 por cada 100.000 habitantes y 647 fallecidos. En Ecuador, durante el 2018, se notificaron 3.094 casos con una tasa de incidencia de 18,17 y se reportó un fallecimiento; mientras que, en el año **2019 (SE1-33)** se han notificado **5.648** casos con una tasa de incidencia de **32,7**; con 2 fallecidos confirmados y 2 bajo estudio.

Zika: Durante el 2018 en la Región de Las Américas hubo 55.328 casos con una incidencia de 2,94 por cada 100.000

Habitantes, mientras que en Ecuador se confirmaron 10 casos, de los cuales 4 corresponden a microcefalia asociada a Zika. 2019 sin casos.

Chikungunya: Los últimos datos disponibles de OPS corresponden a la SE 1-51/2017 e indican que en la Región de Las Américas hubo 123.087 casos, la tasa de incidencia fue de 18,27 por cada 100.000 habitantes y hubo 101 fallecidos. En Ecuador, en el año 2017 se notificaron 196 casos, en el 2018 hubo 8 casos y en 2019 no hay casos.

Fiebre amarilla: Durante el año 2019, los países de Bolivia, Brasil y Perú han notificado casos confirmados de fiebre amarilla. Brasil reporta 1206 casos sospechosos, 81 confirmados, 348 en investigación y 14 fallecimientos durante la temporada estacional de noviembre 2018 a mayo 2019. Perú reporta 1 caso confirmado, 8 en investigación y 2 muertes; mientras que, Bolivia notifica un caso. El último reporte que se tiene de Ecuador corresponde a 3 casos notificados en la provincia de Sucumbios, en el año 2017.

Malaria: El último reporte mundial de OMS sobre el Paludismo (noviembre 2018) notifica en el 2017 para la Región de las Américas 976.000 casos de malaria: 723.000 por *P. vivax*, 252.784 por *P. falciparum* y 630 fallecimientos. En Ecuador hubo 1.380 casos en el año 2017 y 1.806 casos en el 2018. Durante el **2019 (SE1-33)** se han notificado **1593** casos.

Leishmaniasis: En el año 2018 se notificaron 1336 casos de leishmaniasis; de los cuales, 1302 casos son de tipo cutáneo y 34 casos de tipo mucocutáneo. Durante el año **2019 (SE 1-33)** se reportan 736 casos: 726 son de tipo cutáneo y 10 de tipo mucocutáneo.

Enfermedad de Chagas: Durante el año 2018 se han confirmado un total de 74 casos de enfermedad de Chagas; de los cuales, 17 casos (23%) son Chagas agudo y 57 casos (77%) Chagas crónico. No hubo fallecimientos por este evento. Durante el **2019 (SE1-33)** se han notificado 68 casos de enfermedad de Chagas: 11 agudos v 57 crónicos.

Evento	2015	2016	2017	2018	2019*
Dengue	42.459	14.159	11.387	3.094	5.648
Chikungunya	33.619	1.860	196	8	0
Zika	1	2.947	2.413	10	0
Fiebre amarilla	0	0	3	0	0
Malaria	686	1.191	1.291	1.806	1.593
Leishmaniasis	1.382	1.397	1.654	1.336	736
Mal de Chagas	45	44	61	74	68
Mayaro	-	-	-	-	5

Fuente: Sistema de Vigilancia (SIVE-ALERTA).

Elaborado por: Dirección Nacional Vigilancia Epidemiológica.

*Datos 2019 correspondientes a las semanas epidemiológicas 1 a 33

Enfermedades transmitidas por vectores Tabla de contenido:

1. Dengue
2. Malaria
3. Leishmaniasis

Tema Central:

DENGUE: Enfermedad viral, febril y aguda producida por los serotipos 1, 2, 3 y 4 del virus del dengue. Transmitida por la picadura de mosquitos *Aedes aegypti*. Se caracteriza por comienzo repentino con presentaciones clínicas diferentes y a menudo con evolución clínica y resultados impredecibles. Los síntomas son una fiebre elevada (40°C) acompañada de dos de los síntomas siguientes: dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido. El dengue grave es una complicación potencialmente mortal porque cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica. No hay tratamiento específico del dengue ni del dengue grave, pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 1%. Según una estimación reciente, se producen 390 millones de infecciones por dengue cada año (intervalo creíble del 95%: 284 a 528 millones), de los cuales 96 millones (67 a 136 millones) se manifiestan clínicamente (cualquiera que sea la gravedad de la enfermedad). En 2017 hubo una reducción significativa del número de casos de dengue notificados en las Américas: lo que representa una reducción del 73%. En 2019 se está observando un fuerte aumento por ejemplo en la Región del Pacífico Occidental, el aumento del número de casos se ha observado en Australia, Camboya, China, República Democrática Popular Lao, Malasia, Filipinas, Singapur y Viet Nam, mientras que se han notificado casos por DEN-2 en Nueva Caledonia, y por DEN-1 en la Polinesia francesa.. El SIVE ALERTA, vigila 3 tipos de Dengue: dengue sin signos de alarma (epi grupal), dengue con signos de alarma, dengue grave (epi individual confirmado por laboratorio).

¹ Organización Mundial para la Salud. Dengue y Dengue Grave <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA




ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES DENGUE. Ecuador, SE 01-33 / 2019

El dengue es una enfermedad producida por la picadura de mosquitos hembra de *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus* infectados con el virus DENV. Puede ser mortal si no tiene un manejo clínico adecuado, especialmente cuando existe infección por diferentes serotipos. En la Región de Las Américas existen cuatro serotipos circulando (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4); durante el 2018 se notificaron en toda la región 560.586 casos, con una incidencia de 57,3 por cada 100.000 habitantes; de los cuales, 3.535 casos (0,63%) fueron clasificados como dengue grave. En Ecuador, durante el 2018 se notificaron 3.094 casos; de los cuales, 2.965 casos (95,83%) son dengue sin signos de alarma (DSSA), 123 casos (3,98%) son dengue con signos de alarma (DCSA) y 6 casos (0,19%) son dengue grave (DG). Se identificó la circulación de los serotipos DENV-1 y DENV-4.

Casos de Dengue por semana epidemiológica. Ecuador SE 01-33 / 2019

Provincia	SE 01-32	SE 33	Total
ESMERALDAS	1.442	14	1.456
GUAYAS	898	24	922
MANABÍ	840	14	854
ORELLANA	520	10	530
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	309	16	325
SUCUMBIOS	299	2	301
EL ORO	259	5	264
LOJA	242		242
ZAMORA CHINCHIPE	213	6	219
LOS RÍOS	194	8	202
NAPO	130	2	132
PICHINCHA	80		80
MORONA SANTIAGO	28		28
CAÑAR	24		24
PASTAZA	19	1	20
AZUAY	14		14
SANTA ELENA	14		14
CHIMBORAZO	8		8
IMBABURA	7		7
BOLIVAR	2		2
CARCHI	2		2
COTOPAXI	2		2
Total	5.546	102	5.648

Total de casos de Dengue, por provincias. Ecuador SE 01-33 / 2019




Fuente: Subsistema de vigilancia SIVE_ALERTA

Casos confirmados de Dengue sin signos de alarma (DSSA), Dengue con signos de alarma (DCSA) y Dengue grave (DG), por provincias. Ecuador SE 01 hasta SE 33/2019

Provincia (grupo)	A90X Dengue sin complicaciones	A91X Dengue con signos de alarma	A91X Dengue grave	Total general
ESMERALDAS	1.153	296	7	1.456
GUAYAS	744	170	8	922
MANABÍ	738	115	1	854
ORELLANA	360	170		530
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	287	33	5	325
SUCUMBIOS	209	92		301
EL ORO	208	55	1	264
LOJA	221	21		242
ZAMORA CHINCHIPE	201	18		219
LOS RÍOS	188	13	1	202
NAPO	127	5		132
PICHINCHA	72	8		80
MORONA SANTIAGO	23	5		28
CAÑAR	19	5		24
PASTAZA	19	1		20
AZUAY	12	2		14
SANTA ELENA	10	4		14
CHIMBORAZO	7	1		8
IMBABURA	5	1		7
BOLIVAR	2		1	2
CARCHI	1	1		2
COTOPAXI	2			2
Total	4.608	1.016	24	5.648


Fuente: Subsistema de vigilancia SIVE_ALERTA

Comportamiento del Dengue por Semanas Epidemiológicas 01 hasta 52 de los años 2017-2018; y SE 01 hasta SE 33 año 2019




ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES DENGUE. Ecuador, SE 01-33/ 2019

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes a Nivel Nacional casos de DSSA - DG - DCSA confirmados, por provincia de residencia. Ecuador , SE 01 hasta SE 33/2019



Tasa de incidencia por 100.000 habitantes a Nivel Nacional casos de DSSA - DG - DCSA confirmados, por cantón de residencia. Ecuador SE 01 hasta SE 33/2019



Fuente: Subsistema de vigilancia SIVE_ALERTA



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
INFORME MALARIA
Semana Epidemiológica (SE) 01-33/ 2019. Ecuador




La malaria o paludismo es una enfermedad producida por la picadura de algunas especies de mosquitos hembra de Anopheles, infectados con los parásitos Plasmodium vivax, P. falciparum, P. malariae y P. ovale. En Ecuador las infecciones se dan por P. vivax y P. falciparum, siendo este último el que más complicaciones o muertes puede producir. En el último informe mundial de OMS sobre el Paludismo, publicado en noviembre 2018, se reporta que en el año 2017 la Región de Las Américas tuvo 976.000 casos (723.000 por P. vivax y 252.784 por P. falciparum) y 630 fallecimientos. En Ecuador, se notificaron 1380 casos en el año 2017 y 1806 casos en el año 2018.

Total de casos confirmados de Malaria Ecuador, SE 01-33 /2019

Provincia de Domicilio	SE 01-32	SE 33	Total
MORONA SANTIAGO	574	3	577
PASTAZA	530	4	534
ORELLANA	223	2	225
CARCHI	77		77
ESMERALDAS	70		70
PICHINCHA	19		19
SANTO DOMINGO DE LOS T..	19		19
NAPO	17		17
GUAYAS	15		15
MANABÍ	10		10
SUCUMBIOS	10		10
SANTA ELENA	5		5
COTOPAXI	3		3
EL ORO	3		3
IMBABURA	3		3
LOS RIOS	2		2
CHIMBORAZO	1		1
LOJA	1		1
TUNGURAHUA	1		1
ZAMORA CHINCHIPE	1		1
Total general	1.584	9	1.593

Casos confirmados de Malaria por Provincia. Ecuador SE 01-33/2019




Total de casos confirmados de Malaria Ecuador hasta la SE 01-33 /2019


PROVINCIA DE DOMICILIO	B500-B509 Malaria complicada por Plasmodium falciparum	B519 Malaria no complicada por Plasmodium vivax	B500 Malaria no complicada por Plasmodium falciparum	Total
MORONA SANTIAGO		569	8	577
PASTAZA		527	7	534
ORELLANA		218	7	225
CARCHI		3	74	77
ESMERALDAS		5	65	70
PICHINCHA		15	4	19
SANTO DOMINGO..		15	4	19
NAPO		17		17
GUAYAS	1	13	1	15
MANABÍ		8	2	10
SUCUMBIOS		10		10
SANTA ELENA		5		5
COTOPAXI		3		3
EL ORO		3		3
IMBABURA		2	1	3
LOS RIOS		2		2
CHIMBORAZO		1		1
LOJA	1			1
TUNGURAHUA		1		1
ZAMORA CHINCHI..		1		1
Total	2	1.418	173	1.593

Fuente: SIVE-Alerta

Casos de Malaria por edad y por sexo. Ecuador, SE 01-33/2019



Comportamiento de Malaria Ecuador, por Semanas Epidemiológicas 01 hasta 52 años 2017-2018; SE 01-33/2019



Tasa de incidencia de malaria por 1.000 habitantes a nivel nacional, por provincias Ecuador SE 01-33 /2019

Provincia	Tasa de incidencia
PASTAZA	4,928
MORONA SANTIAGO	3,069
ORELLANA	1,428
CARCHI	0,418
NAPO	0,133
ESMERALDAS	0,112
SUCUMBIOS	0,045
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	0,043
SANTA ELENA	0,013
ZAMORA CHINCHIPE	0,008
MANABI	0,007
IMBABURA	0,006
COTOPAXI	0,006
PICHINCHA	0,006
EL ORO	0,004
GUAYAS	0,004
LOS RIOS	0,002
CHIMBORAZO	0,002
LOJA	0,002
TUNGURAHUA	0,002

Tasa de incidencia de malaria por 1.000 habitantes a nivel nacional, por cantones. Ecuador SE 01-33/2019

Cantón	Tasa de incidencia
AGUARICO	49,462
TAISHA	22,451
PASTAZA	6,481
TIWINTZA	1,764
ARAJUNO	1,401
TULCÁN	0,760
SAN LORENZO	0,683
MORONA	0,449
ORELLANA	0,344
PUTUMAYO	0,338
LOGROÑO	0,267
MERA	0,244
TENA	0,198
SUCUA	0,186
LA CONCORDIA	0,135
ESMERALDAS	0,116
EL PANGUI	0,093
SANTIAGO	0,091
ARCHIDONA	0,062
GUALAQUIZA	0,052
ELOY ALFARO	0,044
LORETO	0,041
ATACAMES	0,038
LAGO AGRIO	0,035
RIOVERDE	0,032
SALITRE	0,031
MONTUFAR	0,029
SANTO DOMINGO	0,027
COLTA	0,022
PEDRO CARBO	0,020
CAYAMBE	0,019
VALENCIA	0,019
EL CARMEN	0,018
SHUSHUFINDI	0,018
LA LIBERTAD	0,017
BALZAR	0,017
SANTA ELENA	0,017
OTAVALO	0,016
SUCRE	0,016
PEDERNALES	0,016
LATACUNGA	0,015
SANTA ROSA	0,012
PASAJE	0,012
MANTA	0,012
NARANJITO	0,011
RUMIÑAHUI	0,009
CHONE	0,008
PORTOVIEJO	0,006
QUITO	0,006
BABAHOYO	0,006
IBARRA	0,005
LOJA	0,004
MACHALA	0,004
GUAYAQUIL	0,003
DURAN	0,003
AMBATO	0,003

Casos de malaria en embarazadas Ecuador SE 01-33/2019

Provincia de Domicilio	Cantón	Domicilio	Parroquia Domicilio	Semanas Gestación	B500 Malaria no complicada por Plasmodium falciparum	B519 Malaria no complicada por Plasmodium vivax	Total
MORONA SANTIAGO	TAISHA	TUUTINENTZA	16			2	2
			19			1	1
			23			1	1
			24			1	1
			35			1	1
			13			1	1
			8			1	1
			9			1	1
			34			1	1
			24			1	1
PASTAZA	PASTAZA	MONTALVO (ANDOAS)	6			2	2
			36			1	1
			20			1	1
			33			1	1
			39			1	1
			16			1	1
CARCHI	TULCAN	TOBAR DONOSO (LA BOCANA DE CAMUMBI)	20	1		1	1
			19	1		1	1
			35	1		1	1
			32	1		1	1
ORELLANA	AGUARICO	SANTA MARIA DE HUIRIRIMA	23			1	1
			22			1	1
			7			1	1
			30			1	1
Total					4	23	27

Fuente: Subsistema SIVE-ALERTA , Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica