



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



SUBSISTEMA DE VIGILANCIA SIVE-ALERTA NOTIFICACIÓN DE BROTES ECUADOR, SE 1 - 39, 2019

Ocurrencia de brotes por enfermedad y por provincia.

SE	PROVINCIA	B010-B019 Varicela	B260-B269 Parotiditis infecciosa	A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas	B084 Síndrome mano, pie, boca	A90X Dengue sin complicaciones (sin signos de alarma)	B150-B159 Hepatitis A	T69Z Efecto tóxico de diversas substancias ingeridas o por contacto	A91X Dengue con signos de alarma	B500 Malaria no complicada por Plasmodium Falciparum	A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella	B519 Malaria no complicada por Plasmodium Vivax	Otro diagnóstico	U50X Síndr. Diarreico agudo con deshidratación grave u otras complicacio..	A370-A379 Tosferina	T511 Efecto tóxico por alcohol metílico	T602 Intoxicación por otros insecticidas (piretroides)	Total	
SE 1 - 38	PICHINCHA	19	25	5	2		4	1										56	
	GUAYAS	8	1	4	2	4	2	1	1									23	
	IMBABURA	11	3	1	8		1											24	
	TUNGURAHUA	3	2	2	7													14	
	LOJA	6	2	1	1	2		1					1					14	
	ESMERALDAS	4				5				3								12	
	MANABI	2		4	3				2							1		12	
	AZUAY	3	1	3	2		1	1										11	
	EL ORO	3		6		1		1										11	
	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	4		3	2		1					1						11	
	CHIMBORAZO	3	2	1	2		1				1							10	
	ZAMORA CHINCHIPE		1	5		2										1		9	
	COTOPAXI	3	2	1	1													7	
	BOLIVAR	2	2		1		1								1			7	
	MORONA SANTIAGO	1	2	1		2								1				7	
	LOS RIOS	2		2	1													5	
	CARCHI		1		2													3	
	GALAPAGOS			1	2						1							4	
	CAÑAR	1		2														3	
	ORELLANA			1			1							1				3	
	NAPO						2											2	
	SANTA ELENA												1					1	
	SE 39	PICHINCHA						1											1
		GUAYAS																1	1
		TUNGURAHUA	1	1															2
		COTOPAXI		1															1
	CARCHI					1												1	
	Total	76	46	43	36	17	15	5	3	3	2	2	2	2	1	1	1	255	

En la SE 39 se ha notificado 6 brotes, uno en la provincia de Pichincha por B150-B159 Hepatitis A, uno en la provincia del Guayas por T602 Intoxicación por otros insecticidas (piretroides), dos en la provincia de Tungurahua por B260-B269 Parotiditis infecciosa y B010-B019 Varicela, uno en la provincia de Cotopaxi por B260-B269 Parotiditis infecciosa, uno en la provincia del Carchi por A90X Dengue sin complicaciones (sin signos de alarma); para lo cual se ha implementado las acciones de control, según la naturaleza del evento que corresponde principalmente a la identificación de la fuente de infección, identificación de expuestos, enfermos y seguimiento de casos que evolucionan gravemente.

RECUERDE:

Las condiciones para realizar una investigación de brote son:

- Cuando la enfermedad es prioritaria.- estas son definidas por cada país en función de criterios epidemiológicos nacional o internacionalmente establecidos y en función del alcance de las medidas de control.
- Cuando la enfermedad excede de su ocurrencia usual.- en una población específica, en un determinado período de tiempo y área geográfica de ocurrencia habitual.
- La enfermedad parece tener una fuente común.- esto permite corregir de forma temprana el brote y evitar mayor afectación.
- La enfermedad parece tener una severidad mayor de la usual.- a partir del análisis de la letalidad y la tasa de hospitalización permite determinar si la enfermedad tiene una gravedad mayor de lo habitual.
- La enfermedad es nueva, emergente o desconocida en el área.
- La enfermedad es de interés público. La enfermedad está relacionada con emergencias en situaciones de desastres.- la aparición de emergencia o desastres conllevan a la aparición de brotes de distintas enfermedades, debido a la movilización de grupos de población afectada, en condiciones sanitarias deficientes lo cual aumenta el riesgo de enfermar.




MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA


SUBSISTEMA DE VIGILANCIA SIVE-ALERTA
NOTIFICACIÓN DE BROTES
ECUADOR, SE 1 -39, 2019



Ocurrencia de brotes por tipo de enfermedad y por provincia.



Fuente: SIVE-ALERTA



Del total de brotes notificados hasta la SE 39 suman 255, el mayor porcentaje corresponde a enfermedades Inmunoprevenibles con el **48%**, seguida por Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos con el **24%**, en tercer lugar se encuentran B084 Síndrome mano, pie, boca con un **14%**.

Relación de expuestos vs. enfermos. Brote de enfermedades notificados.

	Enfermos	Expuestos
Inmunoprevenibles	1.593	53.710
ETAS	1.581	17.367
ETV	248	16.950
B084 Síndrome mano, pie, boca	285	1.163
Efectos tóxicos	61	115
Otro diagnóstico	12	46
Total	3.780	89.351

Relación de expuestos vs. enfermos Brote de enfermedades inmunoprevenibles

PROVINCIA	CANTÓN	Expuestos	Enfermos
AZUAY	GUALACEO	280	56
	SIGSIG	60	8
	CUENCA	274	6
	CAMILO PONCE ENRIQ..	25	3
BOLIVAR	GUARANANDA	1.017	42
	CHIMBO	46	5
CAÑAR	EL TAMBO	95	13
CARCHI	TULCAN	82	22
CHIMBORAZO	RIOBAMBA	301	129
	GUANO	27	7
	ALAUZI	250	4
COTOPAXI	PUJILI	250	52
	LATACUNGA	68	23
	SACUISILI	28	15
	SALCEDO	1.411	9
EL ORO	MACHALA	20	13
	BALSAS	36	7
	SANTA ROSA	40	7
ESMERALDAS	ESMERALDAS	1.300	116
	RIOVERDE	7	4
	ATACAMES	12	2
GUAYAS	GUAYAQUIL	142	31
	BALZAR	20	14
	GNRAL. ANTONIO ELIZ..	37	13
IMBABURA	MILAGRO	16	7
	IBARRA	1.346	32
	OTAVALO	205	17
	SAN MIGUEL DE URQU..	56	15
	PIMAMPIRO	98	4
	ANTONIO ANTE	40	2
LOJA	PALTAS	562	28
	LOJA	418	20
	SOZORANGA	15	5
LOS RIOS	QUEVEDO	49	20
	PALENQUE	13	4
MANABI	MONTECRISTI	120	21
	PEDERNALES	20	2
MORONA SANTIAGO	SANTIAGO	300	11
	TAISHA	15	6
	LOGROÑO	5	5
PICHINCHA	QUITO	41.225	641
	MEJIA	323	31
	CAYAMBE	145	18
	PEDRO MONCAYO	1.521	16
	RUMIFAHUI	40	8
SANTO DOMINGO DE LOS..	SANTO DOMINGO	1.000	16
TUNGURAHUA	AMBATO	281	43
	SAN PEDRO DE PELILEO	30	13
	BATOS DE AGUA SANTA	4	4
ZAMORA CHINCHIPE	ZAMORA	10	2
	YANTZAZA	5	1
Total		53.710	1.593

Fuente: SIVE-ALERTA

Del total de los brotes notificados a nivel nacional hasta la SE 39/2019, las inmunoprevenibles registran el mayor número de expuestos y enfermos.

Nota Técnica: De acuerdo a la magnitud de los brotes de Enfermedades inmunoprevenibles la tasa de ataque es de **2.96** a nivel nacional.

Análisis de gravedad de brotes. Condición final de los casos.

PROVINCIA	Fallecidos	Vivos
PICHINCHA	1	870
CHIMBORAZO	0	552
ZAMORA CHINCHIPE	0	478
GUAYAS	0	224
EL ORO	0	197
ESMERALDAS	0	169
TUNGURAHUA	0	169
IMBABURA	0	141
AZUAY	0	139
MANABI	2	139
COTOPAXI	0	134
LOJA	0	131
BOLIVAR	0	92
LOS RIOS	0	74
GALAPAGOS	0	68
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	0	57
MORONA SANTIAGO	0	46
CARCHI	0	44
CAÑAR	0	27
ORELLANA	0	17
NAPO	0	14
SANTA ELENA	0	3
Total	3	3.785

Fuente: SIVE-ALERTA

En el análisis de la gravedad de brotes, existe un total de 3 fallecidos desde la SE 1 a la 39 del año 2019, de los cuáles: 2 pertenecen a la provincia de Manabí, cantón Pedernales, registrados en la SE 13, con diagnóstico de efecto tóxico por ingesta de alcohol metílico; y 1 fallecido corresponde a la Provincia de Pichincha, notificado en la SE 22, causado por virus de varicela zóster.