

DEFINICIONES

Defunción Materna: se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales

Defunciones obstétricas Directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto, y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas

Defunciones obstétricas Indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica directa pero si agravadas por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

Razón de Muerte Materna (RMM): es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) dividido para el número de nacidos vivos estimados para el año y multiplicado por 100.000

El siguiente análisis se realiza con las Muertes Maternas que ocurrieron hasta los 42 días de puerperio, las mismas que son tomadas en cuenta para el cálculo del indicador de la RMM al finalizar el año

RESUMEN

- Hasta la SE 36 se han notificado 123 MM de las cuales: el 90,24% (111 MM) son MM antes de los 42 días de puerperio y son las utilizadas para el cálculo del indicador de la RMM, y el 9,76% (12 MMT) son MM Tardías
- Comparando las MM del año 2020 con el año 2019 hasta la SE 36 hay un aumento de 22 MM en el año 2020 .
- Las principales causas de las Muertes Maternas hasta la SE 36 son: los Trastornos hipertensivos con el 33,33% (37 MM); las hemorragias obstétrica con el 16,19% (19 MM) y las causas Indirectas 33,33% (37 MM)
- Las provincias que notifican mayor número de MM por lugar de fallecimiento a la SE 36 son: Guayas (26 MM); Pichincha (15 MM); Manabí (13 MM); Azuay y El Oro (8 MM); y Chimborazo (7 MM).

Situación de la RMM y el número de MM de los años 2015 al 2020 SE 1 a SE 36

Año	MM 1 a 36	MM T 1 a 36	RMM	Total MM	Total MM T
2015	110	23	45	150	33
2016	98	16	40	133	21
2017	97	42	43	143	68
2018	102	69	41	137	84
2019	89	73	37	123	105
**2020	111	12	---	---	---


Dato definitivo de las MM de los años 2015 al 2019
**Dato de notificaciones sistemáticas 2020

Tabla N° 1 Muertes Maternas por zona, provincia y cantón de fallecimiento SE 1 a SE 36


Zona fallece	Prov. fallece	Cantón fallece	SE 1 a 35	SE 36	Total	
Zona 1	Esmeraldas	Esmeraldas	3	1	4	
		Quininde	1		1	
	Imbabura	Ibarra	2		2	
		Otavalo	1		1	
Zona 2	Napo	Lago Agrio	1		1	
		Tena	2		2	
	Orellana	Orellana	1		1	
Zona 3	Chimborazo	Alausi	1		1	
		Colta	1		1	
	Cotopaxi	Riobamba	5		5	
		Latacunga	4		4	
		Ambato	4		4	
Zona 4	Manabí	Junín	1		1	
		Manta	6		6	
		Portoviejo	6		6	
	Santo Domin..	Santo Domin..	3		3	
		Guayas	Milagro	1		1
			Babahoyo	1		1
Zona 5	Los Ríos	Quevedo		1	3	
		Santa Elena	2		2	
Zona 6	Azuay	Cuenca	8		8	
		Morona	1		1	
Zona 7	El Oro	Huaquillas	1		1	
		Machala	1		1	
		Pasaje	1		1	
	Loja	Santa Rosa	3	2	5	
		Catamayo	1		1	
Zona 8	Guayas	Loja	1		1	
		Saraguro	2		2	
		Durán	1		1	
Zona 9	Pichincha	Guayaquil	22	2	24	
		Quito	15		15	
Total			105	6	111	

En la SE 36 se notifican 6 MM: 2 en la provincia del Guayas, 2 en la provincia de El Oro, 1 en la provincia de Los Ríos y 1 en la provincia de Esmeraldas.

Gráfico N° 1 Porcentaje de MM por zona de fallecimiento SE 1 a SE 36 Ecuador 2020



Mapa N° 1 Muertes Maternas por provincia de fallecimiento SE 1 a SE 36 Ecuador 2020



Hasta la SE 36 de este año la zona 8 tiene un porcentaje de MM del 22,52% (25 MM); la zona 4 con el 14,41% (16 MM); las zonas 3 y 9 con el 13,51% (15 MM cada una); la zona 7 con el 10,81% (12 MM); las zonas 1 y 6 con el 8,11% (9 MM cada una); la zona 5 con el 6,31% (7 MM) y la zona 2 con el 2,70% (3 MM).

Mapa N° 2 Muertes Maternas por provincia de residencia SE 1 a SE 36 Ecuador 2020





Tabla N° 2 Muertes Maternas por zona, provincia y cantón de residencia SE 1 a 36

Z. reside	Prov. reside	Cant. reside	1 a 35	SE 36	Total		
Zona 1	Esmeraldas	Eloy Alfaro	1		1		
		Esmeraldas	1	1	2		
		Quininde	2		2		
		Imbabura	Otavalo	2		2	
		Urcuqui	1		1		
Zona 2	Napo	Lago Agrio	1		1		
		Tena	2		2		
		Orellana	Loreto	1		1	
		Pichincha	Mejia	1		1	
Zona 3	Chimborazo	Pedro Monca..	1		1		
		Alausi	1		1		
		Colta	1		1		
		Guamote	1		1		
		Riobamba	2		2		
		Latacunga	3		3		
		Pujili	2		2		
Zona 4	Manabi	Pastaza	1		1		
		Ambato	4		4		
		Chone	2		2		
		El Carmen	3		3		
		Jipijapa	1		1		
		Junin	2		2		
		Manta	3		3		
		Montecristi	1		1		
		Portoviejo	3		3		
		Sucre	1		1		
Zona 5	Santo Domin..	Santo Domin..	4		4		
		Bolivar	1		1		
		Alfredo Baqu..	1		1		
		Guayas	Balao	1	1	2	
		Daule	1		1		
		El Triunfo	1		1		
		Los Rios	Los Rios	1		1	
		Pueblo Viejo	1		1		
		Quevedo	1	1	2		
		La Libertad	1		1		
Zona 6	Santa Elena	Salinas	2		2		
		Santa Elena	2		2		
		Azuay	Cuenca	6		6	
		Paute	1		1		
		Morona	Gualaquiza	1		1	
		Morona	Morona	1		1	
		Zona 7	El Oro	El Guabo	1		1
				Huaquillas	3		3
				Machala	1		1
				Santa Rosa	1		1
Catamayo	1				1		
Zona 8	Loja	Loja	1	1	2		
		Saraguro	2		2		
		Duran	2	2	4		
Zona 9	Guayas	Guayaquil	18		18		
		Quito	8		8		
Total			105	6	111		

Gáfico N° 2 Porcentaje de MM por zona de residencia SE 1 a SE 36



La zona 4 y 8 tienen un porcentaje de MM por lugar de residencia de 18,02% (20 MM cada una); la zona 3 el 13,51% (15 MM); la zona 5 el 12,61% (14 MM); la zona 7 el 9,91% (11 MM); las zonas 1 y 6 el 8,11% (9 MM cada una); la zona 9 el 7,21% (8 MM) y la zona 2 el 4,50% (5 MM).

En la SE 36 se notifica 6 MM, 4 fallecen en la misma provincia de su residencia y 3 en diferentes provincias.

Gráfico N° 3 Concordancia entre provincia de fallecimiento de las MM y provincia de residencia SE 1 a SE 36


Prov. fallece	Azuay	Esmeral..	Guayas	Tungura..	Manabi	Imbabura	Pichincha	Cotopaxi	El Oro	Los Rios	Santo Domingo	Chimbor..	Loja	Santa Elena	Orellana	Morona	Napo	Sucumb..	Bollvar	Pastaza	Total	
Azuay	7															1						8
Esmeraldas		5																				5
Guayas			21							1				3					1			26
Tungurahua				4																		4
Manabi					13																	13
Imbabura						3																3
Pichincha					1		10	1			2						1					15
Cotopaxi								4														4
El Oro			1						6				1									8
Los Rios					1					3												4
Santo Domingo					1						2											3
Chimborazo			2									5										7
Loja													4									4
Santa Elena														2								2
Orellana															1							1
Morona																1						1
Napo																	1				1	2
Sucumbios																		1				1
Total	7	5	24	4	16	3	10	5	6	4	4	5	5	5	1	2	2	1	1	1	111	

NOTA
 Los casilleros diagonales pintados corresponden al número de MM en los que la provincia de ocurrencia coincide con la provincia de fallecimiento
 Los casilleros por fuera corresponden al número de MM donde la muerte ocurrió en una provincia diferente a la provincia de residencia

La mortalidad materna no siempre se produce en el mismo lugar (provincia) en donde reside la madre, información que se representa en el gráfico 3: lugar de residencia y de fallecimiento de cada caso de MM.
 Hasta la SE 36; 93 casos de MM pertenecen al mismo lugar de residencia y de fallecimiento y 18 casos fallecen en otra provincia diferente a la de su residencia.

Z. fallece	Prov.fallece	Ocurrencia	Establecimiento fallece	Referencia	Casos MM
Zona 1	Esmeraldas	RPIS/IESS	H. Básico Esmeraldas	Ninguna	1
		RPIS/MSP	CS Tipo "C" Las Palmas	Ninguna	1
			H. General Delfina Torres	H. Básico Quinde	1
	Imbabura		Unidad Anidada de Borbón	H. Básico de Borbón	1
		Traslado	Domicilio	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General San Vicente de Paúl	CS de Urcuqui	1
Zona 2	Sucumbios	Traslado	Domicilio	H. Básico de Otavalo	1
		Domicilio	Domicilio	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General José María Velasco I..	CS de Archidona	1
	Orellana	RPIS/MSP	H. General Francisco de Orellana	CS de Chontapunta	1
		Domicilio	Domicilio	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General Docente de Riobamba	Ninguna	2
Zona 3	Chimborazo		H. Básico de Colta	H. Básico de Colta	1
			H. Básico de Guamote	H. Básico de Guamote	1
		RPIS/MSP	H. General de Latacunga	Ninguna	3
	Cotopaxi			Clínica Salcedo	1
				H. Básico Clínica Latacunga	1
				H. Básico de Pujili	1
Zona 4	Tungurahua	Domicilio	Domicilio	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General Docente de Ambato	Ninguna	3
		Domicilio	Domicilio	Centro Materno Infantil Carlos Morales Lucke	1
	Manabí	Red complementaria	Cardiocentro Manta	H. General Napoleón Dávila	1
			Clinica Centeno	H. Basico de Sucre	1
		RPIS/IESS	H. General de Mamta	Ninguna	1
		H. General de Manta	Ninguna	2	
		H. General de Portoviejo	Ninguna	2	
RPIS/MSP		H. Básico de Rocafuerte	Ninguna	1	
Zona 5	Santo Domingo		H. De Especialidades de Portovi..	H. IESS de Manta	1
			H. General Rodríguez Zambrano	Ninguna	2
			H. General Verdi Cevallos	Ninguna	1
	Guayas	RPIS/MSP	CS Tipo "C" Augusto Egas	Ninguna	1
			H. General Gustavo Dominguez ..	H. Basico de Santo Domingo	1
				Ninguna	1
Zona 6	Los Ríos	RPIS/IESS	H. General de Milagro	Ninguna	1
		RPIS/IESS	H. General de Quevedo	Manga del Cura	1
		RPIS/MSP	H. Básico Sagrado Corazón de J..	Clínica La Cigüeña	1
	Santa Elena		H. General Martín Icaza	Ninguna	1
			H. Básico de Manglaralto	H. Básico de Ricaute	1
			H. General Liborio Panchana	CS de Archidona	1
Zona 7	Azuay	Red complementaria	Clinica de Especialidades Médic..	H. Básico de La Libertad	1
			H. Universitario del Río	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General Vicente Corral Moscoso	CS Tipo "C" El Valle	1
	Morona			H. Básico de Gualaquiza	1
				H. Básico Mariano Estrella	2
				Ninguna	1
Zona 8	El Oro		Unidad anidada de Paute	Unidad anidada de Paute	1
				Ninguna	1
				H. General de Macas	Ninguna
	Loja	RPIS/MSP	H. Básico de Pasaje	H. María Lorena Serrano	1
			H. G. O. Angela de Ollague	CS Patria Nueva	1
				H. Básico Huaquillas	1
Zona 9	Pichincha		H. General Isidro Ayora	H. General Isidro Ayora	1
				Ninguna	2
			H. General Teófilo Dávila	H. Básico de Huaquillas	1
	Guayas	Domicilio	Domicilio	H. G. O. Angela de Ollague	1
		Red complementaria	Clinica MEDILAB	10 de agosto de Lago Agrio	1
		Traslado	Domicilio	Ninguna	1
Zona 9	Pichincha	Domicilio	Domicilio	Ninguna	1
		Red complementaria	Clinica Guayaquil	H. G. O Universitario	1
		RPIS/IESS	H. de la Mujer Alfredo Paulson	Ninguna	1
	Guayas	RPIS/IESS	H. Especializado Teodoro Maldonado Carbo	CEMEDIC	1
				H. Básico El Triunfo	1
				H. IESS de Ancón	1
Zona 9	Pichincha	RPIS/MSP	CS Tipo "C" Bastión Popular	Ninguna	1
			CS Tipo "C" Cisne 2	Nulo	1
			H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. Básico de Salinas	1
	Pichincha			H. Básico La Libertad	1
				H. Especializado Matilde Hidalgo de Prócel	1
				Ninguna	1
Zona 9	Pichincha		H. G. O. Matilde Hidalgo de Próc..	Ninguna	2
			H. G. O. Universitario	H. General Martín Icaza	1
				Ninguna	4
	Pichincha		H. General Guasmo Sur	H. Básico de Quevedo	1
				H. Especializado Matilde Hidalgo de Prócel	1
				Ninguna	3
Zona 9	Pichincha	Red complementaria	Clinica Mosquera	Ninguna	1
			H. N° 1 Policia Nacional	H. IESS del Tena	1
			NORHOSPITAL	H. General Gustavo Dominguez	1
	Pichincha	RPIS/IESS	H. Especializado Carlos Andrade Marín	Ninguna	1
				H. IESS Quito Sur	1
				H. IESS San Francisco	1
Zona 9	Pichincha	RPIS/MSP	H. G. O. Isidro Ayora	Ninguna	1
			H. G. O. Nueva Aurora	Clínica de La Mujer	1
				H. Básico de Machachi	1
	Pichincha			H. C.A.M	1
				H. General Pablo Arturo Suárez	1
				Ninguna	1
Zona 9	Pichincha		H. General Docente de Calderón	H. Básico Cayambe	1
				H. Básico Yaruqui	1
Total			H. General Pablo Arturo Suárez	CS Tipo "C" Centro Histórico	111

Gráfico N° 4 Porcentaje de MM por lugar de ocurrencia SE 1 a SE 36




Hasta la SE 36 del año 2020 las MM que ocurren en los establecimientos de salud del MSP es el 66,67% (74 MM); en los establecimientos de salud del IESS el 13,51% (15 MM); en la Red complementaria el 9,91% (11 MM); en domicilio el 7,21% (8 MM) y en el traslado el 2,70% (3 MM)

Gráfico N° 5 Comparación de casos de MM por años 2015 al 2020 SE 1 a SE 36




Al comparar los años 2015 al 2020 de las MM ocurridas hasta los 42 días de puerperio, que son MM tomadas en cuenta para el cálculo del Indicador de la RMM al finalizar el año, el año 2020 reporta más MM que los años anteriores hasta la SE 36. Los años 2015 al 2019 son datos finales con búsqueda activa, y el año 2020 son notificaciones sistemáticas.

Gráfico N° 6 Porcentaje de casos de MM Directa e Indirecta SE 1 a SE 36




Los 111 casos de Muertes Maternas reportadas hasta la SE 36; el 66,67% son causas Directas, y el 33,33% son causas Indirectas

Gráfico N° 7 MM por grupos de edad SE 1 a SE 36 Ecuador 2020




Hasta la SE 36 del año 2020, (28 MM) 25,22% pertenecen al grupo comprendido entre 30 a 34 años seguido del grupo de 25 a 29 años (27 MM) 24,32%.

Gráfico N° 8 Porcentaje y número de gestaciones al momento del fallecimiento SE 1 a SE 36




Hasta la SE 36, de las 111 MM; 38 mujeres presentaban su primera gesta, 24 mujeres tenían su segunda gesta, 41 mujeres eran multigesta, y 8 mujeres tenían más de 6 gestas eran gran multigestas.

Gráfico N° 9 Porcentaje de casos de MM por ubicación de domicilio SE 1 a SE 36



Hasta la SE 36 del año 2020, las 75 MM residían en una zona urbana lo que significaría que estas madres residían cerca de algún centro de salud y 36 MM residía en una zona rural.

Gráfico N° 10 Grupo étnico de casos de MM SE 1 a SE 36




Hasta la SE 36, de las 111 MM notificadas; el 81,98% (91 MM) las autoidentifican como mestizas; el 2,70% (3 MM) como afroecuatorianas; y el 15,32% (17 MM) como indígenas.

Tabla N° 4 Tipo de Parto SE 1 a SE 36

Cesárea	64
Parto vaginal	18
Aborto/legrado	7
Muerte en embarazo	22
Total	111

Las 111 MM notificadas hasta la SE 36 del año 2020; el 57,66% de MM su parto fue por cesárea; el 16,22% de las MM su parto fue por vía vaginal; el 6,31% fallece luego de un legrado y el 19,82% fallecen con el embarazo.

Gráfico N° 11 Condición del producto al nacimiento SE 1 a SE 36




Las 82 MM notificadas hasta la SE 36, y que su parto fue por cesárea y parto vaginal los 64 niños se encuentra vivos y 18 niños fallecieron.

Tabla N° 5 Número de casos de MM por período de ocurrencia SE 1 a SE 36

Prov.fallece	Embara..	Parto	PP Inme..	PP Medi..	PP Tard..	Total
Azuay	2		3	1	2	8
Chimborazo	2		3	2		7
Cotopaxi			2	1	1	4
El Oro	1		3	2	2	8
Esmeraldas	2		3			5
Guayas	6		7	8	5	26
Imbabura	1		2			3
Loja			3		1	4
Los Ríos	2		2			4
Manabí	1		3	4	5	13
Morona	1					1
Napo			2			2
Orellana		1				1
Pichincha	2		4	6	3	15
Santa Elena			1		1	2
Santo Domin..	1		1		1	3
Sucumbios			1			1
Tungurahua	1			2	1	4
Total	22	1	40	26	22	111

Gráfico N° 12 Porcentaje de casos de MM por período de ocurrencia SE 1 a SE 36




Hasta la SE 36 del año 2020 el 19,82% (22 MM) ocurren en el momento del embarazo; el 0,90% (1 MM) ocurre en el momento del parto; el 36,04% (40 MM) ocurren en el momento del puerperio inmediato; el 23,42% (26 MM) ocurre en el momento del puerperio mediato; el 19,82% (22 MM) ocurren en el momento del puerperio tardío.

PP inmediato hasta las 24 horas del post parto.

PP mediato desde 1 día hasta los 10 días del post parto.


PP tardío desde los 11 días hasta los 42 días del post parto

Gráfico N° 13 Tendencia de la Muerte Materna por SE años 2016 al 2020 SE 1 a SE 36




En la SE 36 del año 2016 se reportó 1 MM; en la SE 36 del año 2017 se reportó 5 MM; en la SE 36 del año 2018 se reportó 3 MM; en la SE 36 del año 2019 se reporta 3 MM y para el año 2020 SE 36 se reporta 6 MM

Gráfico N° 14 Comparación de casos de MM por lugar de residencia años 2019 y 2020 SE 1 a SE 36



Comparando los casos de MM por lugar de residencia de los años 2019 y 2020 hasta la SE 36; las provincias de Manabí, Azuay, Santa Elena, Cotopaxi, Santo Domingo, Napo e Imbabura en el año 2020 reportan más MM que el año 2019; Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Morona, Bolívar, Orellana y Sucumbios tienen menos MM que el año 2019; Chimborazo, Loja, Tungurahua y Carchi coincide el 2019 y 2020 con igual número de muertes maternas; Zamora en el año 2019 no reporta casos de MM, para el 2020 reporta MM; las provincias de Cañar y Pastaza en el año 2019 reportaron casos de MM, para este año no reportan MM.

Gráfico N° 15 Comparación de causas básicas por grupos: años 2016 al 2020 SE 1 a SE 36 Ecuador 2020



Causas Básicas por grupos

- Grupo 1.- Embarazo que termina en aborto
- Grupo 2.- trastornos hipertensivos
- Grupo 3.- hemorragia obstétrica
- Grupo 4.- infecciones relacionadas con el emba..
- Grupo 5.- otras complicaciones obstétricas
- Grupo 6.- complicaciones de manejo no previst..
- Grupo 7.- indirectas (no obstétricas)
- Grupo 8.- indeterminadas

La OMS con el fin de promover un marco común de comparaciones internacionales, agrupan las causas básicas de muerte durante el embarazo, parto y puerperio en nueve grupos, que son clínica y epidemiológicamente relevantes, simplifican la caracterización de las MM, ya sean de causas directas o indirectas, aclaran y normalizan el reporte de afecciones que se consideran tienen un alto impacto sobre la salud pública.


De las 111 MM registradas en la SE 36 las fuentes de las Causas básicas son de las notificaciones inmediatas tanto de los diagnósticos de la Historia Clínica y de los Certificados de defunción recojidos ese momento, hasta que se realice las Auditorías externas

Tabla N° 7 Causas Básicas por grupos CIE-10 SE 1 a SE 36 Ecuador 2020

Grupos CIE-10	Causa Básica de defunción	Casos
Grupo 1	Aborto complicado con hemorragia	1
	Aborto incompleto a descartar	1
	Mola hidatiforme	2
	Sepsis post aborto	1
Grupo 2	Eclampsia	6
	Eclampsia en el puerperio	1
	Preeclampsia severa	16
	Síndrome de hellp	14
Grupo 3	Atonía uterina	1
	Desprendimiento placentario	1
	Desprendimiento prematuro de placenta	2
	Hemorragia post aborto	1
	Hemorragia post parto	9
	Hipotonía uterina	3
Grupo 4	Shock hipovolémico	3
	Choque séptico	3
Grupo 5	Sepsis puerperal	3
	Embolia Líquido amniótico	1
	Embolia pulmonar	1
Grupo 7	Feto demaciado grande	1
	Anemia drepanocítica	1
	Apendicitis perforada	1
	COVID-19	21
	Crisis epiléptica convulsiva	1
	Edema Agudo de pulmón	1
	EPOC	1
	Hemorragia subaracnoidea	1
	Leucemia linfoblástica	1
	Leucemia linfocítica aguda	1
	Lupus Eritematoso	2
	Neumonía atípica	1
	Pancreatitis biliar	1
	Strongiloidiasis diseminada	1
	TB Millar	1
	Trombo embolia pulmonar	1
	Trombosis venosa profunda	1
Grupo 8	Muerte obstétrica de causa no especificada	3
Total		111

Los grupos y diagnósticos son preliminares, hasta la obtención del Informe de las auditorías externas, sin embargo se ha aumentado las causas Indirectas por la pandemia, teniendo 21 MM indirectas por COVID-19

**Gráfico N° 16 Tasa de MM por provincia de residencia y por 10.000 embarazadas
SE 1 a SE 36 Ecuador 2020**



La tasa de muerte materna de cada una de las provincias está calculada por: número de MM hasta los 42 días de post parto, ocurridas en cada una de las provincias a la SE 36, dividida para la proyección de embarazadas del año 2020 y multiplicada por 10.000.

La provincia de Napo reporta una tasa de 7,2 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia 7 embarazadas están en riesgo de fallecer; Santa Elena reporta una tasa de 4,5 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia 5 embarazadas están en riesgo de fallecer; Manabí, Chimborazo, Loja, Cotopaxi, El Oro y Azuay reportan tasas de 4,3 a 3,5 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 4 embarazadas están en riesgo de fallecer; Morona, Tungurahua, Esmeraldas e Imbabura reportan tasas de 3,3 a 2,6 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 3 embarazadas están en riesgo de fallecer; Guayas, Santo Domingo, Orellana, Bolívar, Los Ríos, Sucumbios y Pichincha presentan tasas de 2,4 a 1,6; es decir que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 2 embarazadas están en riesgo de fallecer.

Análisis de las Muertes Maternas Tardías (posterior a los 42 días del puerperio) SE 1 a SE 36 Ecuador 2020

Definición operacional

Muerte Materna Tardía: es la muerte de una mujer por causas directas o indirectas más de 42 días después del parto, pero antes de un año de haber terminado el embarazo.

Tabla N° 8 MM tardías por zona, provincia hospital de fallecimiento SE 1 a SE 36 Ecuador 2020

Z. fallece	Prov.fallece	Establecimiento fallece	Casos MM T
Zona 4	Santo Domingo	H. General Gustavo Dominguez	1
Zona 6	Morona	Domicilio	1
Zona 7	Loja	H. General Isidro Ayora	1
Zona 8	Guayas	H. de Infectología	1
		H. Especializado Abel Gilbert Pontón	4
		H. General Guasmo Sur	1
Zona 9	Pichincha	Clinica Cotocollao	1
		H. G. O. Nueva Aurora	1
		H. General Docente de Calderón	1
Total			12

Hasta la SE 36 del año 2020 se han notificado 12 MM tardías, la zona 4 notifica 1 MM tardía en el H. General Gustavo Dominguez; la zona 6 reporta 1 MM tardía en Morona en domicilio; la zona 7 notifica 1 MM tardía en el H. General Isidro Ayora; la zona 8 ha notificado 4 MM tardías el H. de Especialidad Abel Gilbert, 1 MM tardía en el H. Guasmo Sur y 1 MM tardía en el H. de Infectología; la zona 9 notifica 3 MM tardías 1 en el H. General Docente de Calderón; 1 en el H.G.O Nueva Aurora y 1 en la Clínica Cotocollao.

Tabla N° 9 Muertes Maternas Tardías por causa básica SE 1 a SE 36 Ecuador 2020

Prov.fallece	Causa Básica de defunción	Casos
Guayas	Hemorragia intraencefálica	1
	Síndrome de hellp	1
	TB Pulmonar	1
	Trombosis venosa profunda	1
	Tumor maligno de ovario	1
	VIH	1
Loja	Septicemia por estafilococo Aerus	1
Morona	VIH	1
Pichincha	Infarto Cerebeloso derecho	1
	Pancreatitis Aguda Necrotizante	1
	Preeclampsia severa	1
Santo Domingo	Sepsis puerperal	1
Total		12

Las causas básicas son informaciones preliminares que están sujetas a modificaciones, en función de los informes de auditoría y de revisiones para las Codificaciones CIE-10 por la instancia pertinente (INEC)

Gráfico N° 17 Comparación de casos de MM Tardías años 2015 al 2020 SE 1 a SE 36




Gráfico N° 18 MM por grupos de edad SE 1 a SE 36 Ecuador 2020

