

SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 GACETA EPIDEMIOLÓGICA  
 ENFERMEDADES ZONOTICAS: LEPTOSPIRA SE 1 A SE 53  
 ECUADOR 2020


La Leptospirosis es una enfermedad ampliamente difundida por todo el mundo, que afecta a los animales de sangre fría y caliente, los mamíferos cumplen un rol muy importante dentro de la epidemiología en la transmisión hacia los humanos, la enfermedad puede producir brotes con alta tasa de morbilidad y se están reconociendo nuevas formas clínicas de elevada letalidad.

En Ecuador la Leptospirosis, se ha estimado una media anual de 1 caso por 100.000 habitantes, entre los años 2016 al 2018 se han confirmado 363 casos, con mayor predominio en las provincias de la costa (Manabí, Esmeraldas y Los Ríos) con un porcentaje de 43% del total de provincias donde se presentaron casos. Comparando los casos presentados en el año 2019 se notificaron 137 casos, en lo que va del año 2020 hasta la SE 53 se han notificado 247 casos, de los cuales el 21,9% corresponden a la provincia de Manabí; el 16,6% a la provincia de Zamora Chinchipe y el 15,8% a la provincia de Esmeraldas.


**Número de casos confirmados de Leptospirosis por provincia SE 1 a SE 53**

Prov Domic	Casos
MANABI	54
ZAMORA CHINCHIPE	41
ESMERALDAS	39
LOJA	18
GUAYAS	17
COTOPAXI	14
MORONA SANTIAGO	13
SANTO DOMINGO DE LOS T...	11
PICHINCHA	8
LOS RIOS	7
NAPO	7
SUCUMBIOS	5
EL ORO	4
ORELLANA	4
AZUAY	3
CAÑAR	1
SANTA ELENA	1
<b>Total general</b>	<b>247</b>

**Número de casos confirmados de Leptospirosis por provincia SE 1 a SE 53**



**Número de casos de Leptospirosis por grupos de edad y sexo SE 1 a SE 53**




Hasta la SE 53 se han notificado 247 casos de Leptospirosis, la provincia de Manabí tiene un porcentaje de 21,9%; la provincia de Zamora Chinchipe tiene un porcentaje del 16,6% y la provincia de Esmeraldas tiene un porcentaje de 15,8%.

El mayor número de casos de Leptospirosis se observa en las edades comprendidas entre 20 a 49 años; el sexo masculino predomina más hasta la SE 53.

Las semanas epidemiológicas 53 no han notificado casos de leptospirosis,

**Número de casos de Leptospirosis por semanas epidemiológicas SE 1 a SE 53 Ecuador 2020**



Fuente: Sive Alerta  
 Todos los datos están sujetos a variación  
 Fecha de corte: 05-01-2021