

Defunción Materna: se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales

Defunciones obstetricas Directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto, y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas

Defunciones obstetricas Indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica directa pero si agravadas por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

Razón de Muerte Materna (RMM): es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) dividido para el número de nacidos vivos estimados para el año y multiplicado por 100.000

El siguiente análisis se realiza con las Muertes Maternas que ocurrieron hasta los 42 días de puerperio, las mismas que son tomadas en cuenta para el cálculo del indicador de la RMM al finalizar el año

RESUMEN

- Hasta la SE 31 se han notificado 96 MM de las cuales: el 95,83% (92 MM) son MM antes de los 42 días de puerperio y son las utilizadas para el cálculo del indicador de la RMM, y el 4,17% (4 MMT)
- Comparando las MM del año 2021 con el año 2020 hasta la SE 31 hay una disminución de 6 MM en el año 2021 .
- Las principales causas de MM hasta la SE 31 son: los Trastornos hipertensivos el 28,26%; Sepsis 9,78%; Hemorragias obstétricas el 8,70% y las causas Indirectas el 43,48%
- Las provincias que notifican mayor número de MM por lugar de fallecimiento hasta la SE 31 son las provincias de Guayas, Pichincha y El Oro

Tabla N° 1 Situación de la RMM y el número de MM de los años 2017 al 2021 SE 1 a 31

Años	MM SE 31	MM T SE 31	RMM	Total MM	Total MM T
2017	80	39	42,78	143	68
2018	86	57	41,1	137	84
2019	75	59	37	123	105
*2020	98	12	*49,14	*163	*17
**2021	92	4	0	0	0

Datos definitivos de las MM de los años 2017 al 2019

*Dato preliminar de notificaciones sistemáticas 2020 hasta realizar la BA

**Dato de notificaciones sistemáticas

Tabla N° 2 MM por zona y provincia de fallecimiento SE 1 a SE 31

Zona	Provincia	SE 1 a 31
Zona 1	Carchi	1
	Imbabura	1
	Sucumbios	1
Zona 2	Napo	3
	Orellana	2
Zona 3	Chimborazo	2
	Cotopaxi	1
	Pastaza	2
	Tungurahua	4
Zona 4	Manabi	6
	Santo Domingo	2
	Bolívar	2
Zona 5	Guayas	2
	Los Ríos	3
	Azuay	2
Zona 6	Cañar	2
	Morona Santiago	1
	El Oro	9
Zona 7	Loja	3
	Guayas	30
Zona 9	Pichincha	13
Total		92

En la SE 31 no se notifica MM

Mapa N° 1 Muertes Maternas por provincia de fallecimiento SE 1 a SE 31





Gráfico N° 1 Porcentaje de MM por zona de fallecimiento SE 1 a SE 31



Hasta la SE 31 la zona 8 tiene un porcentaje de MM del 32,61% (30 MM); la zona 9 tiene el 14,13% (13 MM); la zona 7 tiene el 13,04% (12 MM); la zona 3 tienen el 9,78% (9 MM); la zona 5 tiene el 7,61% (7 MM); las zonas 2 y 6 tienen el 5,43% (5 MM c/u); la zona 1 tiene el 3,26% (3 MM)

Mapa N° 2 Muertes Maternas por provincia de residencia SE 1 a SE 31





Tabla N° 3 MM por zona, provincia y cantón de residencia SE 1 a SE 31

Zona reside	Provincia reside	SE 1 a 31
Zona 1	Carchi	2
	Esmeraldas	1
	Sucumbios	1
Zona 2	Napo	2
	Orellana	3
	Pichincha	1
Zona 3	Chimborazo	3
	Cotopaxi	3
	Pastaza	4
	Tungurahua	4
Zona 4	Manabí	7
	Santo Domingo	1
Zona 5	Bolívar	2
	Guayas	9
	Los Ríos	6
	Santa Elena	3
Zona 6	Azuay	2
	Cañar	2
	Morona Santiago	1
Zona 7	El Oro	7
	Loja	3
	Zamora Chinchipe	1
Zona 8	Guayas	17
Zona 9	Pichincha	7
Total		92

Gráfico N° 2 Porcentaje de MM por zona de residencia SE 1 a SE 31



En la SE 31 no se notifica MM

Hasta la SE 31: la zona 5 tiene un porcentaje del 21,74% de las MM por lugar de residencia (29 MM); la zona 8 tiene el 18,48% (17 MM); la zona 3 tiene el 15,22% (14 MM); la zona 7 tiene el 11,96% (11 MM); la zona 4 tiene el 8,70% (8 MM); la zona 9 tiene el 7,61% (7 MM); la zona 2 tiene el 6,52% (6 MM); la zona 6 tiene el 5,43% (5 MM) y la zona 1 tiene el 4,35% (4 MM).

Gráfico N° 3 Concordancia entre provincia de fallecimiento de las MM y provincia de residencia SE 1 a SE 31

Prov.fallece	Azuay	Guayas	Tungurahua	Pichincha	Cotopaxi	Los Ríos	Santo Do..	Loja	Orellana	Pastaza	Cañar	Manabí	Bolivar	Carchi	Chimboraza..	El Oro	Napo	Morona S..	Sucumbios	Esmerald..	Zamora C..	Santa Ele..	Total	
Azuay	2																						2	
Guayas		25				4																	3	32
Tungurahua			3		1																			4
Pichincha				1	8					2					1								1	13
Cotopaxi					1																			1
Los Ríos						1	2																	3
Santo Domingo							1					1												2
Loja								2															1	3
Orellana									2															2
Pastaza										2														2
Cañar											2													2
Manabí												6												6
Bolivar													2											2
Carchi														1										1
Chimborazo															2									2
El Oro		1														7								9
Napo								1																3
Morona Santia..																		1						1
Sucumbios																					1			1
Imbabura															1									1
Total	2	26	4	8	3	6	1	3	3	4	2	7	2	2	3	7	2	1	1	1	1	1	3	92

NOTA
Los casilleros diagonales pintados corresponden al número de MM en los que la provincia de ocurrencia coincide con la provincia de fallecimiento
Los casilleros por fuera corresponden al número de MM donde la muerte ocurrió en una provincia diferente a la provincia de residencia

La mortalidad materna no siempre se produce en el mismo lugar (provincia) en donde reside la madre, información que se representa en el gráfico 3: lugar de residencia y de fallecimiento de cada caso de MM.


Hasta la SE 31; 72 casos de MM pertenecen al mismo lugar de residencia y de fallecimiento y 20 casos fallecen en otra provincia diferente a la de su residencia.

**Tabla N° 4 Número de MM por zona, provincia, hospital de fallecimiento y hospital de referencia
SE 1 a SE 31**

Z. fallece	Prov.fallece	Ocurrencia	Establecimiento fallece	Referencia	Casos MM				
Zona 1	Carchi	Domicilio	Domicilio	Ninguna	1				
	Imbabura	RPIS/MSP	H. General San Vicente de Paúl	H. General Luis G. Dávila	1				
	Sucumbios	RPIS/MSP	H. General Marco Vinicio Iza	CS Abdón Calderón	1				
Zona 2	Napo	RPIS/MSP	H. General José María Velasco Ibarra	H. General Francisco de Orellana	1				
				Ninguna	1				
	Orellana	RPIS/MSP	H. General Francisco de Orellana	H. General Marco Vinicio Iza	1				
Zona 3	Chimborazo	RPIS/MSP	H. General Docente de Riobamba	Ninguna	2				
	Cotopaxi	RPIS/MSP	H. General Latacunga	Hospital del Día ALANI	1				
	Pastaza	RPIS/MSP	CS TIPO "C" Arajuno	Ninguna	1				
		RPIS/IESS	H. General Puyo	Ninguna	1				
	Tungurahua	RPIS/MSP	H. General de Ambato	Ninguna	1				
Zona 4	Manabi	Domicilio	Domicilio	Ninguna	1				
		RPIS/MSP	H. General Miguel Alcívar	CS Tipo "C" Pedernales	2				
		RPIS/MSP	H. General Rodríguez Zambrano	Ninguna	1				
	Santo Domin..	RPIS/MSP	H. General Verdi Cevallos	Ninguna	2				
		RPIS/MSP	H. General Gustavo Dominguez	CS Tipo "C" La Concordia	1				
Zona 5	Bolívar	Domicilio	Domicilio	Ninguna	2				
	Guayas	RPIS/IESS	H. General de Milagro	Ninguna	1				
		RPIS/MSP	H. General León Becerra	Ninguna	1				
	Los Ríos	RPIS/MSP	H. Sagrado Corazón de Jesús de Qu..	Ninguna	1				
Zona 6	Azuay	RPIS/MSP	H. Básico de Gualaceo	Ninguna	1				
				H. General Vicente Corral Moscoso	H. Básico de Sigsig	1			
	Cañar	RPIS/MSP	H. General Homero Castanier	Ninguna	1				
				Ninguna	H. Básico Luis Fernando Martínez	1			
				Ninguna	Ninguna	1			
Morona Santi..	Domicilio	Domicilio	Ninguna	1					
	Red complement..	SOLCA Machala	Ninguna	1					
Zona 7	El Oro	RPIS/MSP	H. G. O. Angela Loayza de Ollague	H. Básico de Alamor	1				
				H. Básico de Huaquillas	1				
				H. Básico de Pasaje	2				
	Loja	RPIS/MSP	H. General Teófilo Dávila	CS Tipo "C" Velasco Ibarra	1				
				H. General Isidro Ayora	1				
Zona 8	Guayas	RPIS/MSP	H. G. O. Universitario	H. Básico de Huaquillas	1				
				H. Básico de Pasaje	2				
				CS Tipo "C" Velasco Ibarra	1				
				H. Básico de Huaquillas	1				
				H. General Isidro Ayora	1				
Zona 9	Pichincha	RPIS/MSP	H. G. O. Nueva Aurora	H. Básico de Yantzaza	1				
				Ninguna	1				
				Red complement..	Clínica Mogrovejo	1			
				RPIS/IESS	H. General Isidro Ayora	1			
				Red complement..	Clínica Guayaquil	IESS de Quevedo	1		
					H. De la Mujer Alfredo Poulson	Ninguna	1		
				RPIS/IESS	H. Especializado Teodoro Maldonado..	Clínica San Vicente	1		
					H. General del Norte Los Ceibos	Ninguna	1		
				Zona 8	Guayas	RPIS/MSP	H. G. O. Universitario	CS Tipo "C" La Libertad	1
								CS Tipo "C" Materno Infantil Pedro ..	1
H. Básico La Libertad	1								
H. Básico Sagrado Corazón de Jes..	1								
H. General Guasmo Sur	1								
H. General León Becerra	1								
H. General Martín Icaza	1								
H. Matilde Hidalgo de Prócel	1								
H. Básico de Playas	1								
Materno Infantil Alfonso Oramas	1								
Zona 9	Pichincha	RPIS/MSP	H. G. O. Nueva Aurora	Ninguna	5				
				SOLCA	1				
				H. Básico de Playas	1				
				H. General León Becerra	1				
				H. Sagrado Corazón de Jesús de ..	1				
				Ninguna	6				
				Ninguna	1				
				Red complement..	H. Inglés	H. General Docente de Ambato	1		
				H. General Docente de Riobamba	1				
				RPIS/IESS	H. Especializado Carlos Andrade Mar..	Ninguna	1		
Zona 9	Pichincha	RPIS/MSP	H. G. O. Nueva Aurora	Asistanet Sur	1				
				CS TIPO "C" Chimbacalle	Ninguna	1			
				H. De Especialidad Eugenio Espejo	H. General del Puyo	1			
				H. G. O. Isidro Ayora	H. IESS del Puyo	1			
				Ninguna	1				
				H. General Delfina Torres de Conc..	1				
				Ninguna	1				
Total	Traslado	Domicilio	Domicilio	Ninguna	1				
				Ninguna	92				

Hasta la SE 31 del año 2021 en el hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón el Hospital Universitario y el hospital General Guasmo Sur, reportan el mayor número de MM

**Gráfico N° 4 Grupo étnico de casos de MM
SE 1 a SE 31**




Hasta la SE 31; 83 MM, el 90,22% de las mujeres las autoidentifican como mestizas; el 8,70% como indígenas y el 1,09% como afroecuatoriana.

Gráfico N° 5 Porcentaje y número de gestaciones al momento del fallecimiento SE 1 a SE 31




Hasta la SE 31 del año 2021 el 27,17% de las MM era su primera gesta; el 25% tuvieron dos gestas; el 35,87% tuvieron entre 3 y 5 gestas y el 11,96% fueron madres gran multigestas.

Gráfico N° 6 Porcentaje de MM por lugar de ocurrencia SE 1 a SE 31




Hasta la SE 31, las MM que ocurren en establecimientos de salud del MSP es 75%; en el IESS el 8,70%, en la Red Complementaria el 6,52%; en el domicilio el 5,43% y traslado el 4,35%.

Gráfico N° 7 Comparación de casos de MM por años 2017 al 2021 SE 1 a 31




Al comparar los años 2017 al 2021 hasta la SE 31, el año 2020 supera las MM de los años 2017 al 2019 y el 2021, el año 2020 supera en 3 MM al año 2021, tomando en cuenta que los años 2017 al 2019 son datos finales con búsqueda activa, y los años 2020 y 2021 son notificaciones sistemáticas.

Gráfico N° 8 Porcentaje de casos de MM Directa e Indirecta SE 1 a SE 31



Las 92 Muertes Maternas reportadas hasta a la SE 31; el 52,17% son causas Directas, y el 47,83% son causas Indirectas

Gráfico N° 9 MM por grupos de edad SE 1 a SE 31




Hasta la SE 31, el 25% pertenece al grupo comprendido entre 35 a 39 años; seguido del grupo de edad de 25 a 29 años.

Tabla N° 5 Tipo de Parto SE 1 a SE 31

Cesárea	56
Parto vaginal	15
Aborto/legrado	3
Muerte en embarazo	18
Total	92

Las 92 MM notificadas hasta la SE 31; el 60,87% de MM su parto fue por cesárea; el 16,30% de MM su parto fue por vía vaginal y el 19,57% fallecen con el embarazo.

Gráfico N° 10 Condición del RN SE 1 a SE 31




Las 71 MM notificadas hasta la SE 31, y que su parto fue por cesárea y parto vaginal los 57 niños se encuentra vivos y 14 fallecen.

Tabla N° 6 Número de casos de MM por período de ocurrencia SE 1 a SE 31

Prov.fallece	Embarazo	PP Inmedi..	PP Mediato	PP Tardío	Total
Azuay	1		1		2
Bolívar	1	1			2
Cañar	1		1		2
Carchi	1				1
Chimborazo	1			1	2
Cotopaxi		1			1
El Oro	2	1	4	2	9
Guayas	6	9	12	5	32
Imbabura			1		1
Loja		1	1	1	3
Los Ríos		1	1	1	3
Manabí	1	3	2		6
Morona Santi..		1			1
Napo	1	1	1		3
Orellana		1	1		2
Pastaza			2		2
Pichincha	1	3	6	3	13
Santo Domin..		1	1		2
Sucumbios				1	1
Tungurahua	1			2	4
Total	17	24	35	16	92

Gráfico N° 11 Porcentaje de casos de MM por período de ocurrencia SE 1 a SE 31




Hasta la SE 31 del año 2021 el 18,59% (17 MM) ocurren en el momento del embarazo; el 26,1% (24 MM) ocurren en el momento del puerperio inmediato; el 38% (35 MM) ocurre en el momento del puerperio mediato y el 17,4% (16 MM) ocurren en el momento del puerperio tardío.

PP inmediato hasta las 24 horas del post parto.

PP mediato desde 1 día hasta los 10 días del post parto.


PP tardío desde los 11 días hasta los 42 días del post parto

Gráfico N° 12 Tendencia de la Muerte Materna por SE años 2018 al 2021 SE 1 a SE 31




En la SE 31 el año 2018 reporta 3 casos de MM; el año 2019 no reporta casos de MM; el año 2020 reporta 3 casos de MM y el año 2021 en la SE 31 no reporta MM.

Gráfico N° 13 Comparación de casos de MM por lugar de residencia años 2019 y 2020 SE 1 a SE 31



Comparando los casos de MM por lugar de residencia de los años 2020 y 2021 hasta la SE 31; las provincias de; Manabí, Pichincha, Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, Santa Elena, Loja, Esmeraldas y Santo Domingo el año 2021 reportan menos MM que el año 2020; las provincias Guayas, El Oro, Los Ríos, Tungurahua, Pastaza, Orellana, Bolívar, Carchi, Cañar y Zamora reportan más MM el año 2021; las provincias de Napo, Morona y Sucumbios coinciden en número de MM y la provincia de Imbabura para el 2021 no tienen MM.

**Grafico N° 14 Comparación de causas básicas por grupos: años 2016 al 2021
SE 1 a SE 31**



Grupos CB

- Grupo 1 embarazo que termina en aborto
- Grupo 2 trastornos hipertensivos
- Grupo 3 hemorragia obstétrica
- Grupo 4 infecciones relacionadas con obstetricia
- Grupo 5 otras complicaciones obstétricas
- Grupo 6 complicaciones de manejo no previstas
- Grupo 7 indirecta/No obstétrica
- Grupo 8 indeterminada/no concluyente

La OMS con el fin de promover un marco común de comparaciones internacionales, agrupan las causas básicas de muerte durante el embarazo, parto y puerperio en nueve grupos, que son clínica y epidemiológicamente relevantes, simplifican la caracterización de las MM, ya sean de causas directas o indirectas, aclaran y normalizan el reporte de afecciones que se consideran tienen un alto impacto sobre la salud pública.


De las 92 MM registradas en la SE 31 las fuentes de las Causas básicas son de las notificaciones inmediatas tanto de los diagnósticos de la Historia Clínica y de los Certificados de defunción recojidos ese momento, hasta que se realice las Auditorías externas

**Tabla N° 7 Causas Básicas por grupos CIE-10
SE 1 a SE 31**

Grupos CIE-10	Causa Básica de defunción	Casos
Grupo 1	Aborto incompleto	1
	Embarazo ectópico accidentado	1
	Eclampsia	8
Grupo 2	Preeclampsia severa	11
	Síndrome de Hellp	6
Grupo 3	Atonía uterina	1
	Desgarro cervical	1
	Desprendimiento de la placenta por hemat..	1
	Retención placentaria	2
	Shock hipovolémico	3
Grupo 4	Infección de la Bolsa Amniótica o de las me..	1
	Sepsis puerperal	2
	Shock séptico	3
	Shock séptico por aborto	1
	Shock séptico por aborto provocado	1
Grupo 5	Embolia del Líquido amniótico	1
	Placenta previa	1
	Trastornos de la Placenta	1
Grupo 7	Tromboembolia pulmonar	1
	COVID-19	23
	Dengue grave	1
	ECV Isquémica con hemorragia	1
	Fibrosarcoma	1
	Insuficiencia cardíaca congestiva descomp..	1
	Insuficiencia respiratoria aguda	3
	Leucemia	1
	Linfoma no especificado	1
	Neumonía bacteriana	1
	Neumonía grave	1
	Parasitosis intestinal	1
	Sepsis del foco urinario	1
	Septicemia debido a otros organismos Gra..	1
	Tetralogía de Fallot	1
	Trastorno hidroelectrolítico	1
	Tromboflebitis séptica	1
Trombosis Ileo femoral profundo	1	
Grupo 8	Muerte obstétrica de causa no especificada	4
Total		92

Los grupos y diagnósticos son preliminares, hasta la obtención del Informe de las auditorías externas

**Gráfico N° 15 Tasa de MM por provincia de residencia y por 10.000 embarazadas
SE 1 a SE 31**



La tasa de muerte materna de cada una de las provincias está calculada por: número de MM hasta los 42 días de post parto, ocurridas en cada una de las provincias a la SE 31, dividida para la proyección de embarazadas del año 2021 y multiplicada por 10.000.

La provincia de Pastaza reporta una tasa de 12,1; lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia 12 embarazadas están en riesgo de fallecer; Orellana reporta una tasa de 6,2 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia 6 están en riesgo de fallecer; Carchi, Napo y El Oro reportan tasas de 4,9 y 4,5 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 5 están en riesgo de fallecer; Bolívar reporta una tasa de 3,7 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia 4 están en riesgo de fallecer; Zamora, Cañar, Santa Elena, Guayas y Los Ríos reportan tasas de 2,8 a 2,5 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 3 están en riesgo de fallecer; Chimborazo, Loja, Cotopaxi, Morona y Sucumbios reportan tasas de 2,4 a 1,6 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 2 embarazadas están en riesgo de fallecer; Pichincha, Azuay, Santo Domingo y Esmeraldas presentan tasas de 1,1 a 0,6; es decir que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 1 embarazada está en riesgo de fallecer.