

SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZONOTICAS: MORDEDURA DE ANIMALES SUSCEPTIBLES A RABIA
ECUADOR 2022 SE 1 A 49

La rabia es una enfermedad viral casi siempre mortal que se transmite a los humanos mediante el contacto con la saliva de animales infectados, tanto domésticos como salvajes. Las primeras manifestaciones son la fiebre, que a menudo se acompaña de dolor o parestesias (sensación inusual o inexplicada de hormigueo, picor o quemazón) en el lugar de la herida, cefaleas y malestar general. A medida que el virus se extiende por el sistema nervioso central se produce una inflamación progresiva del cerebro y la médula espinal que termina en la muerte. (1)

La vigilancia de esta enfermedad está relacionada a su alta letalidad que alcanza el 100% como consecuencia de la Encefalitis aguda. (1)


Se calcula que en todo el mundo se producen anualmente 10 millones de exposiciones en seres humanos y 55 defunciones por rabia, casi todas en los países en desarrollo, en particular en Asia y África. (2) La mayoría de muertes en seres humanos son secundarias a mordeduras de perro en las cuales no se brindó una profilaxis adecuada después de la exposición. (3)

En Ecuador el primer caso de rabia se notificó en 1941, en 1996 el país registro la más grave epidemia de rabia con 65 personas fallecidas con una tasa de mortalidad de 0.58 por 100.000 mil habitantes, una de las más altas de los países de las Américas.(3) El último caso registrado de rabia en caninos fue en el 2006 y en el 2011 se registró un caso de rabia silvestre en humanos.

En el país se ha diagnosticado rabia en otras especies, de animales que incluyen, felinos, bovinos, porcinos, equinos y ovinos, en zonas rurales y urbanas marginales, así como también rabia silvestre en murciélagos.(3)

Durante el año 2022 hasta la SE37, hay un aumento en la notificación de mordeduras por animales susceptibles de rabia, en relación al año 2021, a partir de esta semana se observa una disminución en la notificación. La provincia con mayor notificación es Pichincha con 2.309 casos,seguido de Guayas y Manabí con 1.327 y 1.200 casos respectivamente.

Casos de mordeduras por animales susceptibles a rabia por años 2018-2022*




Casos de mordedura por animales susceptibles a rabia por provincia de domicilio SE 1- 49

Prov Domic	SE 1 a SE 48	SE 49	Total
PICHINCHA	2.283	26	2.309
GUAYAS	1.303	24	1.327
MANABI	1.187	13	1.200
TUNGURAHUA	924	2	926
COTOPAXI	394	4	398
ESMERALDAS	390	1	391
LOS RIOS	385	4	389
AZUAY	363	7	370
SANTO DOMING..	290	7	297
CHIMBORAZO	277	1	278
IMBABURA	246	1	247
ZAMORA CHINC..	246		246
MORONA SANTI..	237	4	241
SANTA ELENA	237	3	240
CARCHI	233	1	234
BOLIVAR	228	5	233
SUCUMBIOS	229	3	232
CAÑAR	226	5	231
PASTAZA	206	2	208
LOJA	184	1	185
ORELLANA	109		109
NAPO	99	2	101
EL ORO	88	1	89
GALAPAGOS	2		2
Total	10.366	117	10.483

Casos de mordedura por animales susceptibles a rabia por provincia de domicilio SE 1- 49



Casos de mordeduras por animales susceptibles a rabia por edad y sexo SE 1- 49



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación


Bibliografía

1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos delsubsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en America Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005

La Leptospirrosis es una zoonosis, que se encuentra dentro de los eventos bajo vigilancia epidemiológica dentro del Sistema SIVE ALERTA, de notificación obligatoria inmediata individual. Es una enfermedad ampliamente difundida por todo el mundo, que afecta a los animales tanto de sangre fría, como caliente, los mamíferos cumplen un rol muy importante dentro de la epidemiología en la transmisión hacia los humanos, la enfermedad puede producir brotes con alta tasa de morbilidad y se están reconociendo nuevas formas clínicas de elevada letalidad.

En Ecuador la Leptospirrosis, se ha estimado una media anual de 1 caso por 100.000 habitantes, entre los años 2016 al 2018 se han confirmado 363 casos, con mayor predominio en las provincias de la costa (Manabí, Esmeraldas y Los Ríos) con un porcentaje de 43% del total de provincias donde se presentaron casos. Comparando los casos presentados en el año 2020 se notificaron 137 casos, en el año 2021 se notificaron 75 casos, hasta la SE 49 del 2022 se han notificado 123 casos.


Número de casos de Leptospira años 2020 al 2022 SE 1 a SE 49




Casos de Leptospira por provincia SE 1 a SE 49

Prov Domic	SE 1 a SE 49
MANABI	38
ESMERALDAS	23
GUAYAS	8
LOJA	8
PICHINCHA	7
SUCUMBIOS	6
ZAMORA CHINCHIPE	6
EL ORO	5
NAPO	5
SANTO DOMINGO DE LOS T..	5
MORONA SANTIAGO	3
AZUAY	2
LOS RIOS	2
PASTAZA	2
COTOPAXI	1
IMBABURA	1
ORELLANA	1
Total	123

Casos de Leptospira por provincia SE 1 a SE 49



Casos de Leptospirrosis por grupos de edad y sexo SE 1 a 49



Fuente: Sistema de vigilancia SIVE-VIEPI
Elaborado por: DNVE
Datos sujetos a variación

ENFERMEDADES ZONÓTICAS **BRUCELOSIS**
ECUADOR 2022
SE 1 a SE 49


La Brucelosis es un evento de salud pública que se encuentra bajo vigilancia dentro del Sistema SIVE-ALERTA, de notificación individual inmediata; es una de las zoonosis de mayor difusión en el mundo en seres humanos y animales domésticos. La enfermedad se adquiere por el contacto directo por vía cutánea o por aerosoles procedente de sangre, placenta, fetos o secreciones uterinas o por el consumo de productos de origen animal infectados, crudos o mal cocidos (leche, productos lácteos y cárnicos). Se considera una enfermedad profesional en ganaderos, veterinarios y otras profesiones expuestas. Producida por bacterias del género *Brucella*, que ataca a varias especies de mamíferos, dentro de los cuales se encuentra el ser humano. La brucelosis presenta dos patrones epidemiológicos:

Patrón urbano-alimentario, por consumo de leche cruda y quesos frescos,

Patrón rural-laboral, por exposición profesional al ganado infectado o sus productos bien sea por contacto o inhalación.

De acuerdo a la notificación en el SIVE-ALERTA, en el año 2021 se tuvo 19 casos, en tanto que en lo que va del año 2022, se han presentado 12 casos hasta la SE 49 los grupos más afectados son de 20 a 49 años.


Número de casos de Leptospira años 2020 al 2022 SE 1 a SE 49




Casos de Leptospira por provincia SE 1 a SE 49

Prov Domic	SE 1 a SE 49
CAÑAR	2
LOJA	2
AZUAY	1
ESMERALDAS	1
GUAYAS	1
MORONA SANTIAGO	1
ORELLANA	1
PICHINCHA	1
SUCUMBIOS	1
ZAMORA CHINCHIPE	1
Total	12

Casos de Leptospira por provincia SE 1 a SE 49



Casos de Leptospirosis por grupos de edad y sexo SE 1 a 49



Fuente: Sistema de vigilancia SIVE-VIEPI
Elaborado por: DNVE
Datos sujetos a variación