

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZONOTICAS: MORDEDURA DE ANIMALES SUSCEPTIBLES A RABIA
ECUADOR 2024 SE 01-19


Anualmente 10 millones de exposiciones en seres humanos y 55 defunciones por rabia, casi todas en los países en desarrollo, en particular en Asia y África. (2) La mayoría de muertes en seres humanos son secundarias a mordeduras de perro en las cuales no se brindó una profilaxis adecuada después de la exposición. (3) En Ecuador el primer caso de rabia se notificó en 1941, en 1996 el país registro la más grave epidemia de rabia con 65 personas fallecidas con una tasa de mortalidad de 0.58 por 100.000 mil habitantes, una de las más altas de los países de las Américas. (3) El último caso registrado de rabia en caninos fue en el 2006 y en el 2011 se registró un caso de rabia silvestre en humanos. En el país se ha diagnosticado rabia en otras especies, de animales que incluyen, felinos, bovinos, porcinos, equinos y ovinos, en zonas rurales y urbanas marginales, así como también rabia silvestre en murciélagos. (3)

En el año 2022 la notificación de mordeduras por mamíferos susceptibles de rabia aumento en relación al año 2021. La provincia con mayor notificación en el año 2022 fue Pichincha con 2.398 casos, seguido de Guayas y Manabí con 1.384 y 1.2226 casos respectivamente.

Para el año 2023 se han reportado 14.461 exposiciones

Para el año 2024 hasta la semana epidemiológica (SE) 19 se han reportado 6.353 exposiciones siendo la provincia de Pichincha la que reporta el mayor número de exposiciones con 1.679 el grupo de edad más afectado es el de 20 a 49 años en el sexo femenino con el 54.03%. sin embargo, estos datos son provisionales y sujetos a cambios por validación y cierre de los casos en el sistema de notificación.


Casos de Mordedura de animales subseptibles a r bia por Semana Epidemiol gica SE 01-19. Ecuador 2024




Casos de Mordedura de animales subseptibles a r bia por Provincia SE 01-19. Ecuador 2024

Prov Domic	SE 01-17	SE 18	Total
PICHINCHA	1.587	92	1.679
GUAYAS	810	33	843
MANABI	566	30	596
TUNGURAHUA	441	15	456
AZUAY	266	7	273
LOS RIOS	224	14	238
COTOPAXI	216	17	233
BOLIVAR	186	12	198
ESMERALDAS	188	9	197
SANTO DOMINGO	158	8	166
CHIMBORAZO	147	16	163
ZAMORA CHINCHIPE	136	7	143
CA��AR	126	4	130
SUCUMBIOS	119	8	127
SANTA ELENA	121	5	126
MORONA SANTIAGO	119	6	125
LOJA	111	11	122
IMBABURA	111	7	118
NAPO	104	7	111
PASTAZA	101	6	107
CARCHI	85	4	89
ORELLANA	59	3	62
EL ORO	48	3	51
Total	6.029	324	6.353

Casos de Mordedura de animales subseptibles a r bia por Provincia SE 01-19 Ecuador 2024



Caso de Mordedura de animales subseptibles a r bia, por grupos de edad y sexo SE 01-19 Ecuador 2024



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variaci n Bibliograf a
1. Ministerio de Salud P blica del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acci n SIVE-ALERTA, DNVE 2014
2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edici n, Dr. David L. Heymann, OPS 2015
3. Eliminaci n de la rabia humana transmitida por perros en Am rica Latina; An lisis de Situaci n, Washintong D.C: OPS 2005

SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
 DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
 ENFERMEDADES ZONOTICAS: BRUCELOSIS
 ECUADOR 2024 SE 01-19


La Brucelosis es un enfermedad zoonótica, producida por varias especies de bacterias de género Brucella (Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Brucella canis, Brucella ceti y Brucella pinnipedialis, las tres primeras son las que principalmente afectan al hombre); en humanos puede ser de comienzo agudo o insidioso, se caracteriza por presentar fiebre continua, intermitente o irregular de duración variable, "sudoración profusa, artralgia, mialgia (triada clásica)", cefalea, debilidad, fatiga, anorexia y pérdida de peso. Puede durar días, meses o más de un año si no es tratada adecuadamente.

El reservorio más común es el ganado vacuno, porcino, caprino y ovino; el período de incubación puede ser de cinco a 60 días, más comúnmente de uno a dos meses. Entre los mecanismos de transmisión están el contacto directo con el animal infectado a través de la mucosas o piel lesionada con tejidos, sangre, orina, secreciones vaginales, fetos abortados, especialmente placentas. Consumir alimentos o bebidas contaminadas como carne poco cocida, productos lácteos no pasteurizados. La inhalación de agentes transmitidos por el aire.

La prevención más importante es eliminar la infección de los animales contaminados, así como la capacitación y entrenamiento del personal expuesto; la búsqueda activa de casos, la vigilancia epidemiológica, esta vigilancia que debe ser coordinada en territorio con Agrocalidad.

En el Ecuador de acuerdo a las cifras ingresadas al Sistema de Vigilancia la incidencia de la enfermedad en humanos para el año 2022 es de 0.16 por 100.000 habitantes; hasta la SE 19 de 2024 se ha notificado 11 casos, la provincia con el mayor número de casos reportados es de Imbabura con 8


Casos de A230-A239 Brucelosis, por Semana Epidemiológica SE 01-19. Ecuador 2024



Casos de A230-A239 Brucelosis, por Provincia SE 01-19. Ecuador 2024


Casos de A230-A239 Brucelosis, por Provincia SE 01-19 Ecuador 2024

Prov Domic	SE 01- 16	SE 17	Total
IMBABURA	3	5	8
SANTO DOMINGO	1	0	1
MANABI	1	0	1
GUAYAS	1	0	1
Total	6	5	11



Los casos de la semana, positivos de la SE 18, se encuentran estudio, por lo que este dato es susceptible de cambio

Caso de A230-A239 Brucelosis, por grupos de edad y sexo SE 01-19 Ecuador 2024



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación
 Bibliografía
 1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
 2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr. David L. Heymann, OPS 2015
 3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en America Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005


SECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS Leptospira
ECUADOR 2024 SE 01-19

serovariedades agripadas en 26 serogrupos, que afectan sobre todo a animales salvajes y domésticos, lo mismos que son reservorios. El periodo de incubación por lo general es de 5 a 14 días con periodos de 2 a 30 días. Se trasmite por contacto de las mucosas o piel lesionada con tierra húmeda o vegetación contaminada con orina o tejidos de animales infectados, agua contaminada. La enfermedad se presenta de cuatro formas clínicas, 1) Sd. Gripal leve 2) Síndrome de Weil, en el que se presenta ictericia, insuficiencia renal, hemorragia y miocarditis con arritmia, 3) Meningitis o meningoencefalitis y 4) Hemorragia pulmonar que lleva con insuficiencia respiratoria, en su fase aguda (primera fase) se presenta fiebre alta, mialgias, cefalea frontal y retro orbitaria, se acompaña de nauseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, tos, fotofobia y erupción en tronco y región pretibial, en el 30% de pacientes de presenta enrojecimiento conjuntival. En la segunda fase (fase inmunitaria) tenemos fiebre prolongada, ictericia, insuficiencia renal, hemorragia, insuficiencia respiratoria, hipotensión miocarditis, meningitis, confusión mental y depresión. En el Ecuador la leptospirosis se vigila debido a que es potencialmente causa de enfermedad grave o muerte. En el 2022 entre la semana 1 a 12 de acuerdo la fecha de notificación se tiene 40 casos.

En el año 2023 se han registrado 663 casos

En el año 2024 hasta la semana epidemiológica (SE), 19 se han registrado 197 casos, 83 de ellos en la provincia del Guayas, el grupo de edad más afectado es el de 20 a 49 años en el sexo masculino con el 53.29%.


Casos de A270-A279 Leptospirrosis por Semana Epidemiológica SE 01-19. Ecuador 2024




Casos de A270-A279 Leptospirrosis por Provincia SE 01-19. Ecuador 2024

Prov Domic	SE 01- 16	SE 17	Total
GUAYAS	76	7	83
MANABI	41	3	44
LOS RIOS	9	2	11
SANTO DOMINGO	9		9
NAPO	8		8
PICHINCHA	6	1	7
MORONA SANTIAGO	7		7
ORELLANA	4		4
LOJA	4		4
ESMERALDAS	4		4
SUCUMBIOS	3		3
SANTA ELENA	1	1	2
EL ORO	2		2
AZUAY	2		2
ZAMORA CHINCHIPE	1		1
TUNGURAHUA	1		1
PASTAZA	1		1
IMBABURA	1		1
COTOPAXI	1		1
CAÑAR		1	1
BOLIVAR	1		1
Total	182	15	197

Casos de A270-A279 Leptospirrosis, por Provincia SE 01-19 Ecuador 2024



Casos de A270-A279 Leptospirrosis, por grupos de edad y sexo SE 01-19 Ecuador 2024



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación
Bibliografía
1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr. David L. Heymann, OPS 2015
3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en América Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C.: OPS 2005