


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
INMUNOPREVENIBLES HEPATITIS B CIE - 10 B16.0 <-> B16.9
Ecuador, SE 01-07 / 2025

La hepatitis B es una infección hepática potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B (VHB). Constituye un importante problema de salud a nivel mundial. La máxima prevalencia de la hepatitis B se registra en las regiones del Pacífico Occidental y de África, en las que el 6,2% y el 6,1% de la población adulta, respectivamente, están infectados. En las regiones de la OMS del Mediterráneo Oriental, de Asia Sudoriental y de Europa se calcula que, un 3,3%, un 2,0% y un 1,6% de la población, respectivamente, padecen infección. En la región de la OMS de las Américas, el porcentaje de personas con hepatitis B es del 0,7% (1). En el Ecuador la vigilancia hasta el 2018 se realizó con modalidad grupal, con el objetivo de lograr una caracterización epidemiológica del evento para el 2019, se cambió a modalidad individual.


En el 2024 hasta la SE 52 se reporta 372 casos de Hepatitis B, la provincia con el mayor número de casos es Pichincha con 78.

En el 2025 hasta la SE 07 se reporta 52 casos de Hepatitis B, la provincia con el mayor número de casos es Guayas con 11 casos


PROVINCIA	SE 01-06	SE 07	Total
GUAYAS	11		11
ESMERALDAS	6	1	7
MANABI	7		7
MORONA SANTIAGO	6		6
PICHINCHA	6		6
AZUAY	5		5
CHIMBORAZO	3		3
COTOPAXI	2		2
NAPO	2		2
LOS RIOS	1		1
SANTO DOMINGO	1		1
SUCUMBIO	1		1
Total	51	1	52



Caso de Hepatitis B, por grupos de edad y sexo Ecuador, año 2025 SE 01-07



Casos de Hepatitis B, por grupos de edad y sexo Ecuador, año 2020-2025 (SE 01-07)



1. Chin J, American Public Health Association. El control de las enfermedades transmisibles. Decimonove. L HD, editor. ops; 2011. 748 p