



La tosferina es una enfermedad bacteriana aguda que afecta a las vías respiratorias, es más grave en los lactantes y en los niños de corta edad. Existe tres fases : La Faser Catarral, Fase Paroxística y la Fase de Convalecencia. La letalidad en los países en desarrollo puede alcanzar el 15%, siendo la más alta en los lactantes. En el año 2022 se presentó un brote con 18 casos en la provincia de Los Ríos. En el año 2023 hasta la SE 16 se han presentado 15 casos de tosferina, la Provincia del Napo es la más afectada con 5 casos. En el año 2024 hasta la SE 52 se han presentado 138 casos de tosferina, la Provincia de Santo Domingo es la más afectada con 35 casos, el grupo de edad en que se detecta la mayor incidencia es en menores de un año. En el año 2025 hasta la SE 18 se han presentado 412 casos, la provincia con el mayor número de casos es la del Guayas con 116 casos.

Casos de A370-A379 Tosferina SE 01-18 Ecuador 2025		
PROVINCIA	SE 01-17	Total
GUAYAS	116	116
MANABI	78	78
PICHINCHA	64	64
SANTO DOMINGO	36	36
AZUAY	20	20
TUNGURAHUA	14	14
NAPO	14	14
LOJA	14	14
IMBABURA	13	13
EL ORO	10	10
COTOPAXI	10	10
CAÑAR	7	7
LOS RIOS	6	6
ORELLANA	4	4
ESMERALDAS	3	3
ZAMORA CHINCHIPE	2	2
MORONA SANTIAGO	1	1
Total	412	412



Casos de A370-A379 Tosferina por grupo de edad y sexo SE 01-18 Ecuador 2025



Caso de A370-A379 Tosferina, por grupos de edad, condición final y sexo Ecuador, año 2025 SE 01-18

	Muerto		Vivo	
	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
< Menor a un año	2	4	137	105
De 1 a 4 años	1	4	31	20
De 5 a 9 años			9	10
De 10 a 14 años			18	17
De 15 a 19 años			3	5
De 20 a 49 años		1	14	14
De 50 a 64 años	2		3	3
DE 65 y más	1		4	8

SEXO	Cantidad	Porcentaje
MUJER	187	45,388%
HOMBRE	225	54,612%

Casos de A370-A379 Tosferina por semana epidemiológica años 2020 al 2024 SE 01-52 Ecuador 2025 SE 01-18

