



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

NEUMONÍA CIE - 10 J9 - J22
Ecuador, SE 18 / 2025

La neumonía es la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo. Se calcula que la neumonía es la causa de fallecimiento de aproximadamente 1.4 millones de niños/as menores de 5 años en el año 2015, representando un 15% de todas las defunciones de niños/as menores de 5 años.

La neumonía afecta a niños/as y a sus familias en general, pero su prevalencia es mayor en el África subsahariana y Asia meridional (1). En el Ecuador la vigilancia de la Neumonía es agrupada. Para el año 2024 hasta la SE 52 se ha reportado 115.688 casos de neumonía, la provincia de Pichincha representa el 34,83% de los casos seguida de la provincia de Guayas con el 11,31%, Azuay con el 5,91% y Morona Santiago 5,86% de casos notificados a nivel nacional. El grupo de edad más afectado es el de 1 a 4 años, seguida del grupo de 65 años y más años y el grupo de 9 a 14 años.

En el Ecuador la vigilancia de la Neumonía es agrupada. Para el año 2025 hasta la SE 18 se ha reportado 57.113 casos de neumonía, la provincia de Pichincha representa el 38,14% de los casos seguida de la provincia de Guayas con el 10,45%, seguida por Azuay con el 5,69% y Tungurahua 5,43%.de casos notificados a nivel nacional. El grupo de edad más afectado es el de 1 a 4 años, seguida del grupo de 65 años y más años y el grupo de 9 a 14 años...



Fuente: SIVE-SAlerta DNVE

Elaboración: SSVVE

1. Organización Mundial de la Salud. Neumonía. 2016; Available from: <http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia>