


ESQUEMA DE VACUNACIÓN



ESQUEMA ANTERIOR		
ESQUEMA ANTERIOR	EDAD	VACUNAS
MENORES DE UN AÑO	Recién nacido dentro de las primeras 24 horas. Dosis única.	BCG
	Recién nacido dentro de las primeras 24 horas. Dosis única.	HB
	2 meses	ROTAVIRUS
		fipV
		PENTAVALENTE*
		NEUMOCOCO 10**
	4 meses	ROTAVIRUS
		fipV
		PENTAVALENTE*
		NEUMOCOCO 10**
6 meses	bOPV	
	PENTAVALENTE*	
	NEUMOCOCO 10**	
	INFLUENZA ESTACIONAL	
12 MESES A 23 MESES	12 meses	FA SRP 1
	15 meses	Varicela
	18 meses	DPT
		bOPV SRP 2
	5 años	DPT
		bOPV
9 años (Niñas)	HPV 1 HPV 2 (Dos dosis)***	
	ADOLESCENCIA	15 años
ADULTOS Vacunación en grupos de riesgo	Embarazadas	dT
	Mujeres en edad fértil. Hombres	dT
	Personal de Salud, trabajadoras sexuales, Personas Privadas de Libertad (PPL), personas que viven con VIH.	HB
	Viajeros	SR
		FA
	Embarazadas, Personal de Salud, enfermos crónicos desde 6 meses en adelante, adultos de 65 años y más, Personas Privadas de Libertad (PPL), personas con discapacidad.	Influenza Estacional Triv. Adulto

ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN 2025		
GRUPO ETARIO	EDAD	VACUNAS
MENORES DE UN AÑO	Recién nacido dentro de las primeras 24 horas. Dosis única.	BCG: Meningitis Tuberculosa y Tuberculosis pulmonar diseminada
	Recién nacido dentro de las primeras 24 horas. Dosis única.	HB: Hepatitis B por transmisión vertical (madre con antecedente de HB)
	2 meses	ROTAVIRUS: Enfermedad diarreica aguda por rotavirus.
		HEXAVALENTE*: Previene 6 enfermedades: Toxide diftérico, Toxide tetánico, B Pertussis (tos ferina) de célula entera, HbsAg (hepatitis B), Vacuna inactivada de Polio Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 Y Haemophilus influenzae tipo B
		NEUMOCOCO 13**: Neumonías, meningitis, otitis por streptococcus pneumoniae
		ROTAVIRUS • HEXAVALENTE* • NEUMOCOCO 13**
	4 meses	ROTAVIRUS • HEXAVALENTE* • NEUMOCOCO 13**
6 meses	bOPV: Poliomielitis	
	HEXAVALENTE* • NEUMOCOCO 13**	
INFLUENZA ESTACIONAL		
12 MESES A 23 MESES	12 meses	FA: Fiebre amarilla SRP 1: Sarampión, Rubeola y Parotiditis (Paperas)
	15 meses	Varicela
	18 meses	HEXAVALENTE* • bOPV • SRP 2
NIÑEZ	5 años	DPT: (Difteria, Tosferina, Tétanos) bOPV
	9 años (Niñas y niños)	HPV: Virus del Papiloma Humano (Dosis única)***
ADOLESCENCIA	15 años	dT: Difteria y tétanos
ADULTOS Vacunación en grupos de riesgo	Embarazadas	dT • HB (De acuerdo al antecedente vacunal)
		Tdap****: Antipertussis acelular (Tosferina), Toxoides tetánico, Diftérico.
	Mujeres en edad fértil. Hombres	dT (Cinco dosis de acuerdo al antecedente vacunal)
	Personal de Salud, trabajadoras sexuales, Personas Privadas de Libertad (PPL), personas que viven con VIH.	HB (De acuerdo al antecedente vacunal)
	Viajeros	SR (Sarampión y Rubeola)
FA (De acuerdo al antecedente vacunal)		
Embarazadas, Personal de Salud, enfermos crónicos desde 6 meses en adelante, adultos de 65 años y más, Personas Privadas de Libertad (PPL), personas con discapacidad.		Influenza Estacional Triv. Adulto
• Niños de 6 meses a 4 años sin vacunación previa • Personas de 5 años o más sin vacunación previa • Personas mayores de 65 años sin vacunación previa.		COVID****

* Actualización Pentavalente por Hexavalente.
 ** Actualización Neumococo 10 por Neumococo 13.
 *** Actualización HPV, incluye a niñas y niños de 9 años.

**** La vacuna Tdap se incorpora al Esquema Nacional de Vacunación y está dirigida a mujeres embarazadas. Se colocará una dosis en cada embarazo.
 ***** Inclusión de la vacunación COVID-19, al esquema regular