


Hasta la semana Epidemiológica (SE) 33, en el 2025, se han reportado 301 casos de intoxicación por plaguicidas. En comparación, en todo el año 2024 se registraron 567 casos. Los incidentes relacionados con herbicidas y fungicidas representan el 46,73% del total, seguidos por las intoxicaciones por organofosforados y carbamatos, que constituyen el 29,91%. La mayor afectación se observa en el sexo masculino, que representa el 67% de los casos, siendo las edades de 20 a 49 años las más afectadas. La provincia de Guayas reporta la mayor cantidad de casos, con 81, seguida de Manabí con 75 y Orellana con 60. Según la FAO, un plaguicida o pesticida es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir plagas, incluyendo especies indeseadas de plantas o animales, durante las etapas de producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales.


Casos y tasas de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-33 año 2025

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos	Tasa provincia por 100milH.
	SE 01-32	SE 33	SE 01-32	SE 33	Total	Total
MORONA SANTIAGO	40		16,9		40	16,9
ORELLANA	25		13,7		25	13,7
BOLIVAR	23		10,6		23	10,6
SUCUMBIOS	16		7,3		16	7,3
COTOPAXI	17	1	3,6	0,2	18	3,8
MANABI	59		3,6		59	3,6
ZAMORA CHINCHIPE	3		2,5		3	2,5
TUNGURAHUA	13		2,2		13	2,2
LOJA	9		1,8		9	1,8
PASTAZA	2		1,6		2	1,6
LOS RIOS	13		1,3		13	1,3
ESMERALDAS	8		1,3		8	1,3
GUAYAS	56		1,2		56	1,2
CHIMBORAZO	5	1	1,0	0,2	6	1,2
SANTO DOMINGO	6		1,1		6	1,1
CARCHI	1		0,6		1	0,6
EL ORO	2		0,3		2	0,3
PICHINCHA	1		0,0		1	0,0
Total	299	2	1,9	0,2	301	1,9


Tasa por 100mil H. de Intoxicación por plaguicidas, Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-33 año 2025




Casos de Intoxicación por plaguicidas, por grupos de edad y sexo Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01- 33 año 2025




Casos de Intoxicación por plaguicidas, por tipo, Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-33 año 2025



Casos de Intoxicación por plaguicidas por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2021 - 2025





Tasa por regiones, por 100mil Habitantes de Plaguicidas año 2025 SE 01-33



Alcohol metílico
Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-33 / 2025

El metanol es un compuesto químico utilizado en diversas industrias y presente en numerosos productos de limpieza, anticongelantes, pinturas y barnices. La intoxicación por metanol puede ocurrir de manera accidental durante la manipulación de estos productos o por autolesión. A lo largo de la historia, se han registrado múltiples epidemias causadas por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, provenientes de destilerías clandestinas que utilizaban este alcohol como una alternativa más económica al etanol. A pesar de los diferentes tratamientos disponibles, la tasa de mortalidad permanece elevada, oscilando entre el 26% y el 50%. Además, en los casos en los que no se produce la muerte, se observa una alta incidencia de secuelas neurológicas y visuales, incluyendo la ceguera. (Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, B. Ferrer Dufol, A. Civeira Murillo, E. Gutiérrez Cia, I. Laguna Castrillo, M. Cerrada Lamuela, E., 2002).




Hasta la semana 33 del año 2025, se han reportado un total de 1.091 casos de mordeduras de serpientes en Ecuador. La provincia de mayor tasa por cien mil habitantes es morona Santiago que registra 63 personas. Del total de casos notificados, 201 han sido clasificados como mordeduras graves, lo que representa el 18.42% del total. En el año 2024, se reportaron 1,501 casos de mordeduras de serpientes en el país. La provincia de Manabí fue la que registró la mayor cantidad, con 2 casos. De los casos notificados en ese año, 187 fueron clasificados como mordeduras graves, lo que equivale al 12.52% del total. En Ecuador, existen aproximadamente 215 especies de serpientes, de las cuales 35 son venenosas y representan un alto riesgo para la salud humana. Estas serpientes se encuentran principalmente en áreas con altitudes inferiores a los 2,500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y en zonas de clima tropical y subtropical.


Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES, por provincia de domicilio Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-33 año 2025

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos		Tasa provincia por 100milH.
	SE 01-32	SE 33	SE 01-32	SE 33	Total	Total	Total
MORONA SANTIAGO	145	3	61	1	148	63	
PASTAZA	57	3	46	2	60	48	
ZAMORA CHINCHIPE	42		35		42	35	
ORELLANA	58		32		58	32	
NAPO	43		30		43	30	
SUCUMBIOS	37	1	17	0	38	17	
LOJA	71		14		71	14	
ESMERALDAS	87		14		87	14	
MANABI	182		11		182	11	
BOLIVAR	22		10		22	10	
SANTO DOMINGO	51		9		51	9	
LOS RIOS	75		7		75	7	
COTOPAXI	24	2	5	0	26	5	
EL ORO	36		5		36	5	
SANTA ELENA	15		4		15	4	
CARCHI	5		3		5	3	
GUAYAS	76		2		76	2	
CAÑAR	4		1		4	1	
IMBABURA	6		1		6	1	
CHIMBORAZO	6		1		6	1	
PICHINCHA	31		1		31	1	
AZUAY	8		1		8	1	
ZONA NO DELIMITA..	1				1		
Total	1.082	9	6	1	1.091	6	

Tasa por 100mil H. de MORDEDURA DE SERPIENTES, Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-33 año 2025




Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES, por grupos de edad y sexo Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-33 año 2025




Número de casos de mordeduras de serpientes según condición final y sexo Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-33 año 2025

SEXO	Con dis capacidad			Total
	Muer..	Vivo		
HOMBRE	3	768		771
MUJER	1	1	318	320
Total	1	4	1.086	1.091


MORDEDURA DE SERPIENTES, por tipo Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-33



Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2021 - 2025



Tasa por regiones, por 100mil Habitantes de T630 Mordedura de serpiente año 2025 semana epidemiológica (SE) 01-33 año 2025




En el año 2025, se han notificado 320 casos, la provincia de Morona Santiago es la que acumula el mayor número de casos con 78. En el año 2024 hasta la semana 52 un total de 517 casos, de los cuales Morona Santiago, Manabí y Guayas son las provincias con más casos con 175, 77 y 66 respectivamente. La edad de mayor afectación es de 20 a 49 años, con similar proporción entre mujeres y hombres. De lo que va del año no se han registrado víctimas mortales por picaduras de escorpión. Las picaduras de escorpión son dolorosas, pero rara vez ponen en peligro la vida. Los adultos sanos generalmente no necesitan tratamiento para las picaduras de escorpión. Los niños pequeños y los adultos mayores tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. En todo el mundo, de las más de 2000 especies de escorpiones, aproximadamente 100 producen veneno que puede ser mortal.

Casos de Picadura de Escorpión, por provincia de domicilio Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-33 año 2025

PROVINCIA	Casos	Tasa provincia	Casos	Tasa provincia
	SE 01-32	por 100milH.	Total	por 100milH.
MORONA SANTIAGO	78	33,0	78	33,0
ORELLANA	18	9,8	18	9,8
SUCUMBIOS	16	7,3	16	7,3
SANTO DOMINGO	25	4,4	25	4,4
PASTAZA	5	4,0	5	4,0
MANABI	51	3,1	51	3,1
BOLIVAR	5	2,3	5	2,3
ESMERALDAS	13	2,1	13	2,1
NAPO	2	1,4	2	1,4
GUAYAS	63	1,4	63	1,4
CHIMBORAZO	5	1,0	5	1,0
EL ORO	6	0,8	6	0,8
LOJA	4	0,8	4	0,8
PICHINCHA	18	0,6	18	0,6
LOS RIOS	6	0,6	6	0,6
SANTA ELENA	2	0,5	2	0,5
COTOPAXI	1	0,2	1	0,2
IMBABURA	1	0,2	1	0,2
AZUAY	1	0,1	1	0,1
Total	320	1,9	320	1,9


Tasa por 100mil H. de Picadura de Escorpión, Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-33 año 2025




Número de casos de Picadura de Escorpión según condición final y sexo Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-33 año 2025

SEXO	Casos	Porcentaje
HOMBRE	147,0	45,94%
MUJER	173,0	54,06%

Casos de Picadura de Escorpión, por grupos de edad y sexo Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-33 año 2025



Casos de Picadura de Escorpión por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2020 - 2024



Tasa por regiones, por 100mil Habitantes de T632 Veneno de escorpión año 2025 semana epidemiológica (SE) 01-33 año 2025

