

La tosferina es una enfermedad bacteriana aguda que afecta a las vías respiratorias, es más grave en los lactantes y en los niños de un año. Existe tres fases: La Fase Catarral, Fase Paroxística y la Fase de Convalecencia. La letalidad en los países en desarrollo puede alcanzar el 15%, siendo la más alta en los lactantes. En el año 2022 se presentó un brote con 18 casos en la provincia de Los Ríos.

En el año 2023 hasta la SE 16 se han presentado 15 casos de tosferina, la Provincia del Napo que es la más afectada con 5 casos.


En el año 2024 hasta la SE 52 se han presentado 138 casos de tosferina, siendo la Provincia de Santo Domingo la más afectada con 35 casos, el grupo de edad en que se detecta la mayor incidencia es en menores de un año.

En el año 2025 hasta la SE 35 se han presentado 2.544 casos, la provincia con el mayor número de casos es Manabí con 797 casos.

Casos confirmados por condición final, tasa de mortalidad y tasa de morbilidad de Tosferina de la SE 01-35, Ecuador 2025

PROVINCIA	Fallecidos	Vivos	Casos	Tasa de mortalidad por provincia X 100 mil Hbts	Tasa de morbilidad por provincia X 100 mil Hbts
MANABI	1	797	798	0,06	46,53
AZUAY	0	214	214	0,00	25,63
NAPO	2	32	34	1,42	24,20
CHIMBORAZO	0	107	107	0,00	21,96
ZAMORA CHINCHIPE	0	22	22	0,00	18,50
IMBABURA	1	89	90	0,20	18,07
SANTO DOMINGO	1	76	77	0,19	14,57
CAÑAR	0	25	25	0,00	14,12
PICHINCHA	7	420	427	0,21	12,96
EL ORO	2	93	95	0,27	12,62
LOJA	0	59	59	0,00	11,84
CARCHI	0	27	27	0,00	11,37
ORELLANA	1	20	21	0,51	10,71
PASTAZA	0	12	12	0,00	9,92
TUNGURAHUA	0	52	52	0,00	8,94
ESMERALDAS	0	46	46	0,00	7,60
BOLIVAR	0	15	15	0,00	7,34
GUAYAS	24	316	340	0,50	7,10
MORONA SANTIAGO	0	12	12	0,00	5,72
COTOPAXI	0	27	27	0,00	5,47
SUCUMBIOS	0	11	11	0,00	5,39
SANTA ELENA	0	14	14	0,00	3,44
GALAPAGOS	0	1	1	0,00	3,30
LOS RIOS	1	17	18	0,10	1,84
Casos / Tasas	40	2.504	2.544	0,22	14,05

Representación grafica de la tasa de Tosferina por provincia de domicilio SE 01-35, Ecuador 2025




Casos confirmados, casos fallecidos y tasa de letalidad por grupo de edad de Tosferina de la SE 01-35, Ecuador 2025

GRUPO DE EDAD	Casos	Fallecidos	Tasa de Letalidad
< Menor a un año	858	24	2,8
1 a 4 años	496	1	0,2
5 a 9 años	273	0	0,0
10 a 14 años	297	0	0,0
15 a 19 años	103	0	0,0
20 a 49 años	367	7	1,9
50 a 64 años	76	3	3,9
65 y más	74	5	6,8
Casos / Tasa	2.544	40	1,6


Dosis aplicada de vacuna contra Tosferina, Ecuador año 2025

Biológico	Total dosis aplicadas	%	Biológico	Total dosis aplicada
Penta/Hexa 1	138,307	53 %	Esquema temprano (0,1 y 5 años)	712,899
Penta/Hexa 2	143,275	55 %	Esquema tardío (1 a 6 años)	55,556
Penta/Hexa 3	142,957	55 %	Total	768,455
DPT4/PENTA/HEXA	127,341	49 %	<i>Información provisional sujeta a validación. Cobertura esperada agosto 66,67% y más Fuente: Plataforma de Registro de Atenciones en Salud. DNEAIS</i>	
DPT5/PENTA	161,019	56 %		
Total	712,899	54 %		

Casos de Tosferina por grupo de edad y sexo SE 01-35, Ecuador 2025



Curva de Tosferina por semana epidemiológica, del 2022 al 2024 (SE 01-52) y del 2025 (SE 01-35), Ecuador



Los datos o indicadores presentados se generan con información provisional que están sujetos a ajustes por registros posteriores o validaciones. Información provisional sujeta a cambios; Sin embargo, los equipos continúan intensificando las acciones de vigilancia, prevención y control, a fin de mitigar los riesgos para la salud pública.