


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS - LEPTOSPIROSIS
ECUADOR 2025 SE 01-49

La leptospirosis es una zoonosis causada por bacterias del género *Leptospira*, con más de 300 serovariedades que afectan a animales salvajes y domésticos, los cuales actúan como reservorios. Su transmisión ocurre por contacto con agua, suelo o vegetación contaminada con orina de animales infectados, especialmente en condiciones de alta humedad e inundaciones.

Clínicamente, varía desde un cuadro leve similar a la gripe hasta formas graves como el síndrome de Weil, caracterizado por insuficiencia renal, ictericia y hemorragias, o la hemorragia pulmonar severa.

En Ecuador, la leptospirosis es de notificación obligatoria debido a su impacto en salud pública. En 2024, los casos aumentaron respecto a los tres años anteriores, y en 2025 la tendencia a aumentado. La provincia de Guayas registra la mayor cantidad de casos acumulados. *Para el reporte se consideran los casos probables y confirmados


Casos de A270-A279 Leptospiriosis por Semana Epidemiológica SE 01-49. Ecuador 2025




Casos de A270-A279 Leptospiriosis por Provincia SE 01-49 Ecuador 2025

Prov.Domic	SE 01-48	SE 49	Total
GUAYAS	343	3	346
MANABI	279	1	280
MORONA SANTIAGO	119	1	120
ZAMORA CHINCHIPE	108	2	110
NAPO	98	1	99
SUCUMBIO	80		80
LOS RIOS	67		67
ESMERALDAS	49	2	51
SANTO DOMINGO	42		42
ORELLANA	37		37
LOJA	23	1	24
PICHINCHA	15		15
COTOPAXI	13	1	14
PASTAZA	10		10
CHIMBORAZO	9		9
EL ORO	7		7
BOLIVAR	6		6
SANTA ELENA	5		5
CAÑAR	5		5
AZUAY	3		3
TUNGURAHUA	2		2
Total	1,320	12	1,332

Casos de A270-A279 Leptospiriosis, por Provincia SE 01-49 Ecuador 2025



Caso de A270-A279 Leptospiriosis, por grupos de edad y sexo SE 01-49 Ecuador 2025



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación Bibliografía

- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
- El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
- Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en America Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005


SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS: BRUCELOSIS
ECUADOR 2025 SE 01-49

La brucelosis es una zoonosis causada por *Brucella abortus*, *B. melitensis* y *B. suis*, principales especies que afectan a los humanos. Puede presentarse de forma aguda o insidiosa, con fiebre irregular, sudoración profusa, artralgia, mialgia, cefalea, fatiga y pérdida de peso. Sin tratamiento adecuado, puede persistir durante meses o años.

El ganado vacuno, porcino, caprino y ovino son los principales reservorios. Su transmisión ocurre por contacto con animales infectados, ingestión de productos lácteos no pasteurizados o inhalación de partículas contaminadas.

La prevención se basa en el control de la infección en animales y la capacitación del personal expuesto. La vigilancia epidemiológica, en coordinación con Agrocalidad, es clave para su control. En Ecuador, la incidencia en humanos en 2024 fue de 0.16 por 100,000 habitantes, con la mayor concentración de casos en Imbabura. Para el año 2025, se cuenta con 51 casos; la provincia con más casos es Guayas. *Para el reporte se consideran los casos probables y confirmados


Casos de A230-A239 Brucelosis, por Semana Epidemiológica SE 01-49. Ecuador 2025



Casos de A230-A239 Brucelosis, por Provincia SE 01-49. Ecuador 2025


Prov.Domic	SE 01-48	Total
GUAYAS	22	22
PICHINCHA	7	7
SANTO DOMINGO	6	6
CHIMBORAZO	4	4
ESMERALDAS	3	3
ORELLANA	2	2
MANABI	2	2
ZAMORA CHINCHIPE	1	1
TUNGURAHUA	1	1
NAPO	1	1
MORONA SANTIAGO	1	1
COTOPAXI	1	1
Total	51	51

Casos de A230-A239 Brucelosis, por Provincia SE 01-49. Ecuador 2025



En esta tabla y en el mapa se consideran los casos probables y confirmados

Caso de A230-A239 Brucelosis, por grupos de edad y sexo SE 01-49. Ecuador 2025




Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación Bibliografía

1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos delsubsisistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en America Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS: MORDEDURA DE ANIMALES SUSCEPTIBLES A RABIA
ECUADOR 2025 SE 01-49

Aualmente, se registran alrededor de 10 millones de exposiciones humanas a la rabia y 55,000 defunciones, la mayoría en países en desarrollo, particularmente en Asia y África. La principal causa de muerte en humanos es la falta de profilaxis adecuada tras mordeduras de perros infectados. En Ecuador, el primer caso de rabia se notificó en 1941. En 1996, el país enfrentó la epidemia más grave de su historia, con 65 fallecidos y una tasa de mortalidad de 0.58 por 100,000 habitantes, una de las más altas en las Américas. El último caso de rabia en caninos se registró en 2006, y en 2011 se notificaron varios casos de rabia silvestre en humanos. Además, se han diagnosticado casos en felinos, bovinos, porcinos, equinos y ovinos, tanto en zonas rurales como urbanas marginales, así como en murciélagos, reservorios clave del virus en su ciclo silvestre. Para el 2025, la notificación de mordeduras por mamíferos susceptibles de rabia aumentó en comparación con 2024, siendo Pichincha la provincia con mayor número de reportes.


Casos de Mordedura de animales susceptibles a Rabia por Semana Epidemiológica SE 01-49. Ecuador 2025




Casos de Mordedura de animales susceptibles a Rabia por Provincia SE 01-49. Ecuador 2025

Prov.Domic	SE 01-48	SE 49	Total
PICHINCHA	3,967	86	4,053
GUAYAS	2,299	47	2,346
MANABI	1,506	29	1,535
TUNGURAHUA	1,282	30	1,312
AZUAY	939	21	960
LOS RIOS	708	23	731
COTOPAXI	644	11	655
CHIMBORAZO	569	3	572
SANTO DOMINGO	487	12	499
LOJA	460	10	470
BOLIVAR	450	12	462
MORONA SANTIAGO	374	3	377
SUCUMBIOS	371	3	374
CAÑAR	341	9	350
IMBABURA	326	7	333
ESMERALDAS	324	9	333
SANTA ELENA	291	14	305
CARCHI	294	7	301
ZAMORA CHINCHIPE	288	3	291
PASTAZA	256	10	266
NAPO	240	7	247
ORELLANA	236	9	245
EL ORO	237	7	244
CAÑAR	3	1	4
Total	16,892	373	17,265

Casos de Mordedura de animales susceptibles a Rabia por Provincia SE 01-49. Ecuador 2025



Caso de Mordedura de animales susceptibles a Rabia, por grupos de edad y sexo SE 01-49. Ecuador 2025



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE;
Datos sujetos a variación

Bibliografía

1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr. David L. Heymann, OPS 2015
3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en América Latina; Análisis de Situación, Washington D.C: OPS 2005