


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS - LEPTOSPIROSIS
ECUADOR 2026 SE 01

La leptospirosis es una zoonosis causada por bacterias del género *Leptospira*, con más de 300 serovariedades que afectan a animales salvajes y domésticos, los cuales actúan como reservorios. Su transmisión ocurre por contacto con agua, suelo o vegetación contaminada con orina de animales infectados, especialmente en condiciones de alta humedad e inundaciones.

Clínicamente, varía desde un cuadro leve similar a la gripe hasta formas graves como el síndrome de Weil, caracterizado por insuficiencia renal, ictericia y hemorragias, o la hemorragia pulmonar severa.

En Ecuador, la leptospirosis es de notificación obligatoria debido a su impacto en salud pública. En 2025, los casos aumentaron respecto a los tres años anteriores. La provincia de Guayas registra la mayor cantidad de casos acumulados. *Para el reporte se consideran los casos probables y confirmados


Casos de A270-A279 Leptospirosis por Semana Epidemiológica SE 01 2026




Casos de A270-A279 Leptospirosis por Provincia SE 01 2026

Prov.Domic	2025		2026
	SE 02-53	SE 01	SE 01
TUNGURAHUA	2		
AZUAY	3		
CAÑAR	5		
SANTA ELENA	5		
BOLIVAR	6		
CHIMBORAZO	9		
EL ORO	9		
PASTAZA	9		
COTOPAXI	14		
PICHINCHA	15		
LOJA	25		
ORELLANA	37		3
SANTO DOMINGO	45		1
ESMERALDAS	55	1	
LOS RIOS	68		1
SUCUMBIOS	80		
NAPO	99	1	
ZAMORA CHINCHIPE	111	1	
MORONA SANTIAGO	118	1	
MANABI	288		2
GUAYAS	351	3	1
Total	1354	7	8

Casos de A270-A279 Leptospirosis, por Provincia SE 01 2026



Caso de A270-A279 Leptospirosis, por grupos de edad y sexo SE 01 2026



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación
Bibliografía
1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en America Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005

SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS: BRUCELOSIS
ECUADOR 2026 SE 01


La brucelosis es una zoonosis causada por *Brucella abortus*, *B. melitensis* y *B. suis*, principales especies que afectan a los humanos. Puede presentarse de forma aguda o insidiosa, con fiebre irregular, sudoración profusa, artralgia, mialgia, cefalea, fatiga y pérdida de peso. Sin tratamiento adecuado, puede persistir durante meses o años.

El ganado vacuno, porcino, caprino y ovino son los principales reservorios. Su transmisión ocurre por contacto con animales infectados, ingestión de productos lácteos no pasteurizados o inhalación de partículas contaminadas.

La prevención se basa en el control de la infección en animales y la capacitación del personal expuesto. La vigilancia epidemiológica, en coordinación con Agrocalidad, es clave para su control. En Ecuador, la incidencia en humanos en 2024 fue de 0.16 por 100,000 habitantes, con la mayor concentración de casos en Imbabura.

Para el año 2025, una vez reclasificados los casos tenemos 46 casos; la provincia con más casos es Guayas. En la semana 1 de 2026 no se reportan casos. *Para el reporte se consideran los casos probables y confirmados

Casos de A230-A239 Brucelosis, por Semana Epidemiológica SE 01 2026



Casos de A230-A239 Brucelosis, por Provincia, SE 01-53 2025 y SE 01 2026.

Prov.Domic	2025	
	SE 02-53	SE 01
GUAYAS	22	
SANTO DOMINGO	5	
CHIMBORAZO	4	
ESMERALDAS	2	1
PICHINCHA	2	
ORELLANA	2	
MANABI	2	
ZAMORA CHINCHIPE	1	
TUNGURAHUA	1	
PASTAZA	1	
NAPO	1	
MORONA SANTIAGO	1	
COTOPAXI	1	
Total	45	1

Casos de A230-A239 Brucelosis, por Provincia SE 01 2026



Para el 2026 no se cuenta con casos en la SE 01, En esta tabla y en el mapa se consideran los casos probables y confirmados y están sujetos a variación por ajustes posteriores.

Caso de A230-A239 Brucelosis, por grupos de edad y sexo SE 01-53 2025, SE 01-2026

Grupo.edad	2025	
	Hombre	Mujer
1 a 4 años	3	
5 a 9 años	1	
10 a 14 años	2	2
15 a 19 años	1	1
20 a 49 años	12	11
50 a 64 años	3	4
65 años y mas	2	4


Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación
Bibliografía

- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
- El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
- Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en America Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS: MORDEDURA DE ANIMALES SUSCEPTIBLES A RABIA
ECUADOR 2026 SE 01

Anualmente, se registran alrededor de 10 millones de exposiciones humanas a la rabia y 55,000 defunciones, la mayoría en países en desarrollo, particularmente en Asia y África. La principal causa de muerte en humanos es la falta de profilaxis adecuada tras mordeduras de perros infectados. En Ecuador, el primer caso de rabia se notificó en 1941. En 1996, el país enfrentó la epidemia más grave de su historia, con 65 fallecidos y una tasa de mortalidad de 0.58 por 100,000 habitantes, una de las más altas en las Américas. El último caso de rabia en caninos se registró en 2006, y en 2011 se notificaron varios casos de rabia silvestre en humanos. Además, se han diagnosticado casos en felinos, bovinos, porcinos, equinos y ovinos, tanto en zonas rurales como urbanas marginales, así como en murciélagos, reservorios clave del virus en su ciclo silvestre. Para el 2025, la notificación de mordeduras por mamíferos susceptibles de rabia aumentó en comparación con 2024, siendo Pichincha la provincia con mayor número de reportes.


Casos de Mordedura de animales susceptibles a Rabia por Semana Epidemiológica SE 01, 2026




Casos de Mordedura de animales susceptibles a Rabia por Provincia SE 1-53 2025, SE 01 2026

Prov.Domic	2025		2026	Total general
	SE 02-53	SE 01	SE 01	
PICHINCHA	4472	63	85	4620
GUAYAS	2688	25	36	2749
MANABI	1729	29	34	1792
TUNGURAHUA	1486	13	29	1528
AZUAY	1075	16	23	1114
COTOPAXI	844	12	13	869
LOS RIOS	795	7	9	811
CHIMBORAZO	638	9	3	650
LOJA	556	5	10	571
SANTO DOMINGO	550	3	7	560
BOLIVAR	509	3	4	516
MORONA SANTIAG..	437	6	6	449
SUCUMBIOS	419	9	5	433
ESMERALDAS	372	5	4	381
CAÑAR	371	4	2	377
IMBABURA	371		1	372
ZAMORA CHINCHIPE	350	3	7	360
PASTAZA	355		4	359
SANTA ELENA	336	3	7	346
CARCHI	328	2	6	336
EL ORO	308	1	5	314
NAPO	277	2	5	284
ORELLANA	272		1	273
CAÑAR	4			4
GALAPAGOS	1			1
Total	19.543	220	306	20.069

Casos de Mordedura de animales susceptibles a Rabia por Provincia SE 01 2026



Caso de Mordedura de animales susceptibles a Rabia, por grupos de edad y sexo SE 01 2026



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación

Bibliografía

1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en America Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005