






SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**EFTX Intoxicación por plaguicidas**  
Semana epidemiológica (SE) 04 Ecuador 2026

La intoxicación por plaguicidas constituye un importante problema de salud pública, particularmente en países con alta actividad agrícola y uso intensivo de estas sustancias. Desde la perspectiva de la vigilancia epidemiológica, estos eventos representan condiciones prevenibles, asociadas tanto a exposiciones ocupacionales como ambientales, accidentales o intencionales. La notificación y el monitoreo sistemático de las intoxicaciones por plaguicidas permiten identificar poblaciones en riesgo, patrones de exposición, tipos de sustancias involucradas y áreas geográficas prioritarias, así como detectar brotes y fortalecer las acciones de regulación, prevención y control. En 2026, la provincia con más casos es Guayas.






SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
Efecto tóxico por Alcohol metílico  
Ecuador, semana epidemiológica (SE) 04 2026

El metanol es un compuesto químico de uso industrial y presente en diversos productos de consumo doméstico, cuya accesibilidad representa un riesgo relevante para la salud pública. Desde el enfoque de la vigilancia epidemiológica, la intoxicación por metanol constituye un evento de alta prioridad debido a su elevada letalidad, su potencial de presentación en brotes y su frecuente asociación con el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, especialmente provenientes de mercados informales o destilerías clandestinas. Históricamente, se han documentado múltiples epidemias caracterizadas por la aparición súbita de casos graves y una alta carga de mortalidad y discapacidad. A pesar de los tratamientos disponibles, la letalidad se mantiene elevada, con tasas que oscilan entre el 26 % y el 50 %, y en los sobrevivientes son comunes las secuelas neurológicas y visuales irreversibles.



La mordedura de serpiente constituye un evento de importancia en salud pública en Ecuador, particularmente en zonas rurales y amazónicas, donde la interacción entre poblaciones humanas y serpientes venenosas es más frecuente. Este evento afecta principalmente a población en edad productiva, comunidades agrícolas y pueblos indígenas, y está asociado a factores ambientales, ocupacionales y de acceso oportuno a los servicios de salud. Desde el enfoque de la vigilancia epidemiológica, la notificación y el análisis sistemático de los casos a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública permiten identificar tendencias temporales, áreas geográficas de mayor riesgo, especies involucradas y grupos poblacionales afectados. La información generada es esencial para la detección oportuna de aumentos inusuales de casos, la adecuada planificación de la disponibilidad de sueros antiofídicos, la implementación de medidas de prevención y control, y la reducción de la mortalidad y las secuelas asociadas a las mordeduras de serpientes en el país.




SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
PICADURA DE ESCORPIÓN T632  
Ecuador, semana epidemiológica (SE) 04 2026

En Ecuador, la diversidad de escorpiones es notable, con al menos 47 especies distribuidas en cinco familias y ocho géneros presentes a lo largo de las regiones Costa, Sierra, Oriente e Insular del país. Entre estas, los géneros *Tityus* (Buthidae) incluyen varias especies con potencial médico significativo debido a la toxicidad de sus venenos, mientras que otros géneros como *Centruroides* y *Teuthraustes* son frecuentes en áreas urbanas pero generalmente producen síntomas leves o locales. Los escorpiones del género *Tityus*, documentados en zonas amazónicas como Morona Santiago y Sucumbíos, han sido asociados con accidentes graves e incluso letales en otras regiones de Sudamérica, lo que resalta la importancia de su vigilancia epidemiológica en contextos rurales y periurbanos.

A pesar de la percepción tradicional de baja peligrosidad, los datos de vigilancia sugieren que las picaduras de escorpión representan un problema de salud pública subestimado, con una incidencia variable según la región, la edad y el nivel de exposición poblacional.


| Casos de Picadura de Escorpión, por provincia de domicilio Ecuador, SE 04 2026 |          |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| PROVINCIA                                                                      | SE 01-52 | SE 04 | Total |
| GUAYAS                                                                         | 10       | 4     | 14    |
| MORONA SANTIAGO                                                                | 9        | 2     | 11    |
| MANABI                                                                         | 6        | 3     | 9     |
| LOS RIOS                                                                       | 6        | 1     | 7     |
| SANTO DOMINGO                                                                  | 2        | 3     | 5     |
| PICHINCHA                                                                      | 2        | 1     | 3     |
| ORELLANA                                                                       | 3        |       | 3     |
| LOJA                                                                           | 3        |       | 3     |
| SUCUMBIOS                                                                      | 2        |       | 2     |
| PASTAZA                                                                        | 2        |       | 2     |
| SANTA ELENA                                                                    |          | 1     | 1     |
| NAPO                                                                           | 1        |       | 1     |
| IMBABURA                                                                       |          | 1     | 1     |
| EL ORO                                                                         | 1        |       | 1     |
| Total                                                                          | 47       | 16    | 63    |




Número de casos de Picadura de Escorpión según condición final y sexo Ecuador, SE 04 2026

| SEXO   | casos | Fallecidos |
|--------|-------|------------|
| Hombre | 27.00 | 0.00       |
| Mujer  | 36.00 | 0.00       |

Casos de Picadura de Escorpión, por grupos de edad y sexo Ecuador, semana epidemiológica SE 04 2026



Casos de Picadura de Escorpión por SE, Ecuador, años 2023 - 2026



Tasa por regiones, por 100mil hab. por Mordedura de Escorpión SE 04 2026

