




La hepatitis B es una infección hepática potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B (VHB). Constituye un importante problema de salud a nivel mundial. La máxima prevalencia de la hepatitis B se registra en las regiones del Pacífico Occidental y de África, en las que el 6,2% y el 6,1% de la población adulta, respectivamente, están infectados. En las regiones de la OMS del Mediterráneo Oriental, de Asia Sudoriental y de Europa se calcula que, un 3,3%, un 2,0% y un 1,6% de la población, respectivamente, padecen infección. En la región de la OMS de las Américas, el porcentaje de personas con hepatitis B es del 0,7% (1). En el Ecuador la vigilancia hasta el 2018 se realizó con modalidad grupal, con el objetivo de lograr una caracterización epidemiológica del evento para el 2019, se cambió a modalidad individual.

En el 2025 hasta la semana epidemiológica (SE) 53 se reportan en el Ecuador un total (558 casos), de Hepatitis B, la provincia con el mayor número de casos fue Esmeraldas (107 casos).

En el 2026 hasta la (SE) 14 se notificaron (122 casos) de Hepatitis B a nivel nacional. Esmeraldas concentra el mayor número de casos (29). La mayor tasa de incidencia se observa en la provincia de Pastaza, con 8,00 por 100 mil habitantes.



Tasa por región por 100mil Habitantes de B160 - B169 Hepatitis B año 2026 semana epidemiológica (SE) 01-14 año 2026



Casos de Hepatitis B, por grupos de edad y sexo Ecuador, año 2020-2026 (SE 01-14)

