


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS - LEPTOSPIROSIS
ECUADOR 2026 SE 21

La leptospirosis es una zoonosis causada por bacterias del género *Leptospira*, con más de 300 serovariedades que afectan a animales salvajes y domésticos, los cuales actúan como reservorios. Su transmisión ocurre por contacto con agua, suelo o vegetación contaminada con orina de animales infectados, especialmente en condiciones de alta humedad e inundaciones.

Clínicamente, varía desde un cuadro leve similar a la gripe hasta formas graves como el síndrome de Weil, caracterizado por insuficiencia renal, ictericia y hemorragias, o la hemorragia pulmonar severa.

En Ecuador, la leptospirosis es de notificación obligatoria debido a su impacto en salud pública. En 2025, los casos aumentaron respecto a los tres años anteriores. La provincia de Guayas registra la mayor cantidad de casos acumulados. *Para el reporte se consideran los casos probables y confirmados


Casos de A270-A279 Leptospiriosis por Semana Epidemiológica SE 21 2026




Casos de A270-A279 Leptospiriosis por Provincia SE 21 2026

Prov.Domic	SE 01-20	SE 21	Total
MANABI	86	5	91
ORELLANA	60		60
GUAYAS	53	3	56
ESMERALDAS	34	1	35
LOJA	24	1	25
ZAMORA CHINCHIPE	22	2	24
NAPO	21		21
LOS RIOS	17	1	18
SANTO DOMINGO	16	1	17
SUCUMBIO	14	1	15
MORONA SANTIAGO	13		13
PICHINCHA	12		12
SANTA ELENA	5		5
EL ORO	5		5
PASTAZA	4		4
COTOPAXI	4		4
CHIMBORAZO	4		4
AZUAY	3		3
TUNGURAHUA	2		2
BOLIVAR	2		2
IMBABURA	1		1
CAÑAR	1		1
Total	403	15	418

Incidencia de A270-A279 Leptospiriosis, por Provincia SE 21 2026



Casos de A270-A279 Leptospiriosis, por grupos de edad y sexo SE 21 2026



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación

Bibliografía

- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
- El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr. David L. Heymann, OPS 2015
- Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en América Latina; Análisis de Situación, Washington D.C: OPS 2005

SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS: BRUCELOSIS
ECUADOR 2026 SE 21


La brucelosis es una zoonosis causada por *Brucella abortus*, *B. melitensis* y *B. suis*, principales especies que afectan a los humanos. Puede presentarse de forma aguda o insidiosa, con fiebre irregular, sudoración profusa, artralgia, mialgia, cefalea, fatiga y pérdida de peso. Sin tratamiento adecuado, puede persistir durante meses o años.

El ganado vacuno, porcino, caprino y ovino son los principales reservorios. Su transmisión ocurre por contacto con animales infectados, ingestión de productos lácteos no pasteurizados o inhalación de partículas contaminadas.

La prevención se basa en el control de la infección en animales y la capacitación del personal expuesto. La vigilancia epidemiológica, en coordinación con Agrocalidad, es clave para su control. En Ecuador, la incidencia en humanos en 2024 fue de 0.16 por 100,000 habitantes, con la mayor concentración de casos en Imbabura.

Para el año 2025, una vez reclasificados los casos tenemos 46 casos; la provincia con más casos es Guayas. Hasta la semana 21 de 2026 se reportan 4 casos. *Para este reporte se consideran los casos probables y confirmados


Casos de A230-A239 Brucelosis, por Semana Epidemiológica SE 21 2026



Casos de A230-A239 Brucelosis, por Provincia, SE 21 2026

Prov.Domic	SE 01-20	Total
PICHINCHA	2	2
SUCUMBIOS	1	1
ESMERALDAS	1	1
Total	4	4

Incidencia de A230-A239 Brucelosis, por Provincia SE 21 2026



En esta tabla y en el mapa se consideran los casos probables y confirmados y están sujetos a variación por ajustes posteriores.

Caso de A230-A239 Brucelosis, por grupos de edad y sexo, SE 21-2026

Grupo.edad	2026	Sexo
10 a 14 años	1	Hombre
15 a 19 años	1	Mujer
20 a 49 años	1	Mujer


Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación
Bibliografía

1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en América Latina; Análisis de Situación, Washington D.C: OPS 2005

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZONOTICAS: MORDEDURA DE ANIMALES SUSCEPTIBLES A RABIA
ECUADOR 2026 SE 21

Anualmente, se registran alrededor de 10 millones de exposiciones humanas a la rabia y 55,000 defunciones, la mayoría en países en desarrollo, particularmente en Asia y África. La principal causa de muerte en humanos es la falta de profilaxis adecuada tras mordeduras de perros infectados. En Ecuador, el primer caso de rabia se notificó en 1941. En 1996, el país enfrentó la epidemia más grave de su historia, con 65 fallecidos y una tasa de mortalidad de 0.58 por 100,000 habitantes, una de las más altas en las Américas. El último caso de rabia en caninos se registró en 2006, y en 2011 se notificaron varios casos de rabia silvestre en humanos. Además, se han diagnosticado casos en felinos, bovinos, porcinos, equinos y ovinos, tanto en zonas rurales como urbanas marginales, así como en murciélagos, reservorios clave del virus en su ciclo silvestre. Para el 2026, la notificación de mordeduras por mamíferos susceptibles de rabia aumentó en comparación con 2025, siendo Pichincha la provincia con mayor número de reportes.


Casos de Mordedura de animales susceptibles a Rabia por Semana Epidemiológica SE 21, 2026




Casos de Mordedura de animales susceptibles a Rabia por Provincia, SE 21 2026

Prov.Domic	SE 01-20	SE 21	Total
PICHINCHA	2085	68	2153
GUAYAS	1064	40	1104
MANABI	728	34	762
TUNGURAHUA	641	39	680
AZUAY	479	14	493
LOS RIOS	365	25	390
COTOPAXI	357	19	376
CHIMBORAZO	330	13	343
SANTO DOMINGO	271	15	286
LOJA	245	10	255
EL ORO	203	5	208
MORONA SANTIAGO	187	5	192
ESMERALDAS	183	6	189
BOLIVAR	179	7	186
SUCUMBIOS	160	8	168
SANTA ELENA	163	5	168
PASTAZA	138	10	148
ORELLANA	141	7	148
ZAMORA CHINCHIPE	135	10	145
CARCHI	138	6	144
CAÑAR	135	6	141
NAPO	124	4	128
IMBABURA	125	3	128
CAÑAR	3		3
Total	8579	359	8938

Casos de Mordedura de animales susceptibles a rabia por provincia SE 21 2026



Caso de Mordedura de animales susceptibles a Rabia, por grupos de edad y sexo SE 21 2026



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE;
Datos sujetos a variación

Bibliografía

- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
- El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr. David L. Heymann, OPS 2015
- Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en América Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005