


La **hepatitis B** es una infección hepática causada por el virus de la hepatitis B (VHB) y constituye un problema de salud pública a nivel mundial. La mayor prevalencia se registra en las regiones del Pacífico Occidental y África, con 6,2% y 6,1% de la población adulta infectada, respectivamente. En las regiones del Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Europa, la prevalencia estimada es de 3,3%, 2,0% y 1,6%. En la Región de las Américas, la prevalencia es de 0,7% (1).

En Ecuador, la vigilancia epidemiológica de hepatitis B se realiza bajo modalidad grupal hasta 2018. A partir de 2019, se implementó la vigilancia individual para el seguimiento y análisis de casos.

En 2025, hasta la semana epidemiológica (SE) 53, se notificaron 558 casos a nivel nacional. Esmeraldas registró el mayor número de casos (107). En 2026, hasta la SE 23, se notificaron 174 casos; Esmeraldas mantiene el mayor número de casos (38). La mayor tasa de incidencia se registra en Pastaza, con 13.7 casos por 100.000 habitantes.



Caso de Hepatitis B, por grupos de edad y sexo Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026

GRUPO DE EDAD	HOMBRE	MUJER
De 10 a 14 años	1	0
De 15 a 19 años	3	0
De 20 a 49 años	41	58
De 50 a 64 años	23	12
DE 65 y más	21	14

Tasa por región por 100mil Habitantes de B160 - B169 Hepatitis B año 2026 semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026

Casos de Hepatitis B, por grupos de edad y sexo Ecuador, año 2020-2026 (SE 01-23)