

La hepatitis C es una infección viral que afecta al hígado y constituye un problema de salud pública. Puede presentarse en fase aguda o evolucionar a infección crónica.


La transmisión ocurre por exposición a sangre infectada, principalmente por el uso compartido de agujas y jeringas, así como por procedimientos médicos inseguros, incluidas transfusiones no tamizadas. Puede cursar de forma asintomática o con manifestaciones clínicas como fiebre, astenia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, coluria e ictericia. Actualmente, no se dispone de vacuna; sin embargo, cuenta con tratamiento antiviral eficaz. La detección y el tratamiento oportunos reducen la progresión a enfermedad hepática crónica.

En 2025, hasta la semana epidemiológica (SE) 53, se notificaron 137 casos confirmados a nivel nacional; Guayas registró el mayor número de casos (45). En 2026, hasta la SE 24, se notificaron 47 casos; Guayas mantiene el mayor número de casos (26). La mayor tasa de incidencia se registra en Guayas, con 0,56 casos por 100 000 habitantes.


Casos y tasas de B171 Hepatitis C por provincia semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos Total	Tasa provincia por 100milH. Total
	SE 01-23	SE 24	SE 01-23	SE 24		
GUAYAS	25	1	0,54	0,02	26	0,56
MANABI	8		0,48		8	0,48
PICHINCHA	7		0,23		7	0,23
LOS RIOS	2		0,20		2	0,20
ESMERALDAS	2		0,32		2	0,32
AZUAY	1		0,12		1	0,12
CAÑAR	1		0,35		1	0,35
Total	46	1	0,38	0,02	47	0,39


Tasas por 100mil H. de B171 Hepatitis C, por provincia. Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026



Caso de B171 Hepatitis C, por grupos de edad y sexo Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026



Tasa por región por 100mil Habitantes de B171 Hepatitis C año 2026 semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026



Casos de B171 Hepatitis C, por grupos de edad y sexo Ecuador, año 2020-2026 (SE 01-24)

