






SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
EFTX Intoxicación por plaguicidas
Semana epidemiológica (SE) 29 Ecuador 2026




La intoxicación por plaguicidas constituye un importante problema de salud pública, particularmente en países con alta actividad agrícola y uso intensivo de estas sustancias. Desde la perspectiva de la vigilancia epidemiológica, estos eventos representan condiciones prevenibles, asociadas tanto a exposiciones ocupacionales como ambientales, accidentales o intencionales. La notificación y el monitoreo sistemático de las intoxicaciones por plaguicidas permiten identificar poblaciones en riesgo, patrones de exposición, tipos de sustancias involucradas y áreas geográficas prioritarias, así como detectar brotes y fortalecer las acciones de regulación, prevención y control.

En 2026, la provincia con más casos es Guayas.

Casos y tasas de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio, Ecuador, SE 01-29 2026						
PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos Total	Tasa pr ovincia por 10.. Total
	SE 01-28	SE 29	SE 01-28	SE 29		
MORONA SAN..	22	1	10,5	0,5	23	11,0
BOLIVAR	13		6,4		13	6,4
SUCUMBIO	12		5,9		12	5,9
ORELLANA	8		4,1		8	4,1
LOJA	17		3,3		17	3,3
LOS RIOS	25		2,6		25	2,6
ZAMORA CHIN..	3		2,5		3	2,5
NAPO	2	1	1,4	0,7	3	2,1
COTOPAXI	10		2,0		10	2,0
TUNGURAHUA	7	1	1,2	0,2	8	1,4
CHIMBORAZO	6		1,2		6	1,2
MANABI	18	1	1,0	0,1	19	1,1
CARCHI	2		0,9		2	0,9
ESMERALDAS	5		0,8		5	0,8
GUAYAS	28	1	0,6	0,0	29	0,6
SANTA ELENA	2		0,5		2	0,5
IMBABURA	2		0,4		2	0,4
EL ORO	3		0,4		3	0,4
SANTO DOMIN..	2		0,4		2	0,4
AZUAY	2		0,2		2	0,2
PICHINCHA	4		0,1		4	0,1
Total	193	5	1,1	0,1	198	1,1



La mordedura de serpiente constituye un evento de importancia en salud pública en Ecuador, particularmente en zonas rurales y amazónicas, donde la interacción entre poblaciones humanas y serpientes venenosas es más frecuente. Este evento afecta principalmente a población en edad productiva, comunidades agrícolas y pueblos indígenas, y está asociado a factores ambientales, ocupacionales y de acceso oportuno a los servicios de salud. Desde el enfoque de la vigilancia epidemiológica, la notificación y el análisis sistemático de los casos a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública permiten identificar tendencias temporales, áreas geográficas de mayor riesgo, especies involucradas y grupos poblacionales afectados. La información generada es esencial para la detección oportuna de aumentos inusuales de casos, la adecuada planificación de la disponibilidad de sueros antiofídicos, la implementación de medidas de prevención y control, y la reducción de la mortalidad y las secuelas asociadas a las mordeduras de serpientes en el país.




SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
PICADURA DE ESCORPIÓN T632
Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01- 29 / 2026

En Ecuador, la diversidad de escorpiones es notable, con al menos 47 especies distribuidas en cinco familias y ocho géneros presentes a lo largo de las regiones Costa, Sierra, Oriente e Insular del país. Entre estas, los géneros *Tityus* (Buthidae) incluyen varias especies con potencial médico significativo debido a la toxicidad de sus venenos, mientras que otros géneros como *Centruroides* y *Teuthraustes* son frecuentes en áreas urbanas pero generalmente producen síntomas leves o locales. Los escorpiones del género *Tityus*, documentados en zonas amazónicas como Morona Santiago y Sucumbios, han sido asociados con accidentes graves e incluso letales en otras regiones de Sudamérica, lo que resalta la importancia de su vigilancia epidemiológica en contextos rurales y periurbanos. A pesar de la percepción tradicional de baja peligrosidad, los datos de vigilancia sugieren que las picaduras de escorpión representan un problema de salud pública subestimado, con una incidencia variable según la región, la edad y el nivel de exposición poblacional.

Casos de Picadura de Escorpión, por provincia de domicilio Ecuador, SE 01-29 / 2026

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos	Tasa p rovinci..
	SE 29	SE 01-28	SE 29	SE 01-28	Total	Total
MORONA SANTIAGO	2	107	1,0	51,0	109	51,9
ORELLANA		40		20,4	40	20,4
SUCUMBIOS		30		14,7	30	14,7
PASTAZA		9		7,4	9	7,4
NAPO		7		5,0	7	5,0
SANTO DOMINGO	1	17	0,2	3,2	18	3,4
MANABI		53		3,1	53	3,1
LOJA		11		2,2	11	2,2
ESMERALDAS		13		2,1	13	2,1
LOS RIOS		21		2,1	21	2,1
GUAYAS	3	85	0,1	1,8	88	1,9
ZAMORA CHINCHIPE		2		1,7	2	1,7
SANTA ELENA		5		1,2	5	1,2
PICHINCHA		33		1,0	33	1,0
BOLIVAR		2		1,0	2	1,0
IMBABURA		4		0,8	4	0,8
EL ORO		6		0,8	6	0,8
CHIMBORAZO		2		0,4	2	0,4
AZUAY		2		0,2	2	0,2
COTOPAXI		1		0,2	1	0,2
Total	6	450	0,1	2,6	456	2,7


Tasa por 100mil hab., de Picadura de Escorpión, Ecuador, SE 01-29 / 2026




Número de casos de Picadura de Escorpión según condición final y sexo Ecuador, SE 01-29 2026

SEXO	Casos	Fallecidos
HOMBRE	224,0	0,0
MUJER	227,0	0,0

Casos de Picadura de Escorpión, por grupos de edad y sexo Ecuador, semana epidemiológica SE 01-29 / 2026



Casos de Picadura de Escorpión por SE, Ecuador, años 2023 - 2026



Tasa por regiones, por 100mil hab. por Picadura de Escorpión SE 01-29 2026

