


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS - LEPTOSPIROSIS
ECUADOR 2026 SE 25

La leptospirosis es una zoonosis causada por bacterias del género *Leptospira*, con más de 300 serovariedades que afectan a animales salvajes y domésticos, los cuales actúan como reservorios. Su transmisión ocurre por contacto con agua, suelo o vegetación contaminada con orina de animales infectados, especialmente en condiciones de alta humedad e inundaciones.

Clínicamente, varía desde un cuadro leve similar a la gripe hasta formas graves como el síndrome de Weil, caracterizado por insuficiencia renal, ictericia y hemorragias, o la hemorragia pulmonar severa.

En Ecuador, la leptospirosis es de notificación obligatoria debido a su impacto en salud pública. En 2025, los casos aumentaron respecto a los tres años anteriores. La provincia de Guayas registra la mayor cantidad de casos acumulados. *Para el reporte se consideran los casos probables y confirmados


Casos de A270-A279 Leptospiriosis por Semana Epidemiológica SE 25 2026




Casos de A270-A279 Leptospiriosis por Provincia SE 25 2026

Prov.Domic	SE 01-24	SE 25	Total
MANABI	109	3	112
ORELLANA	68		68
GUAYAS	60	3	63
ESMERALDAS	40		40
LOJA	27	1	28
ZAMORA CHINCHIPE	24	1	25
NAPO	22		22
SANTO DOMINGO	20	1	21
LOS RIOS	19	2	21
SUCUMBIO	15		15
PICHINCHA	14		14
MORONA SANTIAGO	13		13
PASTAZA	6	1	7
SANTA ELENA	6		6
COTOPAXI	6		6
CHIMBORAZO	5	1	6
EL ORO	5		5
TUNGURAHUA	3		3
AZUAY	3		3
IMBABURA	1	1	2
BOLIVAR	2		2
CAÑAR	1		1
Total	469	14	483

Incidencia de A270-A279 Leptospiriosis, por Provincia SE 25 2026



Casos de A270-A279 Leptospiriosis, por grupos de edad y sexo SE 25 2026



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación

Bibliografía

1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en America Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005

SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS: BRUCELOSIS
ECUADOR 2026 SE 25


La brucelosis es una zoonosis causada por *Brucella abortus*, *B. melitensis* y *B. suis*, principales especies que afectan a los humanos. Puede presentarse de forma aguda o insidiosa, con fiebre irregular, sudoración profusa, artralgia, mialgia, cefalea, fatiga y pérdida de peso. Sin tratamiento adecuado, puede persistir durante meses o años.

El ganado vacuno, porcino, caprino y ovino son los principales reservorios. Su transmisión ocurre por contacto con animales infectados, ingestión de productos lácteos no pasteurizados o inhalación de partículas contaminadas.

La prevención se basa en el control de la infección en animales y la capacitación del personal expuesto. La vigilancia epidemiológica, en coordinación con Agrocalidad, es clave para su control. En Ecuador, la incidencia en humanos en 2024 fue de 0.16 por 100,000 habitantes, con la mayor concentración de casos en Imbabura.

Para el año 2025, una vez reclasificados los casos tenemos 46 casos; la provincia con más casos es Guayas. Hasta la semana 25 de 2026 se reportan 4 casos. *Para este reporte se consideran los casos probables y confirmados


Casos de A230-A239 Brucelosis, por Semana Epidemiológica SE 25 2026



Casos de A230-A239 Brucelosis, por Provincia, SE 25 2026

Prov.Domic	SE 01-24	Total
ESMERALDAS	2	2
SUCUMBIOS	1	1
PICHINCHA	1	1
Total	4	4

Incidencia de A230-A239 Brucelosis, por Provincia SE 25 2026



En esta tabla y en el mapa se consideran los casos probables y confirmados y están sujetos a variación por ajustes posteriores.

Caso de A230-A239 Brucelosis, por grupos de edad y sexo, SE 25-2026

Grupo.edad	2026	Sexo
10 a 14 años	1	Hombre
20 a 49 años	1	Mujer


Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación
Bibliografía

1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en América Latina; Análisis de Situación, Washington D.C: OPS 2005

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZONOTICAS: MORDEDURA DE ANIMALES SUSCEPTIBLES A RABIA
ECUADOR 2026 SE 25

Anualmente, se registran alrededor de 10 millones de exposiciones humanas a la rabia y 55,000 defunciones, la mayoría en países en desarrollo, particularmente en Asia y África. La principal causa de muerte en humanos es la falta de profilaxis adecuada tras mordeduras de perros infectados. En Ecuador, el primer caso de rabia se notificó en 1941. En 1996, el país enfrentó la epidemia más grave de su historia, con 65 fallecidos y una tasa de mortalidad de 0.58 por 100,000 habitantes, una de las más altas en las Américas. El último caso de rabia en caninos se registró en 2006, y en 2011 se notificaron varios casos de rabia silvestre en humanos. Además, se han diagnosticado casos en felinos, bovinos, porcinos, equinos y ovinos, tanto en zonas rurales como urbanas marginales, así como en murciélagos, reservorios clave del virus en su ciclo silvestre. Para el 2026, la notificación de mordeduras por mamíferos susceptibles de rabia aumentó en comparación con 2025, siendo Pichincha la provincia con mayor número de reportes.


Casos de Mordedura de animales susceptibles a Rabia por Semana Epidemiológica SE 25, 2026




Casos de Mordedura de animales susceptibles a Rabia por Provincia, SE 25 2026

Prov.Domic	SE 01-24	SE 25	Total
PICHINCHA	2410	85	2495
GUAYAS	1244	35	1279
MANABI	873	34	907
TUNGURAHUA	772	43	815
AZUAY	546	5	551
COTOPAXI	421	14	435
LOS RIOS	421	6	427
CHIMBORAZO	398	22	420
SANTO DOMINGO	322	9	331
LOJA	286	9	295
EL ORO	245	7	252
ESMERALDAS	215	7	222
MORONA SANTIAGO	211	10	221
BOLIVAR	213	7	220
SUCUMBIOS	194	9	203
SANTA ELENA	188	7	195
CAÑAR	171	11	182
ORELLANA	168	5	173
PASTAZA	165	7	172
ZAMORA CHINCHIPE	167	3	170
CARCHI	163	6	169
IMBABURA	147		147
NAPO	137	5	142
Total	10.077	346	10.423

Casos de Mordedura de animales susceptibles a rabia por provincia SE 25 2026



Caso de Mordedura de animales susceptibles a Rabia, por grupos de edad y sexo SE 25 2026



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE;
Datos sujetos a variación

Bibliografía

1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr. David L. Heymann, OPS 2015
3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en América Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005