


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZONOTICAS - LEPTOSPIROSIS
ECUADOR 2026 SE 26

La leptospirosis es una zoonosis causada por bacterias del género *Leptospira*, con más de 300 serovariedades que afectan a animales salvajes y domésticos, los cuales actúan como reservorios. Su transmisión ocurre por contacto con agua, suelo o vegetación contaminada con orina de animales infectados, especialmente en condiciones de alta humedad e inundaciones.

Clínicamente, varía desde un cuadro leve similar a la gripe hasta formas graves como el síndrome de Weil, caracterizado por insuficiencia renal, ictericia y hemorragias, o la hemorragia pulmonar severa.

En Ecuador, la leptospirosis es de notificación obligatoria debido a su impacto en salud pública. En 2025, los casos aumentaron respecto a los tres años anteriores. La provincia de Guayas registra la mayor cantidad de casos acumulados. *Para el reporte se consideran los casos probables y confirmados


Casos de A270-A279 Leptospiriosis por Semana Epidemiológica SE 26 2026




Casos de A270-A279 Leptospiriosis por Provincia SE 26 2026

Prov.Domic	SE 01-25	SE 26	Total
MANABI	113	3	116
ORELLANA	68		68
GUAYAS	62	2	64
ESMERALDAS	40	1	41
LOJA	29	1	30
ZAMORA CHINCHIPE	25	1	26
SANTO DOMINGO	22	1	23
NAPO	22		22
LOS RIOS	21	1	22
SUCUMBIO	15		15
PICHINCHA	15		15
MORONA SANTIAGO	13		13
PASTAZA	7		7
SANTA ELENA	6		6
COTOPAXI	6		6
CHIMBORAZO	6		6
EL ORO	5		5
TUNGURAHUA	4		4
AZUAY	3		3
IMBABURA	2		2
BOLIVAR	2		2
CAÑAR	1		1
Total	487	10	497

Incidencia de A270-A279 Leptospiriosis, por Provincia SE 26 2026



Casos de A270-A279 Leptospiriosis, por grupos de edad y sexo SE 26 2026



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación
Bibliografía
1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr. David L. Heymann, OPS 2015
3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en América Latina; Análisis de Situación, Washington D.C.: OPS 2005

SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOOTICAS: BRUCELOSIS
ECUADOR 2026 SE 26


La brucelosis es una zoonosis causada por *Brucella abortus*, *B. melitensis* y *B. suis*, principales especies que afectan a los humanos. Puede presentarse de forma aguda o insidiosa, con fiebre irregular, sudoración profusa, artralgia, mialgia, cefalea, fatiga y pérdida de peso. Sin tratamiento adecuado, puede persistir durante meses o años.

El ganado vacuno, porcino, caprino y ovino son los principales reservorios. Su transmisión ocurre por contacto con animales infectados, ingestión de productos lácteos no pasteurizados o inhalación de partículas contaminadas.

La prevención se basa en el control de la infección en animales y la capacitación del personal expuesto. La vigilancia epidemiológica, en coordinación con Agrocalidad, es clave para su control. En Ecuador, la incidencia en humanos en 2024 fue de 0.16 por 100,000 habitantes, con la mayor concentración de casos en Imbabura.

Para el año 2025, una vez reclasificados los casos tenemos 46 casos; la provincia con más casos es Guayas. Hasta la semana 25 de 2026 se reportan 4 casos. *Para este reporte se consideran los casos probables y confirmados


Casos de A230-A239 Brucelosis, por Semana Epidemiológica SE 26 2026



Casos de A230-A239 Brucelosis, por Provincia, SE 26 2026

Prov.Domic	SE 01-25	SE 26	Total
ESMERALDAS	2	1	3
SUCUMBIOS	1	0	1
PICHINCHA	1	0	1
Total	4	1	5

Incidencia de A230-A239 Brucelosis, por Provincia SE 26 2026



En esta tabla y en el mapa se consideran los casos probables y confirmados y están sujetos a variación por ajustes posteriores.

Caso de A230-A239 Brucelosis , por grupos de edad y sexo, SE 26-2026


Grupo.edad	2026	Sexo
10 a 14 años	1 (Hombre) 1 (Mujer)	Hombre Mujer
20 a 49 años	2 (Hombre) 1 (Mujer)	Hombre Mujer

Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación
 Bibliografía
 1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
 2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
 3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en America Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS: MORDEDURA DE ANIMALES SUSCEPTIBLES A RABIA
ECUADOR 2026 SE 26

Anualmente, se registran alrededor de 10 millones de exposiciones humanas a la rabia y 55,000 defunciones, la mayoría en países en desarrollo, particularmente en Asia y África. La principal causa de muerte en humanos es la falta de profilaxis adecuada tras mordeduras de perros infectados. En Ecuador, el primer caso de rabia se notificó en 1941. En 1996, el país enfrentó la epidemia más grave de su historia, con 65 fallecidos y una tasa de mortalidad de 0.58 por 100,000 habitantes, una de las más altas en las Américas. El último caso de rabia en caninos se registró en 2006, y en 2011 se notificaron varios casos de rabia silvestre en humanos. Además, se han diagnosticado casos en felinos, bovinos, porcinos, equinos y ovinos, tanto en zonas rurales como urbanas marginales, así como en murciélagos, reservorios clave del virus en su ciclo silvestre. Para el 2026, la notificación de mordeduras por mamíferos susceptibles de rabia aumentó en comparación con 2025, siendo Pichincha la provincia con mayor número de reportes.


Casos de Mordedura de animales susceptibles a Rabia por Semana Epidemiológica SE 26, 2026




Casos de Mordedura de animales susceptibles a Rabia por Provincia, SE 26 2026

Prov.Domic	SE 01-25	SE 26	Total
PICHINCHA	2495	84	2579
GUAYAS	1279	52	1331
MANABI	907	56	963
TUNGURAHUA	815	39	854
AZUAY	551	21	572
COTOPAXI	435	14	449
LOS RIOS	427	18	445
CHIMBORAZO	420	18	438
SANTO DOMINGO	331	14	345
LOJA	295	5	300
EL ORO	252	9	261
MORONA SANTIAGO	221	10	231
BOLIVAR	220	6	226
ESMERALDAS	222	3	225
SUCUMBIO	203	9	212
SANTA ELENA	195	6	201
CAÑAR	179	11	190
PASTAZA	172	7	179
ZAMORA CHINCHIPE	170	6	176
ORELLANA	173	3	176
CARCHI	169	6	175
IMBABURA	147	8	155
NAPO	142	8	150
CAÑAR	3	1	4
Total	10.423	414	10.837

Casos de Mordedura de animales susceptibles a rabia por provincia SE 26 2026



Caso de Mordedura de animales susceptibles a Rabia, por grupos de edad y sexo SE 26 2026



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación

Bibliografía

- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del sistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
- El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
- Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en América Latina: Análisis de Situación, Washington D.C.: OPS 2005