


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS - LEPTOSPIROSIS
ECUADOR 2026 SE 27

La leptospirosis es una zoonosis causada por bacterias del género *Leptospira*, con más de 300 serovariedades que afectan a animales salvajes y domésticos, los cuales actúan como reservorios. Su transmisión ocurre por contacto con agua, suelo o vegetación contaminada con orina de animales infectados, especialmente en condiciones de alta humedad e inundaciones.

Clínicamente, varía desde un cuadro leve similar a la gripe hasta formas graves como el síndrome de Weil, caracterizado por insuficiencia renal, ictericia y hemorragias, o la hemorragia pulmonar severa.

En Ecuador, la leptospirosis es de notificación obligatoria debido a su impacto en salud pública. En 2025, los casos aumentaron respecto a los tres años anteriores. La provincia de Guayas registra la mayor cantidad de casos acumulados. *Para el reporte se consideran los casos probables y confirmados


Casos de A270-A279 Leptospiriosis por Semana Epidemiológica SE 27 2026




Casos de A270-A279 Leptospiriosis por Provincia SE 27 2026

Prov.Domic	SE 01-26	SE 27	Total
GUAYAS	66	5	71
ORELLANA	68		68
ESMERALDAS	41	3	44
LOJA	30	1	31
ZAMORA CHINCHIPE	26		26
SANTO DOMINGO	23		23
NAPO	22		22
LOS RIOS	22		22
SUCUMBIO	16	2	18
PICHINCHA	16	1	17
MORONA SANTIAGO	13	1	14
PASTAZA	7		7
MANABI		7	7
SANTA ELENA	6		6
COTOPAXI	6		6
CHIMBORAZO	6		6
EL ORO	5		5
TUNGURAHUA	4		4
AZUAY	3	1	4
IMBABURA	2		2
CAÑAR	1	1	2
BOLIVAR	2		2
Total	385	22	407

Incidencia de A270-A279 Leptospiriosis, por Provincia SE 27 2026



Casos de A270-A279 Leptospiriosis, por grupos de edad y sexo SE 27 2026



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación
Bibliografía
1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr. David L. Heymann, OPS 2015
3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en América Latina; Análisis de Situación, Washington D.C.: OPS 2005

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZONOTICAS: BRUCELOSIS
ECUADOR 2026 SE 27


La brucelosis es una zoonosis causada por *Brucella abortus*, *B. melitensis* y *B. suis*, principales especies que afectan a los humanos. Puede presentarse de forma aguda o insidiosa, con fiebre irregular, sudoración profusa, artralgia, mialgia, cefalea, fatiga y pérdida de peso. Sin tratamiento adecuado, puede persistir durante meses o años.

El ganado vacuno, porcino, caprino y ovino son los principales reservorios. Su transmisión ocurre por contacto con animales infectados, ingestión de productos lácteos no pasteurizados o inhalación de partículas contaminadas.


La prevención se basa en el control de la infección en animales y la capacitación del personal expuesto. La vigilancia epidemiológica, en coordinación con Agrocalidad, es clave para su control. En Ecuador, la incidencia en humanos en 2024 fue de 0.16 por 100,000 habitantes, con la mayor concentración de casos en Imbabura.

Para el año 2025, una vez reclasificados los casos tenemos 46 casos; la provincia con más casos es Guayas.


Hasta la semana 27 de 2026 se reportan 6 casos. *Para este reporte se consideran los casos probables y confirmados.



Casos de A230-A239 Brucelosis, por Provincia, SE 27 2026		
Prov.Domic	SE 01-26	Total
ESMERALDAS	3	3
TUNGURAHUA	1	1
SUCUMBIOS	1	1
PICHINCHA	1	1
Total	6	6



En esta tabla y en el mapa se consideran los casos probables y confirmados y están sujetos a variación por ajustes posteriores.




Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación
 Bibliografía
 1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
 2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
 3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en America Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS: MORDEDURA DE ANIMALES SUSCEPTIBLES A RABIA
ECUADOR 2026 SE 27

Anualmente, se registran alrededor de 10 millones de exposiciones humanas a la rabia y 55,000 defunciones, la mayoría en países en desarrollo, particularmente en Asia y África. La principal causa de muerte en humanos es la falta de profilaxis adecuada tras mordeduras de perros infectados. En Ecuador, el primer caso de rabia se notificó en 1941. En 1996, el país enfrentó la epidemia más grave de su historia, con 65 fallecidos y una tasa de mortalidad de 0.58 por 100,000 habitantes, una de las más altas en las Américas. El último caso de rabia en caninos se registró en 2006, y en 2011 se notificaron varios casos de rabia silvestre en humanos. Además, se han diagnosticado casos en felinos, bovinos, porcinos, equinos y ovinos, tanto en zonas rurales como urbanas marginales, así como en murciélagos, reservorios clave del virus en su ciclo silvestre. Para el 2026, la notificación de mordeduras por mamíferos susceptibles de rabia aumentó en comparación con 2025, siendo Pichincha la provincia con mayor número de reportes.


Casos de Mordedura de animales susceptibles a Rabia por Semana Epidemiológica SE 27, 2026




Casos de Mordedura de animales susceptibles a Rabia por Provincia, SE 27 2026

Prov.Domic	SE 01-26	SE 27	Total
PICHINCHA	2579	103	2682
GUAYAS	1331	59	1390
MANABI	964	27	991
TUNGURAHUA	854	25	879
AZUAY	572	15	587
LOS RIOS	445	13	458
COTOPAXI	449	8	457
CHIMBORAZO	438	16	454
SANTO DOMINGO	346	8	354
LOJA	300	7	307
EL ORO	261	8	269
ESMERALDAS	225	14	239
MORONA SANTIAGO	231	5	236
BOLIVAR	226	10	236
SUCUMBIOS	212	11	223
SANTA ELENA	201	13	214
CAÑAR	194	7	201
ZAMORA CHINCHIPE	176	13	189
PASTAZA	179	7	186
ORELLANA	176	6	182
CARCHI	175	5	180
IMBABURA	155	17	172
NAPO	150	1	151
Total	10.839	398	11.237

Casos de Mordedura de animales susceptibles a rabia por provincia SE 27 2026



Caso de Mordedura de animales susceptibles a Rabia, por grupos de edad y sexo SE 27 2026



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación

Bibliografía

- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos delsubsisntema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
- El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
- Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en America Latina: Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005