




La inmunización es uno de los logros más importantes de la salud pública, al haber permitido la reducción sustancial de enfermedades infecciosas prevenibles. A nivel global, los programas de vacunación han contribuido significativamente a disminuir la morbilidad y la mortalidad infantil. En Ecuador, estos esfuerzos han resultado en una reducción superior al 90% en la incidencia de Enfermedades Prevenibles por Vacunación (EPV) y hasta un 50% en la mortalidad infantil.

En 2010, el 85% de los lactantes a nivel mundial - aproximadamente 116 millones - recibieron las tres dosis de la vacuna DTP3, protegiéndolos contra enfermedades como difteria, tétanos y tosferina. Para 2020, la cobertura global contra poliomielitis alcanzó el 83%, mientras que en las Américas se reportó una cobertura del 89% con IPV1 y del 82% con esquema completo antipoliomielítico.

Enfermedades Prevenibles por Vacunación por año 2021-2025, (SE 01-27) 2026, Ecuador.

|                                     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| B010-B019 Varicela                  | 2883 | 3703 | 6179 | 5438 | 7000 | 4135 |
| A370-A379 Tosferina                 |      | 57   | 180  | 141  | 2798 | 82   |
| B260-B269 Parotiditis infecciosa    | 141  | 132  | 192  | 246  | 242  | 128  |
| A35X Tétanos                        | 5    | 9    | 4    | 11   | 10   | 4    |
| A390 (G01) Meningitis Meningocócica | 1    | 3    | 3    | 1    | 4    |      |
| A363 Difteria Cutánea               |      |      |      | 1    |      |      |
| A33X Tétanos neonatal               |      | 1    |      |      |      |      |

Distribución geográfica de tasas de EPV por provincia, (SE 01-27) 2026, Ecuador.



Los datos o indicadores presentados se generan con información provisional que están sujetos a ajustes por registros posteriores o validaciones. Información provisional sujeta a cambios.

La varicela, causada por el virus Varicela-Zóster (VZV), suele ser benigna en la infancia, pero en adultos puede ocasionar complicaciones graves como neumonía o encefalitis, con una letalidad hasta 40 veces mayor que en niños.

En Ecuador, la vigilancia se realiza bajo modalidad agrupada y se ha observado una tendencia ascendente en los últimos años. En el año 2025, desde la SE 01-53, se han notificado 7.000 casos a nivel nacional, destacándose Guayas con 1.551 casos. El grupo etario más afectado fue el de 20 a 49 años, seguido por niños de 1 a 4 años.


La incidencia nacional acumulada de varicela en 2025 fue de 35,35 casos por 100.000 habitantes.

En la Semana Epidemiológica 27 del 2026, se notificaron 128 casos, acumulando un total de 4.135 casos a nivel nacional, las provincias con mayor tasa de incidencia son Orellana (93,89), Pastaza (80,23), Napo (80,07). Estos datos evidencian posibles brotes localizados y resaltan la necesidad de fortalecer la vigilancia individualizada, considerando medidas de prevención ampliadas, especialmente en grupos no cubiertos por esquemas de vacunación sistemática.

**Casos y tasa de incidencia acumulada de varicela por 100 mil Ha, por provincia de domicilio. (SE 01-27), 2026, Ecuador.**


| PROVINCIA    | Casos    |       | Tasa de incidencia acumulada X 100 mil Hbts |       | Casos Total | Tasa de incidencia ac.. Total |
|--------------|----------|-------|---------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------|
|              | SE 01-26 | SE 27 | SE 01-26                                    | SE 27 |             |                               |
| ORELLANA     | 139      | 4     | 91,26                                       | 2,63  | 143         | 93,89                         |
| PASTAZA      | 103      | 4     | 77,23                                       | 3,00  | 107         | 80,23                         |
| NAPO         | 124      | 2     | 78,80                                       | 1,27  | 126         | 80,07                         |
| MORONA ..    | 108      | 1     | 49,83                                       | 0,46  | 109         | 50,29                         |
| SUCUMBIOS    | 97       | 1     | 38,28                                       | 0,39  | 98          | 38,68                         |
| COTOPAXI     | 170      | 6     | 35,59                                       | 1,26  | 176         | 36,84                         |
| CHIMBOR..    | 185      | 8     | 32,26                                       | 1,39  | 193         | 33,65                         |
| CARCHI       | 39       | 1     | 24,74                                       | 0,63  | 40          | 25,38                         |
| AZUAY        | 226      | 4     | 23,93                                       | 0,42  | 230         | 24,36                         |
| ZAMORA C..   | 24       | 4     | 18,09                                       | 3,02  | 28          | 21,11                         |
| GALAPAG..    | 6        |       | 19,80                                       |       | 6           | 19,80                         |
| TUNGURA..    | 126      | 2     | 19,05                                       | 0,30  | 128         | 19,35                         |
| SANTO DO..   | 113      | 5     | 18,53                                       | 0,82  | 118         | 19,35                         |
| BOLIVAR      | 42       | 2     | 17,12                                       | 0,82  | 44          | 17,94                         |
| SANTA ELE..  | 81       | 2     | 17,34                                       | 0,43  | 83          | 17,77                         |
| LOS RIOS     | 184      | 4     | 16,47                                       | 0,36  | 188         | 16,83                         |
| ESMERALD..   | 99       | 6     | 15,70                                       | 0,95  | 105         | 16,65                         |
| LOJA         | 93       | 3     | 15,73                                       | 0,51  | 96          | 16,24                         |
| GUAYAS       | 735      | 32    | 14,65                                       | 0,64  | 767         | 15,29                         |
| IMBABURA     | 81       | 2     | 14,49                                       | 0,36  | 83          | 14,84                         |
| MANABI       | 258      | 3     | 13,97                                       | 0,16  | 261         | 14,13                         |
| CAÑAR        | 33       | 3     | 11,22                                       | 1,02  | 36          | 12,24                         |
| EL ORO       | 87       | 4     | 10,09                                       | 0,46  | 91          | 10,55                         |
| PICHINCHA    | 854      | 25    | 23,22                                       | 0,68  | 879         | 23,90                         |
| Casos / Tasa | 4.007    | 128   | 20,23                                       | 0,65  | 4.135       | 20,87                         |

**Representación Gráfica, tasa de incidencia acumulada de varicela por 100 mil hab, por provincia de domicilio. (SE 01-27), 2026, Ecuador.**



**Casos de varicela por grupo de edad y sexo. (SE 01-27), 2026**

GRUPO DE EDAD




**Dosis aplicadas de vacuna contra Varicela Ecuador (enero - junio 2026)**

| Biológico | Población | Total dosis aplicadas | %   |
|-----------|-----------|-----------------------|-----|
| Varicela  | 258.600   | 91.054                | 35% |

Información provisional sujeta a validación (enero a junio 2026)  
Cobertura esperada junio 50% y más (Cobertura efectiva y epidemiológicamente útil)  
Fuente: Plataforma de Registro de Atenciones en Salud. DNEAIS  
Información provisional sujeta a validación.

**Tendencia de casos de Varicela por semana epidemiológica, de los años 2022-2025 y (SE 01-27), 2026, Ecuador.**



Cambiar el link de la información <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/chickenpox>

Los datos o indicadores presentados se generan con información provisional que están sujetos a ajustes por registros posteriores o validaciones. Información provisional sujeta a cambios.

La tosferina es una enfermedad bacteriana aguda que afecta a las vías respiratorias, con mayor grave en los lactantes y niños menores de un año. Su evolución clínica comprende tres fases: Fase Catarral, Fase Paroxística y la Fase de Convalecencia. La letalidad en los países en desarrollo puede alcanzar hasta 15%, siendo la más alta en los lactantes.

Durante el año 2025 hasta la SE 53 se notificaron 2798 casos de tosferina, a nivel nacional siendo la Provincia de Manabí la más afectada con (n= 928), el grupo etario con mayor incidencia correspondió a los menores de un año.


En la SE 27 del 2026 no se confirman casos. Sin embargo el periodo acumulando de la SE 01-26 se registraron 82 casos confirmados. Las provincias con mayor incidencia fueron Morona Santiago y Pichincha con un total de 20 casos confirmados cada una y con una tasa de incidencia de 9,23 y 0,54 por 100.000 habitantes.

El grupo de edad más afectado corresponde a los menores de un año, con un total de 45 casos confirmados, y es necesario fortalecer las estrategias de vacunación y vigilancia epidemiológica en este grupo de prioritario.

**Casos confirmados, tasa de incidencia acumulada por 100 mil habitantes, tosferina, (SE 01-27) 2026, Ecuador.**

| PROVINCIA       | Casos<br>SE 01-26 | Tasa de<br>incidencia<br>acumulada ..<br>SE 01-26 | Casos<br>Total | Tasa de<br>incidencia<br>acumulada ..<br>Total |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| MORONA SANTIAGO | 20                | 9,23                                              | 20             | 9,23                                           |
| SUCUMBIOS       | 2                 | 0,79                                              | 2              | 0,79                                           |
| CAÑAR           | 2                 | 0,68                                              | 2              | 0,68                                           |
| PICHINCHA       | 20                | 0,54                                              | 20             | 0,54                                           |
| MANABI          | 10                | 0,54                                              | 10             | 0,54                                           |
| SANTO DOMINGO   | 3                 | 0,49                                              | 3              | 0,49                                           |
| IMBABURA        | 2                 | 0,36                                              | 2              | 0,36                                           |
| GUAYAS          | 15                | 0,30                                              | 15             | 0,30                                           |
| EL ORO          | 2                 | 0,23                                              | 2              | 0,23                                           |
| COTOPAXI        | 1                 | 0,21                                              | 1              | 0,21                                           |
| LOS RIOS        | 2                 | 0,18                                              | 2              | 0,18                                           |
| ESMERALDAS      | 1                 | 0,16                                              | 1              | 0,16                                           |
| TUNGURAHUA      | 1                 | 0,15                                              | 1              | 0,15                                           |
| AZUAY           | 1                 | 0,11                                              | 1              | 0,11                                           |
| Casos / Tasas   | 82                | 0,48                                              | 82             | 0,48                                           |

**Representación grafica, tasa de incidencia acumulada de tosferina por provincia de domicilio (SE 01-27) 2026, Ecuador.**




**Casos confirmados, fallecidos y tasa de letalidad por grupo de edad de Tosferina de la (SE 01-27) 2026, Ecuador.**


| GRUPO DE EDAD    | Casos | Fallecidos | Tasa de Letalidad |
|------------------|-------|------------|-------------------|
| < Menor a un año | 45    | 0          | 0,0               |
| 1 a 4 años       | 12    | 0          | 0,0               |
| 5 a 9 años       | 6     | 0          | 0,0               |
| 10 a 14 años     | 6     | 0          | 0,0               |
| 15 a 19 años     | 3     | 0          | 0,0               |
| 20 a 49 años     | 6     | 0          | 0,0               |
| 50 a 64 años     | 2     | 0          | 0,0               |
| 65 y más         | 2     | 0          | 0,0               |
| Casos / Tasa     | 82    | 0          | 0,0               |

| Dosis aplicada de vacuna contra Tosferina, Ecuador ene - jun 2026 |                  |                       |            |                                                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Biológico                                                         | Población        | Total dosis aplicadas | %          | Biológico                                       | Total dosis aplicada |
| Penta/Hexa 1                                                      | 257.105          | 99.002                | 39%        | Esquema temprano (0,1, 5 años)                  | 551.547              |
| Penta/Hexa 2                                                      | 257.105          | 97.840                | 38%        | Esquema tardío (1 a 6 años)                     | 24.709               |
| Penta/Hexa 3                                                      | 257.105          | 92.425                | 36%        | <b>Total</b>                                    | <b>576.256</b>       |
| DPT4/PENTA4/HEXA4                                                 | 258.600          | 88.956                | 34%        | Información provisional sujeta a validación.    |                      |
| DPT5/PENTA5                                                       | 277.871          | 87.126                | 31%        | Fecha de corte: 30 de junio 2026                |                      |
| TDAP                                                              | 242.130          | 86.198                | 36%        | Cobertura esperada junio 50% y más              |                      |
| <b>Total</b>                                                      | <b>1.549.916</b> | <b>551.547</b>        | <b>36%</b> | Fuente: Plataforma de Registro de Atenciones en |                      |

**Casos de Tosferina por grupo de edad y sexo (SE 01-27) 2026**



**Tendencia de Tosferina por semana epidemiológica, de los años 2022-2025 y (SE 01-27) 2026, Ecuador.**



SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD  
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**PAROTIDITIS CIE - 10: B260 - B269**  
Semana Epidemiológica (SE) 27, ECUADOR 2026

La parotiditis, una enfermedad viral prevenible por vacunación, que históricamente ha afectado con mayor frecuencia a niños en edad escolar, adolescentes y adultos jóvenes. En Ecuador, la enfermedad ha demostrado una circulación sostenida. En el 2025 se reportan 239 casos siendo la provincia con mayor número de casos Pichincha, 67 casos, el grupo de edad más afectado es el 1 a 4 años y de 5 a 9 años.


En la SE 27 del 2026 se confirma 1 caso y de la SE 01-26 se registraron 128 casos a nivel nacional, la provincia con mayor número de casos es Pichincha (n=32), y la tasa de incidencia nacional acumulada de 0,69 por 100.000 habitantes.

El grupo de edad más afectado corresponde a niños de 1 a 4 años, con un total de 43 casos confirmados, seguido del grupo de 5 a 9 años con 36 casos confirmados. Estos hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer el esquema de vacunación, con SRP, mediante la revisión de coberturas por cohortes de edad y mantener una vigilancia epidemiológica activa, especialmente en centros educativos y comunidades cerradas.


**Casos notificados y tasa de incidencia acumulada de parotiditis por 100.000 habitantes, según provincia. (SE 01-27) 2026, Ecuador.**

| PROVINCIA        | Casos    |       | Tasa de incidencia acumulada X 100 mil Hbts |       | Casos | Tasa de incidencia acumulada X 100 mil Hbts |
|------------------|----------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|
|                  | SE 01-26 | SE 27 | SE 01-26                                    | SE 27 | Total | Total                                       |
| ZAMORA CHINCHIPE | 3        |       | 2,26                                        |       | 3     | 2,26                                        |
| CAÑAR            | 6        |       | 2,04                                        |       | 6     | 2,04                                        |
| ESMERALDAS       | 10       |       | 1,59                                        |       | 10    | 1,59                                        |
| CHIMBORAZO       | 9        |       | 1,57                                        |       | 9     | 1,57                                        |
| PASTAZA          | 2        |       | 1,50                                        |       | 2     | 1,50                                        |
| NAPO             | 2        |       | 1,27                                        |       | 2     | 1,27                                        |
| MANABI           | 20       |       | 1,08                                        |       | 20    | 1,08                                        |
| AZUAY            | 10       |       | 1,06                                        |       | 10    | 1,06                                        |
| LOJA             | 6        |       | 1,01                                        |       | 6     | 1,01                                        |
| MORONA SANTIAGO  | 2        |       | 0,92                                        |       | 2     | 0,92                                        |
| PICHINCHA        | 32       |       | 0,87                                        |       | 32    | 0,87                                        |
| IMBABURA         | 3        |       | 0,54                                        |       | 3     | 0,54                                        |
| TUNGURAHUA       | 2        | 1     | 0,30                                        | 0,15  | 3     | 0,45                                        |
| COTOPAXI         | 2        |       | 0,42                                        |       | 2     | 0,42                                        |
| GUAYAS           | 13       |       | 0,26                                        |       | 13    | 0,26                                        |
| EL ORO           | 2        |       | 0,23                                        |       | 2     | 0,23                                        |
| LOS RIOS         | 2        |       | 0,18                                        |       | 2     | 0,18                                        |
| SANTO DOMINGO    | 1        |       | 0,16                                        |       | 1     | 0,16                                        |
| Casos / Tasas    | 127      | 1     | 0,69                                        | 0,15  | 128   | 0,69                                        |


**Representación Gráfica, tasa de incidencia acumulada de parotiditis por provincia de residencia. (SE 01-27) 2026, Ecuador.**



**Casos de parotiditis por grupo de edad y sexo. (SE 01-27) 2026, Ecuador.**



**Curva epidémica de casos de parotiditis por semana epidemiológica de los años 2022 -2025 y (SE 01-27) 2026, Ecuador.**



Los datos o indicadores presentados se generan con información provisional que están sujetos a ajustes por registros posteriores o validaciones. Información provisional sujeta a cambios.

El tétanos es una enfermedad prevenible por vacunación de alta letalidad, causada por la toxina de *Clostridium tetani*, que aún persiste como amenaza en poblaciones con esquemas de vacunación incompletos.

Durante el periodo SE 01 a 53 de 2025, se notificaron 10 casos de tétanos a nivel nacional, se distribuidos en las provincias de Los Ríos (4), Orellana (1), Pichincha (1) y Guayas (1), Tungurahua (1), Manabí (1) y Esmeraldas (1).

En la SE 01 del 2026 se notifica 1 caso en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, durante la SE 02 se confirma 1 caso en la provincia del Guayas y en la SE 04 un 1 caso en Manabí, durante la SE 25 se confirma 1 caso en El Oro, desde la SE 01-27 del 2026, existen 4 casos confirmados de Tétanos con 1 fallecido.


Todas las provincias mencionadas reflejan antecedente de bajo de cobertura en refuerzos o esquemas incompletos de vacunación, donde prevalecen los adultos.

Lo que indica reforzar la necesidad de fortalecer la vigilancia activa en zonas rurales, asegurar esquemas completos (incluidos refuerzos, dT) en adultos y grupos ocupacionales de riesgo, y mantener la inmunización materna para prevenir el tétanos neonatal.


**Casos y tasa de incidencia acumulada de tétanos por 100.000 habitantes, según provincia. SE (01-27) 2026, Ecuador.**

| PROVINCIA     | SEMANA EPID EMIOLÓGICA | Fallecidos | Vivos | N° Casos | Tasa de incidencia acumulada X 100 mil Hbts |
|---------------|------------------------|------------|-------|----------|---------------------------------------------|
| SANTO DOMINGO | SE 01-26               | 0          | 1     | 1        | 0,16                                        |
| MANABI        | SE 01-26               | 1          | 0     | 1        | 0,05                                        |
| GUAYAS        | SE 01-26               | 0          | 1     | 1        | 0,02                                        |
| EL ORO        | SE 01-26               | 0          | 1     | 1        | 0,12                                        |
| Casos / Tasas |                        | 1          | 3     | 4        | 0,05                                        |

**Representación grafica, tasa de incidencia acumulada de tétanos por provincia de residencia, SE (01-27) 2026, Ecuador.**



**Histograma de casos de Tétanos por semana epidemiológica de los años 2021 -2025, y (SE 01-27) 2026, Ecuador.**



**Casos confirmados de Tétanos por grupo de edad y sexo de la (SE 01-27) 2026, Ecuador.**

| GRUPO DE EDAD | HOMBRE |
|---------------|--------|
| 20 a 49 años  | 1      |
| 50 a 64 años  | 1      |
| 65 y más      | 2      |

**Casos confirmados, casos fallecidos y tasa de letalidad por grupo de edad de Tétanos de la (SE 01-27) 2026, Ecuador.**

| GRUPO DE EDAD | Casos | Fallecidos | Tasa de Letalidad |
|---------------|-------|------------|-------------------|
| 20 a 49 años  | 1     | 0          | 0,0               |
| 50 a 64 años  | 1     | 0          | 0,0               |
| 65 y más      | 2     | 1          | 50,0              |
| Casos / Tasa  | 4     | 1          | 25,0              |

1. Organización Panamericana de la Salud. Tétanos. Available from: [https://www.paho.org/cub/index.php?option=com\\_docman&view=download&category\\_slug=publicaciones-sobre-enfermedades-transmisibles&alias=1345-tetanos-esp&Itemid=226](https://www.paho.org/cub/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-sobre-enfermedades-transmisibles&alias=1345-tetanos-esp&Itemid=226)

Los datos o indicadores presentados se generan con información provisional que están sujetos a ajustes por registros posteriores o validaciones. Información provisional sujeta a cambios.