




La hepatitis B es una infección hepática potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B (VHB). Es problema de salud a nivel mundial. La máxima prevalencia de la hepatitis B se registra en las regiones del Pacífico Occidental y de África, en las que el 6,2% y el 6,1% de la población adulta, respectivamente, están infectados. En las regiones de la OMS del Mediterráneo Oriental, de Asia Sudoriental y de Europa se calcula que, un 3,3%, un 2,0% y un 1,6% de la población, respectivamente, padecen infección. En la región de la OMS de las Américas, el porcentaje de personas con hepatitis B es del 0,7% (1). En el Ecuador la vigilancia hasta el 2018 se la realizó con modalidad grupal, con el objetivo de lograr una caracterización epidemiológica del evento para el 2019, se cambió a modalidad individual. En el 2025 hasta la semana epidemiológica (SE) 53 se reportan en el Ecuador un total (558 casos), de Hepatitis B, la provincia con el mayor número de casos fue Esmeraldas (107 casos). Hasta la SE 28 de 2026 se notificaron 206 casos de hepatitis B a nivel nacional Esmeraldas registró el mayor número de casos (49). La mayor tasa se observó en el Oriente de la provincia de Pastaza (17,7 por 100 mil habitantes), asociada al fortalecimiento de las acciones de vigilancia, tamizaje y captación de personas en riesgo.



1. Chin J, American Public Health Association. El control de las enfermedades transmisibles. Decimonove. L HD, editor. ops; 2011. 748 p  
Nota Técnica: los datos aquí presentados están en proceso de validación debido a la metodología de cierre epidemiológico de caso v sus definiciones.