


ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATITIS A Ecuador, SE 01-30/ 2026


La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal.

Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 01-30


**Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-30**

	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
PROVINCIA	SE 01-29	SE 30	SE 01-29	SE 30	Total	Total
NAPO	193	6	137.4	6.4	199	141.6
MORONA SANTIAGO	97	1	53.4	4.0	98	53.9
ORELLANA	80		40.8		80	40.8
ZAMORA CHINCHIPE	29		33.3		29	33.3
CHIMBORAZO	151	1	32.4	0.4	152	32.6
TUNGURAHUA	180	1	31.5	0.3	181	31.7
COTOPAXI	139	2	28.2	0.9	141	28.6
AZUAY	182	8	26.2	1.3	190	27.3
PASTAZA	24	4	21.8	4.0	28	23.2
SUCUMBIOS	38		18.9		38	18.9
BOLIVAR	20		13.8		20	13.8
LOJA	42		12.8		42	12.8
PICHINCHA	347	6	11.5	0.2	353	11.7
ESMERALDAS	28		5.3		28	5.3
LOS RIOS	23	2	3.8	0.6	25	3.6
SANTO DOMINGO	15	1	3.2	0.2	16	3.4
MANABI	39	2	3.2	0.6	41	3.3
IMBABURA	13	1	2.8	0.4	14	3.0
EL ORO	12		2.8		12	2.8
GUAYAS	77	3	2.0	0.1	80	2.0
CAÑAR	1		1.3		1	1.3
SANTA ELENA	2	1	2.2	0.5	3	1.0
Total	1,732	39	12.0	0.4	1,771	12.0


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-30



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 01-30




Tasa por 100mil habitantes B150-B159 Hepatitis A por regiones SE 01-30






SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, SE 01-30 / 2026

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesado de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos.




Casos y tasa de incidencia por 100 mil habitantes notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-30

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
	SE 01-29	SE 30	SE 01-29	SE 30	Total	Total
CARCHI	365	13	279.7	11.2	378	289.7
PASTAZA	238	4	196.8	4.5	242	200.1
CHIMBORAZO	533	3	109.4	3.8	536	110.0
MORONA SANTIAGO	159	2	96.8	5.3	161	98.0
PICHINCHA	2,917	73	94.3	2.6	2,990	96.7
COTOPAXI	339	11	68.7	3.0	350	70.9
NAPO	49	1	37.4	15.0	50	38.2
ZAMORA CHINCHIPE	19		29.8		19	29.8
TUNGURAHUA	131	2	24.9	0.5	133	25.2
IMBABURA	74	2	24.5	0.9	76	25.2
LOJA	77	10	20.3	3.6	87	22.9
AZUAY	170		22.5		170	22.5
EL ORO	125	3	20.0	0.7	128	20.4
ORELLANA	40		20.4		40	20.4
LOS RIOS	140	4	18.1	2.4	144	18.6
ESMERALDAS	97	2	17.7	3.6	99	18.0
GUAYAS	557	28	12.7	0.8	585	13.4
CAÑAR	18		12.3		18	12.3
SANTO DOMINGO	42	2	7.9	0.4	44	8.3
MANABI	98	1	7.9	0.8	99	8.0
SANTA ELENA	29	1	10.1	0.8	30	7.4
GALAPAGOS	1		5.5		1	5.5
SUCUMBIOS	4		3.1		4	3.1
BOLIVAR	2		2.0		2	2.0
Total	6,224	162	39.8	1.7	6,386	40.6




La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-30

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
	SE 01-29	SE 30	SE 01-29	SE 30	Total	Total
NAPO	37.0	1.0	42.7	1.2	38.0	43.8
SUCUMBIOS	33.0	2.0	25.3	18.9	35.0	26.9
PASTAZA	23.0		22.9		23.0	22.9
CAÑAR	17.0		21.8		17.0	21.8
MORONA SANTIAGO	14.0	2.0	12.9	8.0	16.0	14.8
COTOPAXI	45.0	1.0	10.1	1.5	46.0	10.3
TUNGURAHUA	8.0	1.0	9.0	4.4	9.0	10.1
ZAMORA CHINCHIPE	2.0		8.8		2.0	8.8
EL ORO	31.0		8.1		31.0	8.1
ORELLANA	8.0		4.2		8.0	4.2
GUAYAS	148.0	7.0	3.8	0.2	155.0	4.0
CHIMBORAZO	13.0		3.7		13.0	3.7
MANABI	26.0		2.6		26.0	2.6
BOLIVAR	3.0		2.6		3.0	2.6
LOS RIOS	9.0		2.5		9.0	2.5
PICHINCHA	62.0	3.0	2.2	0.1	65.0	2.3
ESMERALDAS	8.0		2.2		8.0	2.2
CARCHI	2.0		2.1		2.0	2.1
LOJA	5.0		1.7		5.0	1.7
SANTO DOMINGO	6.0		1.3		6.0	1.3
AZUAY	5.0	1.0	0.7	0.2	6.0	0.9
IMBABURA	3.0		0.9		3.0	0.9
SANTA ELENA	1.0		0.5		1.0	0.5
Total	509.0	18.0	4.0	0.3	527.0	4.2

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-30




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 01-30




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2027
Nota: datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Tasa por 100 mil habitantes de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por regiones SE 01-30



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
SHIGELOSIS Ecuador, SE 01-30 / 2026


La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año.



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA Ecuador, SE 01-30 , 2026

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona.


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por años SE SE 01-30




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 01-30, 2026

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100..		Casos	
	SE 01-29	SE 30	SE 01-29	SE 30	Total	Total
SUCUMBIO	68	1	35.4	0.9	69	35.9
MORONA SANTIAGO	16		33.0		16	33.0
ORELLANA	24		12.2		24	12.2
ESMERALDAS	50	1	9.7	1.8	51	9.9
LOJA	7		9.4		7	9.4
LOS RIOS	31	1	8.3	0.5	32	8.6
CAÑAR	6		8.1		6	8.1
NAPO	7		7.6		7	7.6
COTOPAXI	27	1	6.8	1.4	28	7.1
GUAYAS	179	7	4.6	0.2	186	4.8
PASTAZA	5		4.3		5	4.3
CARCHI	2	1	2.1	1.1	3	3.2
ZAMORA CHINCHIPE	1		3.1		1	3.1
TUNGURAHUA	14	1	3.0	4.4	15	3.1
BOLIVAR	2		2.0		2	2.0
CHIMBORAZO	5		1.6		5	1.6
SANTA ELENA	4		1.4		4	1.4
EL ORO	5		1.3		5	1.3
AZUAY	7	1	1.0	0.2	8	1.2
MANABI	6		1.2		6	1.2
IMBABURA	3		1.0		3	1.0
PICHINCHA	23	2	0.8	0.1	25	0.9
SANTO DOMINGO	2		0.4		2	0.4
Total	494	16	4.0	0.2	510	4.1

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE SE 01-30, 2026



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo SE SE 01-30 , 2026



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior

Tasa por 100 mil habitantes de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por regiones SE 01-30, 2026

