


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATITIS A Ecuador, SE 01-33 / 2026

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal.


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 01-33




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-33

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
	SE 01-32	SE 33	SE 01-32	SE 33	Total	Total
NAPO	215	9	153,0	7,5	224	159,4
MORONA SANTIAGO	101	2	55,6	3,3	103	56,7
ORELLANA	86	1	43,9	1,0	87	44,4
ZAMORA CHINCHIPE	30	2	34,5	6,2	32	36,8
CHIMBORAZO	164	6	35,1	2,0	170	36,4
TUNGURAHUA	189	7	33,1	1,5	196	34,3
AZUAY	205	7	29,5	1,1	212	30,5
COTOPAXI	146	2	29,6	2,2	148	30,0
PASTAZA	31		25,6		31	25,6
SUCUMBIOS	40		19,9		40	19,9
BOLIVAR	25	1	17,3	4,9	26	15,8
PICHINCHA	393	16	13,1	0,6	409	13,6
LOJA	43	4	12,1	1,4	47	12,5
ESMERALDAS	28	1	5,3	1,8	29	5,5
MANABI	58	6	4,7	0,9	64	4,9
LOS RIOS	28	2	4,0	1,0	30	4,3
SANTO DOMINGO	18	1	3,8	0,2	19	4,0
CAÑAR	2	1	2,6	1,3	3	3,9
IMBABURA	14	1	3,0	0,4	15	3,2
EL ORO	14		2,9		14	2,9
GUAYAS	96	7	2,4	0,2	103	2,6
CARCHI	1	2	3,3	2,1	3	2,4
SANTA ELENA	5	2	1,2	1,0	7	1,7
Total	1.932	80	12,9	0,8	2.012	13,2


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-33



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 01-33




Tasa por 100mil habitantes B150-B159 Hepatitis A por regiones SE 01-33



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, SE 01-33 / 2026


Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesado de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos.




Casos y tasa de incidencia por 100 mil habitantes notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-33

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
	SE 01-32	SE 33	SE 01-32	SE 33	Total	Total
CARCHI	411	23	315,0	21,3	434	332,6
PASTAZA	255	6	210,9	6,7	261	215,8
CHIMBORAZO	553	14	113,5	3,1	567	116,3
PICHINCHA	3.174	73	102,6	2,6	3.247	105,0
MORONA SANTIAGO	174	1	104,4	4,3	175	105,0
COTOPAXI	369	12	74,8	2,8	381	77,2
NAPO	56	1	42,8	1,2	57	43,5
LOJA	123	17	32,4	5,3	140	36,9
ZAMORA CHINCHIPE	19		29,8		19	29,8
TUNGURAHUA	138	4	26,2	1,0	142	26,9
IMBABURA	80	1	26,5	0,4	81	26,8
AZUAY	175	8	23,1	1,2	183	24,2
EL ORO	134	2	21,4	0,6	136	21,7
ORELLANA	41	1	20,9	3,3	42	21,4
LOS RIOS	157		20,3		157	20,3
ESMERALDAS	107	1	19,5	2,7	108	19,7
GUAYAS	632	16	14,4	0,4	648	14,8
CAÑAR	18		12,3		18	12,3
MANABI	109	4	8,8	0,7	113	8,9
SANTO DOMINGO	45		8,5		45	8,5
SANTA ELENA	32	1	7,9	0,5	33	8,1
GALAPAGOS	1		5,5		1	5,5
SUCUMBIOS	4		3,1		4	3,1
BOLIVAR	2		2,0		2	2,0
Total	6.809	185	43,2	1,7	6.994	44,3


Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-33




Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo SE 01-33



Tasa por 100mil habitantes de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por regiones SE 01-33




La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-33

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
	SE 01-32	SE 33	SE 01-32	SE 33	Total	Total
NAPO	41,0	1,0	47,3	1,2	42,0	48,4
SUCUMBIOS	35,0		26,9		35,0	26,9
PASTAZA	23,0		22,9		23,0	22,9
CAÑAR	17,0		21,8		17,0	21,8
MORONA SANTIAGO	16,0		14,8		16,0	14,8
COTOPAXI	47,0		10,5		47,0	10,5
TUNGURAHUA	9,0		10,1		9,0	10,1
ZAMORA CHINCHIPE	2,0		8,8		2,0	8,8
EL ORO	32,0		8,3		32,0	8,3
GUAYAS	162,0	3,0	4,2	0,1	165,0	4,3
ORELLANA	8,0		4,2		8,0	4,2
CHIMBORAZO	13,0		3,7		13,0	3,7
LOS RIOS	11,0		3,1		11,0	3,1
MANABI	27,0		2,7		27,0	2,7
PICHINCHA	71,0	7,0	2,5	0,2	78,0	2,7
BOLIVAR	3,0		2,6		3,0	2,6
ESMERALDAS	8,0		2,2		8,0	2,2
CARCHI	2,0		2,1		2,0	2,1
LOJA	5,0	1,0	1,7	4,4	6,0	1,9
SANTO DOMINGO	6,0	1,0	1,3	0,2	7,0	1,5
AZUAY	7,0		1,0		7,0	1,0
IMBABURA	3,0		0,9		3,0	0,9
SANTA ELENA	1,0		0,5		1,0	0,5
Total	549,0	13,0	4,4	0,2	562,0	4,5

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-33




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 01-33




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2027
Nota: datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Tasa por 100 mil habitantes de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por regiones SE 01-33




SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
SHIGELOSIS Ecuador, SE 01-33 / 2026

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año.






SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA Ecuador, SE 01-33 , 2026

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona.



PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100..		Casos	Tasa ..
	SE 01-32	SE 33	SE 01-32	SE 33	Total	Total
SUCUMBIOS	70		36,4		70	36,4
MORONA SANTIAGO	16		33,0		16	33,0
ORELLANA	29	1	14,8	1,8	30	15,3
ESMERALDAS	55		10,7		55	10,7
LOJA	7		9,4		7	9,4
LOS RIOS	33		8,9		33	8,9
CAÑAR	6		8,1		6	8,1
NAPO	7		7,6		7	7,6
COTOPAXI	29		7,4		29	7,4
GUAYAZA	203	12	5,2	0,4	215	5,5
PASTAZA	5		4,3		5	4,3
CARCHI	3		3,2		3	3,2
ZAMORA CHINCHIPE	1		3,1		1	3,1
TUNGURAHUA	15		3,1		15	3,1
BOLIVAR	2		2,0		2	2,0
CHIMBORAZO	6		1,9		6	1,9
SANTA ELENA	4		1,4		4	1,4
MANABI	7		1,4		7	1,4
AZUAY	9		1,3		9	1,3
EL ORO	5		1,3		5	1,3
PICHINCHA	31		1,1		31	1,1
IMBABURA	3		1,0		3	1,0
SANTO DOMINGO	2		0,4		2	0,4
Total	548	13	4,4	0,4	561	4,5



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior