


La inmunización es uno de los logros más importantes de la salud pública, al haber permitido la reducción sustancial de enfermedades infecciosas prevenibles. A nivel global, los programas de vacunación han contribuido significativamente a disminuir la morbilidad y la mortalidad infantil. En Ecuador, estos esfuerzos han resultado en una reducción superior al 90% en la incidencia de Enfermedades Prevenibles por Vacunación (EPV) y hasta un 50% en la mortalidad infantil.

En 2010, el 85% de los lactantes a nivel mundial - aproximadamente 116 millones - recibieron las tres dosis de la vacuna DTP3, protegiéndolos contra enfermedades como difteria, tétanos y tosferina. Para 2020, la cobertura global contra poliomielitis alcanzó el 83%, mientras que en las Américas se reportó una cobertura del 89% con IPV1 y del 82% con esquema completo antipoliomielítico.

Enfermedades Prevenibles por Vacunación por año 2021-2025, (SE 01-31) 2026, Ecuador.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B010-B019 Varicela	2883	3703	6179	5438	7000	4755
A370-A379 Tosferina		57	180	141	2798	85
B260-B269 Parotiditis infecciosa	141	132	192	246	242	148
A35X Tétanos	5	9	4	11	10	4
A390 (G01) Meningitis Meningocócica	1	3	3	1	4	
A363 Difteria Cutánea				1		
A33X Tétanos neonatal		1				

Distribución geográfica de tasas de EPV por provincia, (SE 01-31) 2026, Ecuador.



Los datos o indicadores presentados se generan con información provisional que están sujetos a ajustes por registros posteriores o validaciones. Información provisional sujeta a cambios.

La varicela, causada por el virus Varicela-Zóster (VZV), suele ser benigna en la infancia, pero en adultos puede ocasionar complicaciones graves como neumonía o encefalitis, con una letalidad hasta 40 veces mayor que en niños.

En Ecuador, la vigilancia se realiza bajo modalidad agrupada y se ha observado una tendencia ascendente en el último año. En el año 2025, desde la SE 01-53, se han notificado 7.000 casos a nivel nacional, destacándose Guayas con 1.551 casos. El grupo etario más afectado fue el de 20 a 49 años, seguido por niños de 1 a 4 años.


La incidencia nacional acumulada de varicela en 2025 fue de 35,35 casos por 100.000 habitantes.

En la Semana Epidemiológica 31 del 2026, se notificaron 153 casos, acumulando un total de 4.755 casos a nivel nacional, las provincias con mayor tasa de incidencia son Orellana (105,71), Napo (83,25), Pastaza (83,23). Estos datos evidencian posibles brotes localizados y resaltan la necesidad de fortalecer la vigilancia individualizada, considerando medidas de prevención ampliadas, especialmente en grupos no cubiertos por esquemas de vacunación sistemática.

Casos y tasa de incidencia acumulada de varicela por 100 mil Ha, por provincia de domicilio. (SE 01-31), 2026, Ecuador.


PROVINCIA	Casos		Tasa de incidencia acumulada X 100 mil Hbts		Casos Total	Tasa de incidencia ac.. Total
	SE 01-30	SE 31	SE 01-30	SE 31		
ORELLANA	156	5	102,43	3,28	161	105,71
NAPO	131		83,25		131	83,25
PASTAZA	111		83,23		111	83,23
MORONA ..	113		52,14		113	52,14
SUCUMBIOS	103	1	40,65	0,39	104	41,04
CHIMBOR..	222	11	38,71	1,92	233	40,63
COTOPAXI	187	4	39,15	0,84	191	39,98
AZUAY	249	11	26,37	1,16	260	27,53
CARCHI	40		25,38		40	25,38
ZAMORA C..	30	2	22,62	1,51	32	24,12
GALAPAG..	7		23,09		7	23,09
ESMERALD..	130	10	20,62	1,59	140	22,21
TUNGURA..	140	2	21,16	0,30	142	21,47
SANTO DO..	127	2	20,82	0,33	129	21,15
BOLIVAR	47	3	19,16	1,22	50	20,38
SANTA ELE..	92	2	19,70	0,43	94	20,12
LOS RIOS	203	5	18,17	0,45	208	18,62
GUAYAS	876	47	17,46	0,94	923	18,40
LOJA	103	2	17,42	0,34	105	17,76
IMBABURA	91	1	16,27	0,18	92	16,45
MANABI	292	9	15,81	0,49	301	16,30
CAÑAR	40	1	13,60	0,34	41	13,94
EL ORO	110	8	12,76	0,93	118	13,69
PICHINCHA	1.002	27	27,25	0,73	1.029	27,98
Casos / Tasa	4.602	153	23,23	0,80	4.755	24,00

Representación Gráfica, tasa de incidencia acumulada de varicela por 100 mil hab, por provincia de domicilio. (SE 01-31), 2026, Ecuador.



Casos de varicela por grupo de edad y sexo. (SE 01-31), 2026

GRUPO DE EDAD




Dosis aplicadas de vacuna contra Varicela Ecuador (enero - julio 2026)

Biológico	Población	Total dosis aplicadas	%
Varicela	258.600	108.278	42%

Información provisional sujeta a validación (enero a julio 2026)

Tendencia de casos de Varicela por semana epidemiológica, de los años 2022-2025 y (SE 01-31), 2026, Ecuador.



Cambiar el link de la información <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/chickenpox>

Los datos o indicadores presentados se generan con información provisional que están sujetos a ajustes por registros posteriores o validaciones. Información provisional sujeta a cambios.

La tosferina es una enfermedad bacteriana aguda que afecta a las vías respiratorias, con mayor grave en los lactantes y niños menores de un año. Su evolución clínica comprende tres fases: Fase Catarral, Fase Paroxística y la Fase de Convalecencia. La letalidad en los países en desarrollo puede alcanzar hasta 15%, siendo la más alta en los lactantes.

Durante el año 2025 hasta la SE 53 se notificaron 2798 casos de tosferina, a nivel nacional siendo la Provincia de Manabí la más afectada con (n= 928) , el grupo etario con mayor incidencia correspondió a los menores de un año.


En la SE 31 del 2026 no se confirman casos. Sin embargo el periodo acumulando de la SE 01-30 se registraron 85 casos confirmados. Las provincias con mayor incidencia fueron Morona Santiago y Pichincha con un total de 20 casos confirmados cada una y con una tasa de incidencia de 9,23 y 0,54 por 100.000 habitantes.

El grupo de edad mas afectado corresponde a los menores de un año, con un total de 46 casos confirmados, y es necesario fortalecer las estrategias de vacunación y vigilancia epidemiológica en este grupo de prioritario.

Casos confirmados, tasa de incidencia acumulada por 100 mil habitantes, tosferina, (SE 01-31) 2026, Ecuador.

PROVINCIA	Casos SE 01-30	Tasa de incidencia acumulada .. SE 01-30	Casos Total	Tasa de incidencia acumulada .. Total
MORONA SANTIAGO	22	10,15	22	10,15
SUCUMBIOS	2	0,79	2	0,79
CAÑAR	2	0,68	2	0,68
SANTO DOMINGO	4	0,66	4	0,66
PICHINCHA	20	0,54	20	0,54
MANABI	10	0,54	10	0,54
IMBABURA	2	0,36	2	0,36
GUAYAS	15	0,30	15	0,30
EL ORO	2	0,23	2	0,23
COTOPAXI	1	0,21	1	0,21
LOS RIOS	2	0,18	2	0,18
ESMERALDAS	1	0,16	1	0,16
TUNGURAHUA	1	0,15	1	0,15
AZUAY	1	0,11	1	0,11
Casos / Tasas	85	0,50	85	0,50

Representación grafica, tasa de incidencia acumulada de tosferina por provincia de domicilio (SE 01-31) 2026, Ecuador.




Casos confirmados, fallecidos y tasa de letalidad por grupo de edad de Tosferina de la (SE 01-31) 2026, Ecuador.

GRUPO DE EDAD	Casos	Fallecidos	Tasa de Letalidad
< Menor a un año	46	0	0,0
1 a 4 años	13	0	0,0
5 a 9 años	7	0	0,0
10 a 14 años	6	0	0,0
15 a 19 años	3	0	0,0
20 a 49 años	6	0	0,0
50 a 64 años	2	0	0,0
65 y más	2	0	0,0
Casos / Tasa	85	0	0,0


Dosis aplicada de vacuna contra Tosferina, Ecuador ene - jul 2026

Biológico	Población	Total dosis aplicadas	%	Biológico	Total dosis aplicada
Penta/Hexa 1	257.105	117.449	46%	Esquema temprano (0,1, 5 años) y embarazadas	652.967
Penta/Hexa 2	257.105	114.922	45%	Esquema tardío (1 a 6 años)	28.952
Penta/Hexa 3	257.105	109.288	43%	Total	681.919
DPT4/PENTA4/HEXA4	258.600	104.304	40%	Información provisional sujeta a validación. Cobertura esperada julio 58% y más Fuente: Plataforma de Registro de Atenciones en Salud.DNEAIS	
DPT5/PENTA5	277.871	105.245	38%		
TDAP	242.130	101.759	42%		
Total	1.549.916	652.967	42%		

Casos de Tosferina por grupo de edad y sexo (SE 01-31) 2026



Tendencia de Tosferina por semana epidemiológica, de los años 2022-2025 y (SE 01-31) 2026, Ecuador.



Los datos o indicadores presentados se generan con información provisional que están sujetos a ajustes por registros posteriores o validaciones. Información provisional sujeta a cambios; Sin embargo, los equipos continúan intensificando las acciones de vigilancia, prevención y control, a fin de mitigar los riesgos para la salud pública.

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
PAROTIDITIS CIE - 10: B260 - B269
Semana Epidemiológica (SE) 31, ECUADOR 2026

La parotiditis, una enfermedad viral prevenible por vacunación, que históricamente ha afectado con mayor frecuencia a niños en edad escolar, adolescentes y adultos jóvenes. En Ecuador, la enfermedad ha demostrado una circulación sostenida. En el 2025 se reportan 239 casos siendo la provincia con mayor número de casos Pichincha, 67 casos, el grupo de edad más afectado es el 1 a 4 años y de 5 a 9 años.


En la SE 31 del 2026 se confirma 1 caso y de la SE 01-31 se registraron 148 casos confirmados por clínica a nivel nacional, la provincia con mayor número de casos es Pichincha (n=39), y la tasa de incidencia nacional acumulada de 0,79 por 100.000 habitantes.

El grupo de edad más afectado corresponde a niños de 1 a 4 años, con un total de 49 casos confirmados, seguido del grupo de 5 a 9 años con 43 casos confirmados. Estos hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer el esquema de vacunación, con SRP, mediante la revisión de coberturas por cohortes de edad y mantener una vigilancia epidemiológica activa, especialmente en centros educativos y comunidades cerradas.


Casos notificados y tasa de incidencia acumulada de parotiditis por 100.000 habitantes, según provincia. (SE 01-31) 2026, Ecuador.

PROVINCIA	Casos		Tasa de incidencia acumulada X 100 mil Hbts		Casos	Tasa de incidencia acumulada X 100 mil Hbts
	SE 01-30	SE 31	SE 01-30	SE 31	Total	Total
ZAMORA CHINCHIPE	4		3,02		4	3,02
NAPO	4		2,54		4	2,54
CAÑAR	7		2,38		7	2,38
ESMERALDAS	10		1,59		10	1,59
CHIMBORAZO	9		1,57		9	1,57
PASTAZA	2		1,50		2	1,50
AZUAY	12		1,27		12	1,27
MANABI	21		1,14		21	1,14
PICHINCHA	39		1,06		39	1,06
LOJA	6		1,01		6	1,01
MORONA SANTIAGO	2		0,92		2	0,92
BOLIVAR	2		0,82		2	0,82
IMBABURA	4		0,72		4	0,72
COTOPAXI	2	1	0,42	0,21	3	0,63
TUNGURAHUA	4		0,60		4	0,60
SANTO DOMINGO	2		0,33		2	0,33
GUAYAS	13		0,26		13	0,26
EL ORO	2		0,23		2	0,23
LOS RIOS	2		0,18		2	0,18
Casos / Tasas	147	1	0,78	0,21	148	0,79


Representación Gráfica, tasa de incidencia acumulada de parotiditis por provincia de residencia. (SE 01-31) 2026, Ecuador.



Casos de parotiditis por grupo de edad y sexo. (SE 01-31) 2026, Ecuador.



Curva epidémica de casos de parotiditis por semana epidemiológica de los años 2022 -2025 y (SE 01-31) 2026, Ecuador.



Los datos o indicadores presentados se generan con información provisional que están sujetos a ajustes por registros posteriores o validaciones. Información provisional sujeta a cambios.

El tétanos es una enfermedad prevenible por vacunación de alta letalidad, causada por la toxina de *Clostridium tetani*, que aún persiste como amenaza en poblaciones con esquemas de vacunación incompletos.

Durante el periodo SE 01 a 53 de 2025, se notificaron 10 casos de tétanos a nivel nacional, se distribuidos en las provincias de Los Ríos (4), Orellana (1), Pichincha (1) y Guayas (1), Tungurahua (1), Manabí (1) y Esmeraldas (1).

En la SE 01 del 2026 se notifica 1 caso en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, durante la SE 02 se confirma 1 caso en la provincia del Guayas y en la SE 04 un 1 caso en Manabí, durante la SE 25 se confirma 1 caso en El Oro, desde la SE 01-31 del 2026, existen 4 casos confirmados de Tétanos con 1 fallecido.


Todas las provincias mencionadas reflejan antecedente de bajo de cobertura en refuerzos o esquemas incompletos de vacunación, donde prevalecen los adultos.

Lo que indica reforzar la necesidad de fortalecer la vigilancia activa en zonas rurales, asegurar esquemas completos (incluidos refuerzos, dT) en adultos y grupos ocupacionales de riesgo, y mantener la inmunización materna para prevenir el tétanos neonatal.


Casos y tasa de incidencia acumulada de tétanos por 100.000 habitantes, según provincia. SE (01-31) 2026, Ecuador.

PROVINCIA	SEMANA EPID EMIOLÓGICA	Fallecidos	Vivos	N° Casos	Tasa de incidencia acumulada X 100 mil Hbts
SANTO DOMINGO	SE 01-30	0	1	1	0,16
MANABI	SE 01-30	1	0	1	0,05
GUAYAS	SE 01-30	0	1	1	0,02
EL ORO	SE 01-30	0	1	1	0,12
Casos / Tasas		1	3	4	0,05

Representación grafica, tasa de incidencia acumulada de tétanos por provincia de residencia, SE (01-31) 2026, Ecuador.



Histograma de casos de Tétanos por semana epidemiológica de los años 2021 -2025, y (SE 01-31) 2026, Ecuador.



Casos confirmados de Tétanos por grupo de edad y sexo de la (SE 01-31) 2026, Ecuador.

GRUPO DE EDAD	HOMBRE
20 a 49 años	1
50 a 64 años	1
65 y más	2

Casos confirmados, casos fallecidos y tasa de letalidad por grupo de edad de Tétanos de la (SE 01-31) 2026, Ecuador.

GRUPO DE EDAD	Casos	Fallecidos	Tasa de Letalidad
20 a 49 años	1	0	0,0
50 a 64 años	1	0	0,0
65 y más	2	1	50,0
Casos / Tasa	4	1	25,0

1. Organización Panamericana de la Salud. Tétanos. Available from: https://www.paho.org/cub/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-sobre-enfermedades-transmisibles&alias=1345-tetanos-esp&Itemid=226

Los datos o indicadores presentados se generan con información provisional que están sujetos a ajustes por registros posteriores o validaciones. Información provisional sujeta a cambios.