Ministerio de Salud Pública

ECUADOR

**SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD**
**DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**

# EFTX Intoxicación por plaguicidas


**Semana epidemiológica (SE) 38 Ecuador 2026**

La intoxicación por plaguicidas constituye un importante problema de salud pública, particularmente en países con alta actividad agrícola y uso intensivo de estas sustancias. Desde la perspectiva de la vigilancia epidemiológica, estos eventos representan condiciones prevenibles, asociadas tanto a exposiciones ocupacionales como ambientales, accidentales o intencionales. La notificación y el monitoreo sistemático de las intoxicaciones por plaguicidas permiten identificar poblaciones en riesgo, patrones de exposición, tipos de sustancias involucradas y áreas geográficas prioritarias, así como detectar brotes y fortalecer las acciones de regulación, prevención y control.


## Casos y tasas de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio, Ecuador, SE 01-38 2026

| PROVINCIA | Casos SE 38 | Casos SE 01-37 | Tasa provincia por 100milH. SE 38 | Tasa provincia por 100milH. SE 01-37 | Casos Total | Tasa pr ovincia por 10.. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR | 1 | 21 | 0.5 | 10.3 | 22 | 10.8 |
| MORONA SAN.. | | 38 | | 9.0 | 38 | 9.0 |
| SUCUMBIOS | | 14 | | 6.9 | 14 | 6.9 |
| LOS RIOS | 2 | 27 | 0.2 | 2.8 | 29 | 3.0 |
| ORELLANA | 2 | 9 | 0.5 | 2.3 | 11 | 2.8 |
| NAPO | 1 | 6 | 0.4 | 2.1 | 7 | 2.5 |
| ZAMORA CHIN.. | | 5 | | 2.1 | 5 | 2.1 |
| LOJA | | 19 | | 1.9 | 19 | 1.9 |
| MANABI | | 22 | | 1.3 | 22 | 1.3 |
| COTOPAXI | | 11 | | 1.1 | 11 | 1.1 |
| TUNGURAHUA | | 9 | | 0.8 | 9 | 0.8 |
| ESMERALDAS | | 9 | | 0.7 | 9 | 0.7 |
| CHIMBORAZO | | 7 | | 0.7 | 7 | 0.7 |
| CARCHI | | 2 | | 0.5 | 2 | 0.5 |
| SANTO DOMIN.. | | 2 | | 0.4 | 2 | 0.4 |
| GUAYAS | 1 | 33 | 0.0 | 0.3 | 34 | 0.4 |
| EL ORO | | 4 | | 0.3 | 4 | 0.3 |
| SANTA ELENA | | 2 | | 0.2 | 2 | 0.2 |
| IMBABURA | | 2 | | 0.2 | 2 | 0.2 |
| AZUAY | | 2 | | 0.1 | 2 | 0.1 |
| PICHINCHA | | 4 | | 0.1 | 4 | 0.1 |
| Total | 7 | 248 | 0.1 | 0.8 | 255 | 0.8 |


## Tasa por 100mil hab. de Intoxicación por plaguicidas, Ecuador, SE 01-38 2026





## Casos de Intoxicación por plaguicidas, por grupos de edad y sexo, Ecuador, SE 01-38 2026





## Casos de Intoxicación por plaguicidas, por tipo, Ecuador, SE 01-38 2026




## Casos de Intoxicación por plaguicidas por semana epidemiológica(SE) Ecuador, años 2022 - 2026




## Tasa por regiones, por 100mil hab.



Ministerio de Salud Pública

**SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD**
**DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**

# MORDEDURA DE SERPIENTES T63.0


**Ecuador, semana epidemiológica SE 01-38 2026**

La mordedura de serpiente constituye un evento de importancia en salud pública en Ecuador, particularmente en zonas rurales y amazónicas, donde la interacción entre poblaciones humanas y serpientes venenosas es más frecuente. Este evento afecta principalmente a población en edad productiva, comunidades agrícolas y pueblos indígenas, y está asociado a factores ambientales, ocupacionales y de acceso oportuno a los servicios de salud. Desde el enfoque de la vigilancia epidemiológica, la notificación y el análisis sistemático de los casos a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública permiten identificar tendencias temporales, áreas geográficas de mayor riesgo, especies involucradas y grupos poblacionales afectados. La información generada es esencial para la detección oportuna de aumentos inusuales de casos, la adecuada planificación de la disponibilidad de sueros antiofídicos, la implementación de medidas de prevención y control, y la reducción de la mortalidad y las secuelas asociadas a las mordeduras de serpientes en el país.


## Casos de Mordedura de Serpientes por provincia de domicilio Ecuador,SE 01-38 2026

| PROVINCIA | Casos SE 38 | Casos SE 01-37 | Tasa provincia por 100milH. SE 38 | Tasa provincia por 100milH. SE 01-37 | Casos Total | Tasa provincia por 100milH. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORONA SANTIAGO | 6 | 150 | 1 | 35 | 156 | 37 |
| PASTAZA | 3 | 61 | 1 | 25 | 64 | 26 |
| SUCUMBIOS | | 33 | | 16 | 33 | 16 |
| ORELLANA | 1 | 59 | 0 | 15 | 60 | 15 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 3 | 33 | 1 | 14 | 36 | 15 |
| BOLIVAR | | 30 | | 15 | 30 | 15 |
| NAPO | | 37 | | 13 | 37 | 13 |
| LOS RIOS | 3 | 98 | 0 | 10 | 101 | 10 |
| SANTO DOMINGO | 2 | 51 | 0 | 10 | 53 | 10 |
| ESMERALDAS | 4 | 111 | 0 | 9 | 115 | 9 |
| MANABI | | 137 | | 8 | 137 | 8 |
| LOJA | | 39 | | 4 | 39 | 4 |
| COTOPAXI | 2 | 26 | 0 | 3 | 28 | 3 |
| CARCHI | | 8 | | 2 | 8 | 2 |
| EL ORO | 2 | 26 | 0 | 2 | 28 | 2 |
| SANTA ELENA | | 14 | | 2 | 14 | 2 |
| CAÑAR | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| AZUAY | | 12 | | 1 | 12 | 1 |
| IMBABURA | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| GUAYAS | | 59 | | 1 | 59 | 1 |
| PICHINCHA | | 38 | | 1 | 38 | 1 |
| CHIMBORAZO | | 2 | | 0 | 2 | 0 |
| Total | 28 | 1,037 | 0 | 3 | 1,065 | 3 |

## Tasa por 100mil hab. de Mordeduras de serpientes, Ecuador SE 01-38 2026





## Casos de Mordedura de serpientes, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 01-38 2026





## Casos de Mordeduras de serpientes según condición final y sexo Ecuador, SE 01-38 2026

| SEXO | Muerto | Vivo | Total |
|---|---|---|---|
| HOMBRE | 4 | 731 | 735 |
| MUJER | 5 | 325 | 330 |
| Total | 9 | 1,056 | 1,065 |


## Casos de Mordedura de Serpientes, por tipo Ecuador, SE 01-38 2026




## Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2023 - 2026




## Tasa por regiones, por 100mil hab.



Ministerio de Salud Pública

EL NUEVO ECUADOR

**SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD**
**DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**

# PICADURA DE ESCORPIÓN T632


**Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01- 38 / 2026**

En Ecuador, la diversidad de escorpiones es notable, con al menos 47 especies distribuidas en cinco familias y ocho géneros presentes a lo largo de las regiones Costa, Sierra, Oriente e Insular del país. Entre estas, los géneros *Tityus* (Buthidae) incluyen varias especies con potencial médico significativo debido a la toxicidad de sus venenos, mientras que otros géneros como *Centruroides* y *Teuthraustes* son frecuentes en áreas urbanas pero generalmente producen síntomas leves o locales. Los escorpiones del género *Tityus*, documentados en zonas amazónicas como Morona Santiago y Sucumbíos, han sido asociados con accidentes graves e incluso letales en otras regiones de Sudamérica, lo que resalta la importancia de su vigilancia epidemiológica en contextos rurales y periurbanos.
A pesar de la percepción tradicional de baja peligrosidad, los datos de vigilancia sugieren que las picaduras de escorpión representan un problema de salud pública subestimado, con una incidencia variable según la región, la edad y el nivel de exposición poblacional.

## Casos de Picadura de Escorpión, por provincia de domicilio Ecuador, SE 01-38 / 2026

| PROVINCIA | Casos SE 38 | Casos SE 01-37 | Tasa provincia por 100milH. SE 38 | Tasa provincia por 100milH. SE 01-37 | Casos Total | Tasa p rovinci.. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORONA SANTIAGO | 4 | 136 | 0.9 | 32.1 | 140 | 33.1 |
| SUCUMBIOS | 1 | 31 | 0.5 | 15.2 | 32 | 15.7 |
| ORELLANA | | 45 | | 11.4 | 45 | 11.4 |
| SANTO DOMINGO | 1 | 24 | 0.2 | 4.5 | 25 | 4.7 |
| MANABI | | 66 | | 3.8 | 66 | 3.8 |
| PASTAZA | | 9 | | 3.7 | 9 | 3.7 |
| NAPO | 1 | 7 | 0.4 | 2.5 | 8 | 2.8 |
| LOS RIOS | | 24 | | 2.5 | 24 | 2.5 |
| ESMERALDAS | | 20 | | 1.6 | 20 | 1.6 |
| BOLIVAR | 1 | 2 | 0.5 | 1.0 | 3 | 1.5 |
| LOJA | | 13 | | 1.3 | 13 | 1.3 |
| GUAYAS | 4 | 105 | 0.0 | 1.1 | 109 | 1.1 |
| ZAMORA CHINCHIPE | | 2 | | 0.8 | 2 | 0.8 |
| SANTA ELENA | | 5 | | 0.6 | 5 | 0.6 |
| PICHINCHA | | 34 | | 0.5 | 34 | 0.5 |
| IMBABURA | | 4 | | 0.4 | 4 | 0.4 |
| EL ORO | | 6 | | 0.4 | 6 | 0.4 |
| CHIMBORAZO | | 3 | | 0.3 | 3 | 0.3 |
| COTOPAXI | | 2 | | 0.2 | 2 | 0.2 |
| AZUAY | | 3 | | 0.2 | 3 | 0.2 |
| TUNGURAHUA | | 1 | | 0.1 | 1 | 0.1 |
| Total | 12 | 542 | 0.1 | 1.7 | 554 | 1.7 |


## Tasa por 100mil hab., de Picadura de Escorpión, Ecuador, SE 01-38 / 2026





## Número de casos de Picadura de Escorpión según condición final y sexo Ecuador, SE 01-38 2026

| SEXO | Casos | Fallecidos |
|---|---|---|
| HOMBRE | 277.0 | 0.0 |
| MUJER | 269.0 | 0.0 |

## Casos de Picadura de Escorpión, por grupos de edad y sexo Ecuador, semana epidemiológica SE 01-38 / 2026




## Casos de Picadura de Escorpión por SE, Ecuador, años 2023 - 2026




## Tasa por regiones, por 100mil hab.

