SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONOTICAS - LEPTOSPIROSIS
ECUADOR 2026 SE 38

La leptospirosis es una zoonosis de importancia para la salud pública, causada por bacterias patógenas del género *Leptospira*. Diversas especies de mamíferos silvestres y domésticos actúan como reservorios, en los cuales el agente puede mantenerse y eliminarse principalmente a través de la orina. La infección humana ocurre de manera accidental, principalmente por contacto directo o indirecto con agua, suelo, lodo o vegetación contaminados con orina de animales infectados. El riesgo de transmisión se incrementa en escenarios caracterizados por alta humedad, precipitaciones intensas, desbordamientos e inundaciones, condiciones que favorecen la dispersión y persistencia del agente en el ambiente.

Desde el punto de vista clínico, la leptospirosis presenta un amplio espectro de manifestaciones, que comprende desde cuadros febriles inespecíficos y autolimitados hasta formas graves con compromiso multiorgánico. Entre las principales complicaciones se encuentra el síndrome de Weil, caracterizado por ictericia, insuficiencia renal y manifestaciones hemorrágicas, así como la hemorragia pulmonar grave, asociada con una elevada letalidad.


En Ecuador, la leptospirosis es un evento de notificación obligatoria.

En 2025 se observó un incremento de casos respecto a los tres años anteriores.

Para 2026, Manabí concentra el mayor número de casos acumulados, mientras que Orellana presenta la mayor incidencia, seguida de Zamora Chinchipe.

Nota: Para este reporte se consideran casos probables y confirmados.


Casos deA270-A279 Leptospirosis por Semana Epidemiológica SE 38 2026




Casos de A270-A279 Leptospirosis por Provincia SE 38 2026

Prov.Domic1	SE 01-37	SE_38	Total
MANABI	227	4	231
GUAYAS	95	1	96
ORELLANA	69		69
ESMERALDAS	60		60
LOJA	38		38
SANTO DOMINGO	34	2	36
LOS RIOS	30	3	33
ZAMORA CHINCHIPE	32		32
PICHINCHA	27		27
NAPO	27		27
SUCUMBIOS	21	2	23
EL ORO	16		16
MORONA SANTIAGO	14		14
SANTA ELENA	8	1	9
PASTAZA	9		9
COTOPAXI	7		7
CHIMBORAZO	7		7
TUNGURAHUA	6		6
IMBABURA	4		4
AZUAY	4		4
CAÑAR	3		3
BOLIVAR	2		2
Total	740	13	753

Incidencia de A270-A279 Leptospirosis, por Provincia SE 38 2026



Casos de A270-A279 Leptospirosis, por grupos de edad y sexo SE 38 2026



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación


Bibliografía

1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos delsubsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en America Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005

SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONOTICAS: BRUCELOSIS
ECUADOR 2026 SE 38

La brucelosis es una zoonosis causada por bacterias del género *Brucella*, principalmente *B. abortus, B. melitensis* y *B. suis*. Los principales reservorios son el ganado bovino, porcino, caprino y ovino. La transmisión a las personas ocurre por contacto con animales infectados, consumo de productos lácteos no pasteurizados o inhalación de partículas contaminadas.
La enfermedad puede presentarse de forma aguda o insidiosa, con fiebre, sudoración profusa, artralgias, mialgias, cefalea, fatiga y pérdida de peso; sin tratamiento adecuado, puede evolucionar a formas persistentes.
En Ecuador, la incidencia en 2024 fue de 0,16 casos por 100 000 habitantes, con mayor concentración de casos en Imbabura. Para 2025, posterior a la reclasificación de los casos, se registraron 46 casos, con mayor concentración en Guayas. Hasta la SE 38 de 2026, se notifican 11 casos, con mayor incidencia en Sucumbíos, Zamora chinchipe y Esmeraldas.
La prevención y control requieren fortalecer la vigilancia epidemiológica y el control de la infección en animales, en coordinación con Agrocalidad, así como la capacitación de las personas expuestas.
Nota: Para este reporte se consideran casos probables y confirmados.

Casos de A230-A239 Brucelosis, por Semana Epidemiológica SE 38 2026



Casos de A230-A239 Brucelosis, por Provincia, SE 38 2026


Prov.Domic1	SE 01-37	Total
ESMERALDAS	5	5
MANABI	1	1
PICHINCHA	1	1
SUCUMBIOS	2	2
TUNGURAHUA	1	1
ZAMORA CHINCHIPE	1	1
Total	11	11

En esta tabla y en el mapa se consideran los casos probables y confirmados y estan sujetos a variación por ajustes posteriores.

Incidencia de A230-A239 Brucelosis, por Provincia SE 38 2026



Caso de A230-A239 Brucelosis , por grupos de edad y sexo, SE 38-2026




Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación

Bibliografía
1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos delsubsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en America Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES ZOONOTICAS: MORDEDURA DE ANIMALES SUSCEPTIBLES A RABIA
ECUADOR 2026 SE 38

Anualmente, se registran alrededor de 10 millones de exposiciones humanas a la rabia y 55.000 defunciones, la mayoría en países en desarrollo, particularmente en Asia y África. La principal causa de muerte en humanos es la falta de profilaxis adecuada tras mordeduras de perros infectados.
En Ecuador, el primer caso de rabia se notificó en 1941. En 1996, el país enfrentó la epidemia más grave de su historia, con 65 fallecidos y una tasa de mortalidad de 0.58 por 100,000 habitantes, una de las más altas en las Américas. El último caso de rabia en caninos se registró en 2006, y en 2011 se notificaron varios casos de rabia silvestre en humanos. Además, se han diagnosticado casos en felinos, bovinos, porcinos, equinos y ovinos, tanto en zonas rurales como urbanas marginales, así como en murciélagos, reservorios clave del virus en su ciclo silvestre. Para el 2026, la notificación de mordeduras por mamíferos susceptibles de rabia aumentó en comparación con 2025, siendo Pichincha la provincia con mayor número de reportes. La mayor incidencia por clasificación final con riesgo, se concentró en la provincia de Carchi (31.68), seguido de Morona Santiago (30.92),Pastaza (30.13).


Casos de Mordedura de animales susceptibles a Rabia por Semana Epidemiológica SE 38, 2026




Casos de Mordedura de animales susceptibles a Rabia por Provincia, SE 38 2026

Prov.Domic1	SE 01-37	SE_38	Total
PICHINCHA	3628	93	3721
GUAYAS	1930	66	1996
MANABI	1287	29	1316
TUNGURAHUA	1225	37	1262
AZUAY	723	20	743
COTOPAXI	629	19	648
LOS RIOS	602	10	612
CHIMBORAZO	599	13	612
SANTO DOMINGO	451	2	453
LOJA	405	6	411
EL ORO	348	7	355
ESMERALDAS	335	9	344
MORONA SANTIAGO	321	10	331
SUCUMBIOS	308	13	321
IMBABURA	305	14	319
BOLIVAR	303	14	317
SANTA ELENA	289	8	297
CAÑAR	286	9	295
ZAMORA CHINCHIPE	263	5	268
ORELLANA	260	5	265
PASTAZA	258	3	261
CARCHI	227	3	230
NAPO	186	4	190
Total	15.168	399	15.567

Incidencia por calsificación final con riesgo de Mordedura de animales susceptibles a rabia por provincia, SE 38 2026




Caso de Mordedura de animales susceptibles a Rabia, por grupos de edad y sexo SE 38 2026



Hasta la SE 37 de 2026, se reportan el 10.68% (n=1 620) de casos por mordeduras asociados a caninos con riesgo y el 89.32% (n=13 550) sin riesgo.

Casos de mordedura de animales susceptibles a rabia según especie agresora y clasificación de riesgo, 2025 - 2026, SE 38



Fuente: SIVE ALERTA; Elaborado: DNVE; Datos sujetos a variación

Bibliografia
1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Quito: Manual de procedimientos delsubsistema alerta acción SIVE-ALERTA, DNVE 2014
2. El control de las enfermedades transmisibles; 20ava edición, Dr.David L. Heymann, OPS 2015
3. Eliminación de la rabia humana transmitida por perros en America Latina; Análisis de Situación, Washintong D.C: OPS 2005