



**DEFINICIONES OPERACIONALES Y TÉCNICAS**

**Defunción Materna:** se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales e incidentales.

**Defunciones obstétricas Directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto, y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.

**Defunciones obstétricas Indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica directa pero si agravadas por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

**Razón de Muerte Materna (RMM):** es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) dividido para el número de nacidos vivos estimados para el año y multiplicado por 100.000.

**El siguiente análisis se realiza con las Muertes Maternas que ocurrieron hasta los 42 días de puerperio, las mismas que son tomadas para el cálculo del indicador de la RMM al finalizar el año**

**RESUMEN RELEVANTE DE LAS MUERTES MATERNAS HASTA LA SE 19 DEL 2019**

- Hasta la SE 19 se han notificado 52 MM; de las cuales el 82,7% (43 MM) son MM antes de los 42 días de puerperio y son las utilizadas para el cálculo del indicador de la RMM, y el 17,3% (9) son MM tardías posterior a los 42 días de terminado el puerperio, pero menos de un año.
- Comparando las MM del 2019 con el año 2018 hay una disminución para el 2019 del 12,24% (6 MM)
- Las principales causas de las Muertes Maternas hasta la SE 19 son los Trastornos hipertensivos con el 25,6% (11 MM); las Hemorragias obstétricas con el 21% las causas Indirectas 18,6% (8 MM)
- Las provincias que notifican el mayor número de MM por lugar de fallecimiento hasta la SE 19 son: Guayas (17 MM) y Azuay (6 MM)

**COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA MM HASTA LA SE 19 DE LOS AÑOS 2015 AL 2019**

Año	MM hasta SE 19	MM tardías hasta SE 19	RMM	Total para RMM	Total MM tardías
2015	55	12	45	150	33
2016	49	8	40	133	21
2017	50	27	43	143	68
2018*	49	19	37	125	29
2019**	43	9			


\* Dato preliminar sin segunda BA del año 2018

\*\*Dato de las notificaciones sistemáticas del año 2019

**Tabla N° 1 Muertes Maternas por zona, provincia y cantón de fallecimiento SE 1 a SE 19 Ecuador 2019**

Zona	Provincia	Cantón	SE 1 a 18	SE 19	Total
Zona 1	Esmeraldas	Esmeraldas	1		1
	Imbabura	Otavalo		1	1
Zona 2	Napo	Tena	1		1
	Orellana	Orellana	1		1
Zona 3	Chimborazo	Alausi	1		1
	Pastaza	Puyo	1		1
	Tungurahua	Ambato	3		3
Zona 4	Manabí	Manta	1		1
	Santo Domingo	Santo Domingo	2		2
Zona 5	Guayas	Balzar	1		1
		Milagro	1		1
	Los Ríos	Babahoyo	2		2
	Santa Elena	Santa Elena	1		1
Zona 6	Azuay	Cuenca	6		6
Zona 7	El Oro	Machala	1		1
	Loja	Loja	3		3
Zona 8	Guayas	Guayaquil	14	1	15
Zona 9	Pichincha	Quito	1		1
<b>Total</b>			<b>41</b>	<b>2</b>	<b>43</b>


**Mapa N° 1 Muertes Maternas por provincia de fallecimiento SE 1 a la SE 19 Ecuador 2019**



Fuente:SNMM/DNVE  
Fecha de corte:15/05/2019

En la SE 19 se notifican 2 MM: 1 en la provincia de Guayas y 1 en la provincia de Imbabura, además se notifican 2 casos de MM de notificación tardía, una de la SE 12 de Azuay y 1 de la SE 17 de Loja.


**Mapa N° 2 Muertes Maternas por provincia de residencia SE 1 a SE 19 Ecuador 2019**



Fuente: SNMM/DNVE  
Fecha de corte: 15/05/2019

En la SE 19 se reportan 2 casos de MM de la misma provincia de residencia y de fallecimiento, la provincia de Imbabura y la provincia del Guayas, y dos casos de notificaciones tardías de la SE 12 de Azuay y de la SE 17 de Loja

**Gráfico N° 1 Porcentaje de MM por zona de fallecimiento SE 1 a SE 19 Ecuador 2019**



Hasta la SE 19, el mayor porcentaje de MM por lugar de fallecimiento es la zona 8 con 15 MM; luego la zona 6 con 6 MM; las zonas 3 y 5 con 5 MM; la zona 7 con 4 MM; la zona 4 con 3 MM; las zonas 1 y 2 con 2 MM y la zona 9 con 1 MM.

**Gráfico N° 3 Concordancia entre provincia de fallecimiento de las MM y provincia de residencia SE 1 a SE 19 Ecuador 2019**


Provincia de fallecimiento	Provincia de residencia														Total			
	Azuay	Esmeraldas	Guayas	Loja	Los Ríos	Manabí	Santa Elena	Santo Domingo	Tungurahua	El Oro	Orellana	Chimborazo	Imbabura	Cañar		Morona	Pichincha	Bolívar
Azuay	4																	6
Esmeraldas		1																1
Guayas			14															17
Loja				3														3
Los Ríos					1													2
Manabí						1												1
Santa Elena							1											1
Santo Domin..								1										1
Tungurahua									2									2
El Oro										1								1
Orellana											1							1
Chimborazo												1						1
Imbabura													1					1
Napo																	1	1
Pichincha																		1
Pastaza																		1
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>43</b>

Los casilleros diagonales pintados corresponden al número de MM en los que la provincia de ocurrencia coincide con la provincia de fallecimiento  
Los casilleros por fuera corresponden al número de MM donde la muerte ocurrió en una provincia diferente a la provincia de residencia

**Tabla N° 2 MM por zona, provincia y cantón de residencia SE 1 a SE 19 Ecuador 2019**

Zona	Provincia	Cantón	SE 1 a 18	SE 19	Total
Zona 1	Esmeraldas	Esmeraldas	1		1
	Imbabura	Ibarra		1	1
<b>Total</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Zona 2	Orellana	Loreto	1		1
<b>Total</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Zona 3	Chimborazo	Alausi	1		1
		Riobamba	1		1
	Tungurahua	Ambato	1		1
		Pelileo	1		1
<b>Total</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Zona 4	Manabí	Chone	1		1
		Paján	1		1
	Santo Domi..	Santo Domingo	1		1
<b>Total</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Zona 5	Bolívar	Guaranda	1		1
	Guayas	Balzar	1		1
		Isidro Ayora	1		1
		Naranjito	1		1
		Simón Bolívar	1		1
	Los Ríos	Babahoyo	1		1
		Ventanas	1		1
	Santa Elena	La Libertad	1		1
		Santa Elena	1		1
<b>Total</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Zona 6	Azuay	Cuenca	4		4
	Cañar	Cañar	1		1
		La Troncal	1		1
	Morona	Santiago	1		1
		Taisha	1		1
<b>Total</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Zona 7	El Oro	Santa Rosa	1		1
	Loja	Loja	3		3
<b>Total</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Zona 8	Guayas	Guayaquil	10	1	11
<b>Total</b>			<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
Zona 9	Pichincha	Quito	1		1
<b>Total</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Total</b>			<b>41</b>	<b>2</b>	<b>43</b>

**Gáfico N° 2 Porcentaje de MM por zona de residencia SE 1 a SE 19 Ecuador 2019**



Igualmente el mayor porcentaje de MM por lugar de residencia son: es la zona 8; la zona 5; la zona 6; las zonas 3 y 7 las zonas 4; la zona 1 y las zonas 2 y 9


La mortalidad materna no siempre se produce en el mismo lugar (provincia) en donde reside la madre, información que se representa en el gráfico 3: lugar de residencia y lugar de fallecimiento de cada caso de MM.

Como se observa en el gráfico hasta la SE 19; 32 casos de MM pertenecen al mismo lugar de residencia y de fallecimiento los 11 casos restantes pertenecen a otras provincias donde residen.

**Tabla N° 3 Número de MM por zona, provincia, hospital de fallecimiento y hospital de referencia SE 1 a SE 19 Ecuador 2019**


Zona Fallecimi..	Provincia de falle..	donde ocurre la MM	Nombre del establecimiento donde fallece	Tipo Unidad que Refiere	Casos MM
Zona 1	Esmeraldas	Traslado	NA	CS N° 1 Esmeraldas	1
	Imbabura	RPIS/MSP	H. General San Vicente de Paúl	H. Básico San Luis de Otavalo	1
Zona 2	Napo	RPIS/MSP	H. General José María Velasco Ibarra	Ninguna	1
	Orellana	Traslado	NA	H. General Francisco de Orella..	1
Zona 3	Chimborazo	Domicilio	NA	Ninguna	1
	Pastaza	RPIS/MSP	H. General del Puyo	H. General de Macas	1
	Tungurahua	RPIS/IESS	H. General de Ambato	CS Quisapincha	1
		RPIS/MSP	H. General Docente de Ambato	H. Básico de Pelileo	1
		Traslado	NA	H. General Alfredo Noboa	1
Zona 4	Manabí	RPIS/IESS	H. General de Manta	H. Básico de Paján	1
	Santo Domingo	RPIS/MSP	H. General Gustavo Dominguez	CS San Eulogio	1
				H. Básico de Chone	1
Zona 5	Guayas	Domicilio	NA	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General León Becerra	Ninguna	1
	Los Ríos	RPIS/IESS	H. General de Babahoyo	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General Martín Icaza	Ninguna	1
	Santa Elena	RPIS/MSP	H. General Liborio Panchana	Ninguna	1
Zona 6	Azuay	Domicilio	NA	Ninguna	1
		Red complementaria	H. Universitario del Río	Ninguna	1
		RPIS/IESS	H. General de Cuenca	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General Vicente Corral Moscoso	H. Básico de Paute	1
				H. General de Macas	1
		Traslado	NA	Ninguna	1
Zona 7	El Oro	RPIS/MSP	H. Gineco Obstétrico Angela de Ollaque	H. Obstétrico Angela Ollaque	1
	Loja	Domicilio	NA	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General Isidro Ayora	Ninguna	2
Zona 8	Guayas	Domicilio	NA	Ninguna	1
		Red complementaria	Clinica Guayaquil	H.G.O. Universitario	1
		RPIS/IESS	H. De Especialidad Teodoro Maldonado C..	Ninguna	1
			H. General Los Ceibos de Guayaquil	Ninguna	2
		RPIS/MSP	CS Tipo "C" Posorja	Ninguna	1
			H. De Especialidad Abel Gilber Pontón	H.G.O. Universitario	1
				Ninguna	1
			H. General Guasmo Sur	CS Cisne 2	1
			H. Gineco Obstétrico Universitario	CS Tipo "C" Posorja	1
				H. Básico de Daule	1
				H. Básico La Troncal	1
				H. General Liborio Panchana	1
				H. General Martín Icaza	1
				Ninguna	1
Zona 9	Pichincha	RPIS/MSP	H. De Especialidad Eugenio Espejo	H. Gineco Obstétrico Nueva A..	1
			<b>Total</b>		<b>43</b>

**Gráfico N° 4 Porcentaje de MM por lugar de ocurrencia SE 1 a SE 19 Ecuador 2019**



Hasta la SE 19 el mayor porcentaje de MM que ocurre es en los hospitales del MSP 58,14% y en los hospitales del IESS 16,28%; en la Red Complementaria el 4,65%; en los traslados el 9,30% y en domicilios el 11,63%

**Gráfico N° 5 Comparación de casos de MM por años 2015 al 2019 Ecuador 2019 SE 1 a SE 19**




El gráfico N° 5 compara los años 2015 al 2019 las MM ocurridas a la SE 19, hasta los 42 días de puerperio, que son MM tomadas en cuenta para el cálculo del Indicador de la RMM al finalizar el año.

Los años 2015 al 2017 son datos finales con búsqueda activa, los datos del año 2018 son datos parciales de las notificaciones sistemáticas de las zonas, distritos y de la primera búsqueda activa y los datos del 2019 son notificaciones sistemáticas


Los años anteriores superan en número de MM al año 2019.

**Gráfico N° 6 Porcentaje de casos de MM Directa e Indirecta SE 1 a SE 19 Ecuador 2019**




Los 43 casos de Muertes Maternas reportadas hasta la SE 19, el 79,07% son causas Directas, y el 20,93% son causas Indirectas

**Gráfico N° 7 MM por grupos de edad SE 1 a SE 19 Ecuador 2019**



A la SE 19 el grupo de edades entre 30 a 39 años representa un mayor número de muertes maternas

**Gráfico N° 8 Porcentaje de casos de MM por período de ocurrencia SE 1 a SE 19 Ecuador 2019**



**PP inmediato** hasta las 24 horas del post parto.  
**PP mediano** desde 1 día hasta los 10 días del post parto.  
**PP tardío** desde los 11 días hasta los 42 días del post parto

**Tabla N° 4 Número de casos de MM por período de ocurrencia SE 1 a SE 19 Ecuador 2019**


	Embarazo	PP Inmediato	PP Mediano	PP Tardío	Total
Azuay	1	2	1	2	6
Chimborazo	1				1
El Oro		1			1
Esmeraldas				1	1
Guayas	3	7	3	4	17
Imbabura			1		1
Loja		2	1		3
Los Ríos		1		1	2
Manabí		1			1
Napo			1		1
Orellana		1			1
Pastaza			1		1
Pichincha				1	1
Santa Elena				1	1
Santo Dom..		1		1	2
Tungurahua	1	1		1	3
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>43</b>

Hasta la SE 19 el 13,95% (6 MM) ocurre en el momento del embarazo; el 39,53% (17 MM) ocurre en el momento del puerperio inmediato; el 18,60% (8 MM) ocurren en el momento del puerperio mediano y el 27,91% (12 MM) ocurren en el momento del puerperio tardío.

**Tabla N° 5 Tipo de Parto SE 1 a SE 19 Ecuador 2019**

Cesárea	22
Parto vaginal	12
Aborto/Legrado	3
Muerte en embarazo	6
<b>Total</b>	<b>43</b>


**Gráfico N° 9 Condición del producto al nacimiento SE 1 a SE 19 Ecuador 2019**



Hasta la SE 19 el 51,16% de las mujeres fallecidas su parto fue por cesárea; el 27,90% de las mujeres su parto fue por vía vaginal; el 7% son mujeres que su embarazo termina en aborto y su procedimiento fue un legrado instrumental; y el 14% fueron madres que fallecieron con su embarazo, independientemente de la edad gestacional, por lo que el producto fallece intraútero.

Hasta la SE 19 las 22 MM que su parto fue por Cesárea, el 77,27% de los niños vivieron y el 22,72% de los niños fallecieron; de las 12 MM que su parto fue por vía vaginal, el 83% de los niños vivieron y el 17% de los niños fallecieron.  
 Se concluye que hasta la SE 19 de las 34 MM que su parto fue por cesárea o por vía vaginal el 79% (27 RN) vivieron y se encuentran en custodia del padre o de familiares y el 21% (7 RN) fallecieron

**Gráfico N° 10 Porcentaje de casos de MM por ubicación de domicilio SE 1 a SE 19 Ecuador 2019**




Hasta la SE 19 el 58,14% de las fallecidas vivían en una área urbana, lo que significaría que estas madres residían cerca de algún establecimiento de salud, y el 41,86% de las madres fallecidas su residencia fue en sitios rurales.

**Tabla N° 6 Casos de MM por provincia y ubicación de domicilio SE 1 a SE 19 Ecuador 2019**


Provincia de residencia	Rural	Urbana	Total
Guayas	4	11	15
Azuay		4	4
Loja	2	1	3
Cañar	1	1	2
Chimborazo	2		2
Los Ríos	1	1	2
Manabí	1	1	2
Morona	2		2
Santa Elena	1	1	2
Tungurahua	1	1	2
Bolívar		1	1
El Oro		1	1
Esmeraldas		1	1
Imbabura	1		1
Orellana	1		1
Pichincha	1		1
Santo Domingo		1	1
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>

**Gráfico N° 11 Tendencia de Muerte Materna por SE años 2016 al 2019 SE 1 a SE 19**




En la SE 19 del 2015 se reporta 4 MM; el 2016 reporta 2 MM; el 2017 reporta 3 MM; en el 2018 se reporta 2 MM y para el 2019 se reporta 2 MM

**Gráfico N° 12 Comparación de casos de MM por lugar de residencia años 2018 y 2019 hasta la SE 19**



Por lugar de residencia de la madre en el año 2018 la provincia del Guayas hasta la SE 19 reporta 14 casos de MM para el año 2019 en el mismo período reporta 15 casos de de MM. La provincia de Pichincha en el 2018 reportó 3 casos, para el 2019 reporta 1 caso, disminuyendo en un 75%. Santa Elena, Azuay y Cañar en el año 2018 no tuvieron MM para el 2019 presentan MM.

**Gráfico N° 13 Comparación de causas básicas por grupos años 2016 al 2019 SE 1 a SE 19**



La OMS con el fin de promover un marco común de comparaciones internacionales, agrupan las causas básicas de muerte durante el embarazo, parto y puerperio en nueve grupos, que son clínica y epidemiológicamente relevantes, simplifican la caracterización de las MM, ya sean de causas directas o indirectas, aclaran y normalizan el reporte de afecciones que se consideran tienen un alto impacto sobre la salud pública. De las 43 MM registradas hasta la SE 19, las fuentes de las Causas básicas son de las notificaciones inmediatas tanto de los diagnósticos de la Historia Clínica y de los Certificados de defunción recojidos ese momento, hasta que se realice las Auditorias externas. Las causas básicas son informaciones preliminares que están sujetas a modificaciones, en función de los informes de auditoría y de revisiones para las Codificaciones CIE-10 por la instancia pertinente (INEC).

### Grupos con diagnósticos de causas básicas de Muertes Maternas de la SE 1 a la SE 19 (preliminares)


**Tabla N° 7 Causas Básicas por grupos Ecuador 2019**

Grupo 1	Embarazo ectópico roto	1
Grupo 2	Preeclampsia severa	5
	Síndrome de Hellp	6
Grupo 3	Hemorragia post parto	3
	Laceración de arteria uterina severa	1
	Placenta previa	1
	Shock hipovolémico	4
Grupo 4	Absceso puerperal del útero	1
	Sepsis del foco urinario	1
	Shock séptico	1
	Shock séptico de foco pélvico	1
Grupo 5	Atonía Uterina	1
	Embolia del líquido amniótico	1
	Embolia pulmonar	1
	Inercia uterina	1
Grupo 7	Absceso hepático	1
	Ca Gástrico	1
	Edema agudo de pulmón	1
	Embolia pulmonar	1
	Encefalopatía hipóxica isquémica	1
	Neuroinfección bacteriana	1
	SIDA	1
	Tromboembolismo severo pulmonar	1
Grupo 8	En espera de Informe	1
	En espera de Informe de autopsia	5
<b>Total</b>		<b>43</b>

Los grupos y diagnósticos son preliminares, hasta la obtención del Informe de las auditorías externas.

Sin embargo la causa básica que predomina son los Trastornos hipertensivos con el 25,6%, las Hemorragias obstétricas con el 20,93% y las Causas Indirectas con el 18,60%

**Gráfico N° 14 \*Tasa de MM por 10.000 embarazadas. SE 1 a SE 19 Ecuador 2019**



La tasa de muerte materna de cada una de las provincias está calculada por: número de MM hasta los 42 días de post parto, ocurridas en cada una de las provincias hasta la SE 19, dividida para la proyección de embarazadas del año 2019 y multiplicada por 10.000.

La provincia de Morona y Cañar registran las tasas más altas de MM 3,19 y 2,87 es decir que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia aproximadamente 3 embarazadas están en riesgo de fallecer, luego está la provincia de Loja, Orellana, Azuay, Santa Elena, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Guayas con tasas de 2,39 a 1,51 es decir que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias aproximadamente 2 embarazadas están en riesgo de fallecer, las provincias de Imbabura, Los Ríos, Santo Domingo, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Pichincha con tasas de 0,87 a 0,14 es decir que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias aproximadamente 1 embarazada está en riesgo de fallecer.