




MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

INMUNOPREVENIBLES
SARAMPIÓN CIE-10 B05.9
SE 1 - 52, 2018, SE 01 - 12, 2019




Tendencia de **SARAMPIÓN CIE-10 B05.9**, por semanas epidemiológicas de los años 2018 - 2019



Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de **SARAMPIÓN CIE-10 B05.9**, por grupos de edad, sexo, año 2019 (hasta SE 12)




Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de Sarampión, por provincia, semanas epidemiológicas 1 - 52, año 2018, SE 01 - 12, 2019

Prov Domic	SE 01 - 52 /2018	SE 01-12-2019	Total
AZUAY	1	0	1
CARCHI	5	0	5
CHIMBORAZ..	1	0	1
PICHINCHA	12	0	12
Total general	19	0	19

Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de Sarampión, por provincia, año 2018 (hasta SE 52) , SE 01 - 12, 2019



FUENTE: SIVE-ALERTA

El Sarampión una enfermedad altamente contagiosa que en el Ecuador desde el 9 de marzo del año 2018 tras la emisión de la alerta de la OPS/ OMS se encuentra en alerta nacional para sensibilizar la captación de casos a partir de la sospecha.

Hasta la SE 33 del 2018 se han notificado 19 casos de Sarampión se trata de 14 pacientes de sexo masculino y 5 casos de sexo femenino, de los cuales 11 casos son importados, 8 casos asociados a importación. 16 de los casos corresponden al Genotipo D8; pendiente resultado de 3 muestras.

Hasta la SE 12 del año 2019 **no** se reportan casos.

* La semana epidemiológica de notificación corresponde a la fecha de inicio de síntomas.




MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



INMUNOPREVENIBLES VARICELA CIE-10 B01.0† <-> B01.9 Ecuador, SE 01 - 12, 2019


Tendencia de B010-B019 Varicela por semanas epidemiológicas de los años 2017 - 2019



Fuente: SIVE-ALERTA

Semana Epidemiológica

Caso de B010-B019 Varicela, por grupos de edad, sexo, año 2019 (hasta SE 12)




Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de B010-B019 Varicela, por provincia de atención, semanas epidemiológicas 01 a 12, año 2019

Provincia de Domicilio	SE 01-11	SE 12	Total
PICHINCHA	620	86	706
GUAYAS	592	43	635
CHIMBORAZO	185	21	206
LOS RIOS	180	10	190
AZUAY	177	8	185
MANABI	147	19	166
COTOPAXI	122	11	133
IMBABURA	119	11	130
TUNGURAHUA	109	14	123
CAÑAR	94	10	104
MORONA SANTIAGO	88	3	91
EL ORO	68	7	75
ESMERALDAS	60	7	67
PASTAZA	61	4	65
SUCUMBIOS	47	16	63
LOJA	58	4	62
SANTO DOMINGO DE LOS ..	54	7	61
ORELLANA	40	18	58
NAPO	40	9	49
BOLIVAR	28	2	30
SANTA ELENA	21	5	26
ZAMORA CHINCHIPE	23	3	26
CARCHI	20	3	23
GALAPAGOS	9	2	11
Total general	2.962	323	3.285

Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de B010-B019 Varicela, por provincia de atención, año 2019 (hasta SE 12)



La varicela aunque es considerada una enfermedad benigna, en ocasiones pueden presentarse complicaciones por la aparición de neumonía o encefalitis inducidas por el VZV, que a veces pueden llevar a secuelas persistentes o a la muerte; con una tasa de letalidad por 100 000 defunciones en los adultos sanos 30 a 40 veces mayor que en los niños de 5-9 años. La incidencia global de varicela en América Latina y el Caribe en menores de 15 años es de 42,9 casos por cada 1 000 individuos, con una mortalidad 0,5 muertes por millón de niños entre 5 y 14 años.

En comparación al año 2018 en donde hasta la SE 12 se reportaron 3011 casos de varicela, para el año 2019 hasta la SE 12 se reporta 3.285 casos. Del total de los casos reportados la Provincia de Pichincha acumula el 21.49% (706), de casos notificados a nivel nacional.

Los casos de Varicela notificados en la SE 12 son de 323 casos, los mismos que en su mayoría fueron reportados por la provincia de Pichincha con 86 casos. Los grupos de edad más afectados son los de 5 a 10 años y de 21 a 49 años.




MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

INMUNOPREVENIBLES
PAROTIDITIS CIE - 10 B26.0† <-> B26.9
Ecuador, SE 01-12, 2019




Tendencia de B260-B269 Parotiditis por semanas epidemiológicas de los años 2016 - 2019



Fuente: SIVE-ALERTA

Semanas epidemiológicas

Caso de B260-B269 Parotiditis, por grupos de edad, sexo, año 2019 (hasta SE 12)




Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de B260-B269 Parotiditis, por provincia de atención, semanas epidemiológicas 01 a 12, año 2019

Provincia de Domicilio	SE 01-11	SE 12	Total
PICHINCHA	70	5	75
NAPO	35		35
GUAYAS	21	1	22
MORONA SANTIAGO	22		22
COTOPAXI	13	2	15
TUNGURAHUA	14		14
CARCHI	10		10
MANABI	10		10
SANTO DOMINGO DE LOS ..	7		7
ZAMORA CHINCHIPE	6		6
CHIMBORAZO	4		4
CAÑAR	3		3
PASTAZA	3		3
AZUAY	1	1	2
IMBABURA	2		2
SUCUMBIOS	2		2
LOJA	1		1
ORELLANA	1		1
Total general	225	9	234

Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de B260-B269 Parotiditis, por provincia de atención, año 2019 (hasta SE 12)



Fuente: SIVE-ALERTA

La parotiditis es una enfermedad inmunoprevenible que por lo general no presenta complicaciones, sin embargo los casos fatales en encefalitis por parotiditis es bajo y la mortalidad en general es de 1/10000 casos, secuelas permanentes ocurren en alrededor del 25% de casos de encefalitis.

En el Ecuador hasta la SE 12 se reportan 234 casos de Parotiditis a nivel nacional. La provincia que reporta el mayor número de casos es Pichincha con 32.05% (75) de los casos notificados a nivel nacional. En relación al año 2018 en donde hasta la SE 12 se reportaron 44 casos para este año en la misma semana se notifican 9 casos que equivale a un 79.54% de decremento en esta semana. Los grupos de edad más afectados son los de 16 a 20 y de 21 a 49 años de edad, existiendo un predominio en el sexo femenino.

Actualmente en el Ecuador desde la SE 01 del año 2019 la vigilancia epidemiológica se cambió de modalidad grupal a individual con el objetivo de tener una caracterización clínico epidemiológica de este evento.




MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



INMUNOPREVENIBLES TÉTANOS CIE-10 A35 Ecuador, SE 01- 12, 2019


Tendencia de A35X Tétanos por semanas epidemiológicas de los años 2016 - 2019



Fuente: SIVE-ALERTA

Semanas epidemiológicas

Caso de A35X Tétanos, por grupos de edad, sexo, año 2019 (hasta SE 12)




Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de A35X Tétanos, por provincia de atención, semanas epidemiológicas 01 a 12, año 2019

Provincia de Domicilio	SE 01-11	SE 12	Total
GUAYAS	2	0	2
MANABI	2	0	2
PASTAZA	2	0	2
LOS RIOS	1	0	1
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1	0	1
PICHINCHA	0	0	0
Total general	8	0	8

Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de A35X Tétanos, por provincia de atención, año 2019 (hasta SE 12)



El tétanos se adquiere tras la infección de cortes o heridas por las esporas de la bacteria Clostridium tetani, y la mayoría de los casos aparecen a los 14 días de la infección. El tétanos no se transmite de persona a persona.

La mayoría de los casos de tétanos están relacionados con el parto y pueden afectar tanto a recién nacidos como a madres que no se hayan vacunado.

En comparación al año 2018 en donde en la SE 12 se reportó 1 caso, para el año 2019 **NO** se reportan casos.

El grupo de edad más afectado (con 3 casos) es de 50 a 65 años, en el sexo masculino.




MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



INMUNOPREVENIBLES HEPATITIS B CIE - 10 B16.0 <-> B16.9 Ecuador, SE 01-12, 2019

Tendencia de B160-B169 Hepatitis B, por semanas epidemiológicas de los años 2017 - 2019



Fuente: SIVE-ALERTA

Caso de B160-B169 Hepatitis B, por grupos de edad, sexo, año 2019 (hasta SE 12)




Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de B160-B169 Hepatitis B, por provincia de atención, semanas epidemiológicas 01 a 12, año 2019

Provincia de Domicilio	SE 01-11	SE 12	Total
ESMERALDAS	9	1	10
MORONA SANTIAGO	6	0	6
PICHINCHA	4	1	5
SANTA ELENA	4	0	4
LOS RIOS	3	0	3
NAPO	3	0	3
COTOPAXI	2	0	2
ORELLANA	2	0	2
PASTAZA	2	0	2
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2	0	2
GUAYAS	1	0	1
MANABI	1	0	1
ZAMORA CHINCHIPE	1	0	1
Total	40	2	42

Casos de B160-B169 Hepatitis B, por provincia de atención, año 2019 (hasta SE 12)



Fuente: SIVE-ALERTA

La hepatitis B es una infección hepática potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B (VHB). Constituye un importante problema de salud a nivel mundial.

La máxima prevalencia de la hepatitis B se registra en las regiones de la OMS del Pacífico Occidental y de África, en las que el 6,2% y el 6,1% de la población adulta, respectivamente, están infectados.

En las regiones de la OMS del Mediterráneo Oriental, de Asia Sudoriental y de Europa se calcula que, un 3,3%, un 2,0% y un 1,6% de la población, respectivamente, padecen infección. En la región de la OMS de las Américas, el porcentaje de personas con hepatitis B es del 0,7.

En el Ecuador hasta la SE 12 se reportan 42 casos de hepatitis B a nivel nacional. La provincia de Esmeraldas notifica el 23,80% (10) de los casos notificados a nivel nacional.

En la SE 12 reportan 2 casos de Hepatitis B en relación al año anterior en donde se notificaron en esta semana 7 casos.

El grupo de edad más afectado es el de 21 a 49 años de edad, existiendo predominio en el sexo femenino.

De los 42 casos notificados hasta la SE 12, fueron captados 9 casos en este año pero presentaron inicio de síntomas el año anterior.



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

INMUNOPREVENIBLES
TOSFERINA CIE-10 A37 <-> A37.9
Ecuador, SE 1 - 12, 2019



Tendencia de A370-A379 Tosferina, por semanas epidemiológicas de los años 2016 - 2019

Año	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	23	24	26	27	28	29	30	31	32	33	35	36	39	40	41	43	45	46	47	48	49	50	51	52	Total		
2019	1	2		1	3		1																																								8
2018		1	1			1			1		1	1	2	1	1	2			1	1				2	1	1		2	2	1		1			1		1						1			27	
2017	1	2						2		1	1		2		1	2	1	1	1	1	2	3	1	1	1		2	1		1	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	4	5	1	3	1	57

Fuente: SIVE-ALERTA

Semanas epidemiológicas

Caso de A370-A379 Tosferina, por grupos de edad, sexo, año 2019 (hasta SE 12)




Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de A370-A379 Tosferina, por provincia de atención, semanas epidemiológicas 01 a 12, año 2019

Provincia de Domicilio	SE 01-11	Total
GUAYAS	6	6
LOS RIOS	1	1
PICHINCHA	1	1
Total	8	8

Fuente: SIVE-ALERTA

Casos de A370-A379 Tosferina, por provincia de atención, año 2019 (hasta SE 12)



Fuente: SIVE-ALERTA

La tos ferina, conocida también como coqueluche, es una causa importante de morbilidad y mortalidad infantil con un estimado de 50 millones de casos y 300.000 defunciones anuales registradas a nivel global. La tasa de letalidad en países en desarrollo puede llegar hasta un 4% en los lactantes menores de 12 meses. En comparación al año anterior 2018 en la SE 12, en donde se notificó 1 caso de tosferina, para el año 2019 en la misma semana epidemiológica **NO** se notifican casos de este evento, hasta el momento el número de casos notificados es en la provincia de Guayas con 6 casos, Los Ríos y Pichincha con 1 caso respectivamente. El mayor número de casos esta en el grupo de edad es de 1 a 4 años en el sexo femenino.